

Eine neue *Euploea* aus Borneo.

***Euploea (Penoa) masina* n. n. spec.**

♂. Kleiner als *pinwilli* Btl. von Malacca, Flügel schmaler, Hinterflügel am Analwinkel etwas ausgezogen und dadurch spitzer erscheinend. Vorderflügel ohne Spur eines blauen Schimmers, welcher bei *pinwilli* aus Perak sehr intensiv, bei solchen aus Sumatra aber schon matter erglänzt.

Vorderflügel mit einem sehr schmalen, kaum halb so breiten und auch etwas kürzeren Seidenstreifen als *pinwilli*.

Hinterflügel ohne Zeichnung oberseits, aber mit durchscheinenden Marginal- und Submarginalflecken der Unterseite.

Vorderflügelunterseite mit einer Submarginalreihe von 5 blauen, sehr kleinen Punkten, 2 etwas grösseren im Analwinkel und 2 länglichen am Costalrand, die 3 Medianflecke wie bei *pinwilli*.

Hinterflügel gleichfalls etwas bunter als jene der Malacca-Art mit 7 intensiv blauen Medianflecken an Stelle von 5 bei *pinwilli* und etwas kürzeren und reiner weissen Marginal- und Submarginalflecken.

Vorderflügellänge 45 mm.

Diese bereits durch den abweichenden secundären Geschlechtsunterschied genügend characterisierte Art bildet durch den scharf ausgeschnittenen und nicht wie bei den übrigen *Penoa*'s sanft gerundeten Analwinkel der Vorderflügel gewissermassen ein Verbindungsglied mit der Moore'schen Untergattung *Crastia*.

Berlin, 30. Juli 1897.

H. Fruhstorfer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Euploea aus Borneo. 16](#)