

australis browni Godm. Neu-Pommern, Mecklenburg, Lauenburg.
noorna Grose Smith. St. Moreby, Deutsch-Neu-Guinea. Tritt in
zwei Formen auf, einer hellen typischen und einer breiter
schwarz gesäumten, welche beide in Deutsch Neu-Guinea
vorkommen.

Berlin, 10. Juni 1899.

Drei neue *Papilio*.

Von *H. Fruhstorfer*.

Hierzu Fig. 12, Taf. II.

***Papilio arycles sphinx* nov. subspec. oder aberr. (Taf. II, fig. 12)**

Von einem Wanderhändler kaufte ich vor langer Zeit ein
Papilio-♂, welcher in die Verwandtschaft von *arycles* gehört, sich
durch bedeutendere Grösse und heller grünes Colorit bemerklich
macht. Die Querbänder der Vorderflügel-Zelle sind schmaler als in
arycles die Submarginalflecken dagegen grösser, was besonders auch
für die Unterseite gilt. Die in *arycles* roten Costal- und Subanal-
makeln sind hellgelb.

♂ Vorderflügelänge 42 mm.

***Papilio arycles* ab. *incertus*.**

Vom Museum in Singapore empfang ich durch das Wohlwollen
des derzeitigen Direktors Herrn Dr. Hanitsch eine Aberration des
Pap. arycles Boisd., welche der Benennung wert erscheint. Die
gelbbraune anstatt grüne Oberseite könnte allenfalls durch mechanische
Einflüsse oder Hitze und Feuchtigkeit verdorben sein. Die Unter-
seite aber differiert durch die ausgedehnteren silberigen Makeln be-
sonders im Medianteil der Hinterflügel. Der subanale weisse Längs-
fleck zwischen M 2 und M 3 ist länger und die roten Flecken sind
grösser als in *arycles* von Palembang, S.-O.-Borneo, W.-Java und
Palawan.

1 ♂ Patria ignot. Singapore, Banka (?) Nias (?).

♂ Vorderflügelänge 57 mm.

***Papilio macareus perakensis* nov. subspec.**

Wie Rothschild richtig vermutete, wird die malay. Halbinsel
von einer besonderen *macareus*-Race bewohnt, welche als *perakensis*
einen Namen verdient. Ein mir von Ipoh zugesandter ♂ kommt
typischen *macareus* Godt. von Java am nächsten und hat mit diesem
die Färbung der Hinterflügel-Unterseite gemeinsam. Die weissen

Streifen der Oberseite der Perak-♂♂ sind aber durchweg schmaler, sodass *perakensis* ein dunkleres Aussehen bekommt.

Ipoh, Perak, leg. Goldham, Type in coll. Fruhstorfer.

Neue Euploeen aus Deutsch-Neu-Guinea.

Von H. Fruhstorfer.

Calliploea lucinda sublucinda nov. subspec.

Eine Reihe von Calliploeen ohne näheres Vaterland als Deutsch Neu-Guinea, welche mir im Colonialwaarenhaus des Herrn Antelmann zur Besichtigung vorlagen und von denen ich ein unbeschädigt gebliebenes ♀ für meine Sammlung erstand, unterscheidet sich erheblich von *lucinda* Grose Smith (nec Rebel). 2 ♀♀ aus der Humboldtbai sind transparent gleich *Euploea browni* und deren Abdomen ist fast rein weiss. ♀♀ aus Deutsch Neu-Guinea sind fahl braun mit nur ganz mattem goldig violetten Schimmer und dunkelbraunem Abdomen. Diese neue Lokalrace mag *sublucinda* heissen.

Salpinx swierstrae ab. *erima*.

Die mir aus Deutsch Neu-Guinea zugesandten *Salpinx* differiren von der vorzüglichen Abbildung von Snellen's *Euploea perdita* var. *swierstrae* in T. v. E. 1891 und einem ♂ von der Humboldtbai in meiner Sammlung durch das Fehlen des schwarzbraunen Aussensaumes aller Flügel und des violetten Anfluges in der Zelle der Vorderflügel. Die Grundfarbe ist ein fahleres Gelbbraun ähnlich wie in *Calliploea salpinxoides*.

Die Unterseite ist ebenfalls viel heller und die Submarginalpunkte der Hinterflügel fehlen oder sind reduziert. Diese Form scheint sich in Neu-Guinea häufig zu wiederholen und mag als ab. *erima* einen Namen führen.

Ein ♂ aus der Astrolabebai hat eine etwas dunkler braune Grundfarbe und sechs weisslich violette, ziemlich grosse Submarginalpunkte der Vorderflügel, welche sich auf der Unterseite wiederholen. Diese Form kann ab. *sexguttata* heissen. Es wäre interessant festzustellen, ob *swierstrae* Snellen und *erima* sowie *sexguttata* als Art gelten können oder nur Zeitformen von *perdita herbsti* Boisd. und *perdita minima* Grose Smith vorstellen.



Erklärung der Doppeltafel II.

I. Zu dem Artikel: H. Fruhstorfer, *Rhopalocera Bazilana*,
welcher in Band XLV, 1900, Heft I erscheint:

- Fig. 1. *Trepsichrois claudius seraphita* ♀ Fruhst., Bazilan.
 " 2. *Bucasia, leucotaenia dinorah* Fruhst., Bazilan.
 " 3. *Curetis felderi bazilana* ♀ Fruhst., Bazilan.
 " 4. " *insularis hera* ♀ Fruhst., Nias.
 " 5. *Nephoronia valeria bazilana* Fruhst., ♂ Bazilan.
 " 6. " " " " " ♀ "

II. Zu den Artikeln: H. Fruhstorfer, auf Seite 278 bis 288
dieses Heftes.

- Fig. 7. *Doleschallia bisaltide borneensis* Fruhst., Nord-Borneo.
Seite 279.
 " 8. " " *malabarica* " Karwar, Ind.
Seite 279.
 " 9. " " *tualensis* " Key-Tnal.
Seite 280.
 " 10. " " *celebensis* " Menado, S. Celebes.
Seite 280.
 " 11. " *herophthalmus kapaurensis* (ab. *lactearia*)
Kapaur, Halmaheira. Seite 281.
 " 12. *Papilio arycles* ab. *shpina* Fruhst. (Patria?) " 283.
 " 13. *Ideopsis inuncta iza* Fruhst. Sula Mangoli " 286.

III. Zu den Artikeln: H. Fruhstorfer, in Band XLIV,
Heft 1/2 1899.

a. Neue asiatische Lepidopteren.

- Fig. 14. *Pieris eperia soror* Fruhst. Sula Mangoli. Seite 51.

b. Uebersicht der indo-australisch Danaiden.

- Fig. 15. *Salatura melanippus malossona* Fruhst. Nord-Celebes.
Seite 68.

c. Neue Euthalien von Nord-Borneo.

- Fig. 16. *Euthalia nora cordelia* Fruhst. Kina-Balu Seite 121.
 " 17 " " *ilka* " " " 122.

Sämmtliche Figuren ca. 8 : 10 der natürlichen Grösse.





ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Drei neue Papilio. 283-284](#)