

# Beitrag zur Kenntniss der um Bitsch vorkommenden Collembolen.

von

J. J. Kieffer (Bitsch)

Die hier aufgezählten Arten wurden von mir um Bitsch, und zwar mit wenigen Ausnahmen, im November und Dezember gesammelt. Die Bestimmung derselben verdanke ich Herrn Prof. Dr. O. M. Reuter aus Helsingfors.

## 1. Familie Sminthuridae Schött.

### 1. *Sminthurus* Latr.

*fuscus* L. nec. Luc. Häufig auf faulem Holze, besonders bei feuchtem Wetter.

*viridis* L. Auf *Sonchus arvensis*, an *Coleosporium sonchi*.

### 2. *Papirius* Lubb.

*cursor* Lubb. (*Sm. fuscus* Luc. nec. L.) Häufig in Wäldern auf faulem Holze und unter feuchtem Laub.

*minutus* Fabr. Mit voriger Art.

„ var. *Couloni* Nic. Ebenda.

*ornatus* Nic. Mit vorigen.

## 2. Familie Entomobryidae Schött.

### 1. *Orchesella* Templ.

*cineta* L. Nicht selten unter faulendem Holze in Gärten, aber meist einzeln.

*rufescens* Tullb. Mit voriger.

*villosa* L. an denselben Orten.

### 2. *Isotoma* Bourlet.

*cinerea* Nic. Unter Moos an Waldrändern.

*palustris* Mull. Zwischen Moos in feuchten Wiesen.

*violacea* Tullb. Zwischen Moos an Waldrändern. Nach Reuter<sup>1)</sup> war diese Art bisher nur für Schweden, Finnland und Sibirien bekannt; von Dalla-Torre<sup>2)</sup> giebt dagegen nur Nord-Asien als Heimath dieses Thieres an.

*viridis* Bourl. Mit voriger.

<sup>1)</sup> Apterygogenea Fennica. Finlands Collembola och Thysanura (Acta societatis pro Fauna et Flora Fennica 1895. T. XI, N. 4.)

<sup>2)</sup> Die Gattungen und Arten der Apterygogenea (Programm des Staats-Gymnasiums in Innsbruck 1895).

3. *Entomobrya* Rondani.

*disjuncta* Nic. Unter Moos.

*intermedia* Brook. Mit voriger Art.

*marginata* Tullb. Unter Laub und zwischen Moos.

*multifasciata* Tullb. Unter Moos.

*muscorum* Nic. Ebenda.

" var. *subpulchella* Rent. Mit der typischen Form.

*nivalis* L. Mit vorigen.

4. *Tomocerus* Nic.

*niger* Bourl. (*lavesens* Tullb.) Unter faulem Holze, in Gärten.

*plumbeus* L. Sehr häufig unter faulem Holze und unter Steinen  
in Gärten und Wäldern.

*tridentiver* Tullb. Unter Moos. (Nach Reuter, war diese Art bisher  
nur für Schweden, Finland, Helgoland, England und Böhmen  
bekannt.)

*vulgaris* Tullb. (non *niger* Bourl.) Unter faulem Holze und unter  
Steinen, sehr häufig.

5. *Cyphodeirus* Nic.

*albinus* Nic. Häufig mit *Lasius niger* unter der Rinde der Kiefern-  
strünke.

6. *Sira* Lubb.

*Buskii* Lubb. Unter Moos, in Wäldern.

7. *Lepidocyrtus* Bourl.

*lanuginosus* Gm. Unter Moos an Waldrändern.

3. Familie Lipuridae Schött.

1. *Achorutes* Temp.

*armatus* Nic. Zwischen Moos und feuchtem Laub.

*purpurascens* Lubb. Mit voriger.

2. *Podura* L.

*aquatica* L. Auf Sümpfen, gesellschaftlich.

3. *Aphorura* Macgill.

(*Lipura* Burm. nec Illig.)

*ambulans* L. Diese kleine milchweisse Art ist überall unter Rinde  
und in faulem Holze häufig.

4. *Neanura* Macgill.

(*Anura* Gervais 1842, nec. Gray 1838.)

*muscorum* Temp. Unter Rinde und unter faulem Holze häufig.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Kieffer Jean-Jacques

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntniss der um Bitsch vorkommenden Collembolen. 113-114](#)