

Beitrag zur Kenntniss der um Bitsch vorkommenden Collembolen.

von
J. J. Kieffer (Bitsch)

Die hier aufgezählten Arten wurden von mir um Bitsch, und zwar mit wenigen Ausnahmen, im November und Dezember gesammelt. Die Bestimmung derselben verdanke ich Herrn Prof. Dr. O. M. Reuter aus Helsingfors.

1. Familie Sminthuridae Schött.

1. *Sminthurus* Latr.

fuscus L. nec. Luc. Häufig auf faulem Holze, besonders bei feuchtem Wetter.

viridis L. Auf *Sonchus arvensis*, an *Coleosporium sonchi*.

2. *Papirius* Lubb.

cursor Lubb. (*Sm. fuscus* Luc. nec. L.) Häufig in Wäldern auf faulem Holze und unter feuchtem Laub.

minutus Fabr. Mit voriger Art.

„ var. *Couloni* Nic. Ebenda.

ornatus Nic. Mit vorigen.

2. Familie Entomobryidae Schött.

1. *Orchesella* Templ.

cineta L. Nicht selten unter faulendem Holze in Gärten, aber meist einzeln.

rufescens Tullb. Mit voriger.

villosa L. an denselben Orten.

2. *Isotoma* Bourlet.

cinerea Nic. Unter Moos an Waldrändern.

palustris Mull. Zwischen Moos in feuchten Wiesen.

violacea Tullb. Zwischen Moos an Waldrändern. Nach Reuter¹⁾ war diese Art bisher nur für Schweden, Finnland und Sibirien bekannt; von Dalla-Torre²⁾ giebt dagegen nur Nord-Asien als Heimath dieses Thieres an.

viridis Bourl. Mit voriger.

¹⁾ *Apterygogenea Fennica*. Finlands Collembola och Thysanura (Acta societatis pro Fauna et Flora Fennica 1895. T. XI, N. 4.)

²⁾ Die Gattungen und Arten der *Apterygogenea* (Programm des Staats-Gymnasiums in Innsbruck 1895).

3. *Entomobrya* Rondani.

disjuncta Nic. Unter Moos.

intermedia Brook. Mit voriger Art.

marginata Tullb. Unter Laub und zwischen Moos.

multifasciata Tullb. Unter Moos.

muscorum Nic. Ebenda.

" var. *subpulchella* Rent. Mit der typischen Form.

nivalis L. Mit vorigen.

4. *Tomocerus* Nic.

niger Bourl. (*lavesens* Tullb.) Unter faulem Holze, in Gärten.

plumbeus L. Sehr häufig unter faulendem Holze und unter Steinen
in Gärten und Wäldern.

tridentiver Tullb. Unter Moos. (Nach Reuter, war diese Art bisher
nur für Schweden, Finland, Helgoland, England und Böhmen
bekannt.)

vulgaris Tullb. (non *niger* Bourl.) Unter faulendem Holze und unter
Steinen, sehr häufig.

5. *Cyphodeirus* Nic.

albinus Nic. Häufig mit *Lasius niger* unter der Rinde der Kiefern-
strünke.

6. *Sira* Lubb.

Buskii Lubb. Unter Moos, in Wäldern.

7. *Lepidocyrtus* Bourl.

lanuginosus Gm. Unter Moos an Waldrändern.

3. Familie Lipuridae Schött.

1. *Achorutes* Temp.

armatus Nic. Zwischen Moos und feuchtem Laub.

purpurascens Lubb. Mit voriger.

2. *Podura* L.

aquatica L. Auf Sümpfen, gesellschaftlich.

3. *Aphorura* Macgill.

(*Lipura* Burm. nec Illig.)

ambulans L. Diese kleine milchweisse Art ist überall unter Rinde
und in faulem Holze häufig.

4. *Neanura* Macgill.

(*Anura* Gervais 1842, nec. Gray 1838.)

muscorum Temp. Unter Rinde und unter faulem Holze häufig.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Kieffer Jean-Jacques

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntniss der um Bitsch vorkommenden Collembolen. 113-114](#)