

Zwei neue Cetoniden-Arten.

Von

J. Moser, Hauptmann a. D.

Cosmiomorpha tonkinensis.

Nigra, nitida; capite grosse et dense punctato, clypeo subquadrato, margine antico parum elevato; prothorace grosse punctato, margine postico ante scutellum laevi; scutello triangulari, acuto, sparsim grosse punctato; elytris bicostatis, dense punctulatis, punctis semi-annulatis, sutura laevi; pygidio transversim-ruguloso, fulvo-setoso; subtus medio fere laevi, lateribus aciculatis et rufo-pilosis; tibiis anticis tridentatis, mediis et posticis extus uno dente armatis, intus rufo-pilosis. Long. 16—20 mm.

Tonkin (H. Fruhstorfer).

Von der Gestalt und Grösse der *Cosmiomorpha setulosa* Westw. unterscheidet sich diese Art von den bisher bekannten Arten durch die schwarze Färbung und die nicht behaarte Oberseite.

Dischista marginata *).

Supra rubra, opaca, thoracis elytrorumque limbo luteo; pygidio nigro, duabus maculis luteis; subtus nigra, nitida, abdominis segmentis macula basali interiore et apicali exteriori albis. Long. 22—25 mm.

Africa orientalis (Mikindani, Ikutha).

Der braunen Varietät der *Pachnoda marginata* F. sehr ähnlich. Der Prosternalfortsatz ist jedoch etwas abwärts gesenkt, wie bei *Dischista cincta* De Geer, und zeigt das Pygidium auf schwarzem Grunde eine ähnliche gelbe Zeichnung wie diese Art, nur ist der herzförmige Fleck hier durch eine schwarze Mittellinie getheilt.

*) Siehe Sitzungsberichte vom 29. Januar 1903: Insekten-Börse No. 17.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Moser J.

Artikel/Article: [Zwei neue Cetoniden-Arten. 145](#)