

Synonymische Bemerkungen.



Theodosia telifer Bates = (*Rothschildi* Jans.). In den Transactions of the Entom. Soc. of London 1903 p. 305 hat O. E. Janson eine *Theodosia Rothschildi* beschrieben, bei der er als Hauptunterschied von *telifer* die behaarten Vorderschienen des ♂ hervorhebt. In einer Ausbeute vom Kinibalu-Gebirge, welche die Firma H. Rolle von Waterstradt erwarb, befanden sich die drei *Theodosia*-Arten *telifer* Bates, *magnifica* Rotsch. und *Westwoodi* Thoms in grosser Anzahl. Sowohl von *telifer* als auch von *magnifica* fanden sich mehrere ♂♂ mit stark behaarten Vorderschienen vor, welche sich sonst in nichts von den ♂♂ mit unbehaarten Vorderschienen unterschieden. Die übrigen Unterschiede von *telifer*, welche Janson in seiner Beschreibung der *Rothschildi* anführt, hat nur sein geistiges Auge gesehen in dem Bestreben, noch weitere Unterschiede herauszufinden. Unter den Exemplaren von *Th. Westwoodi* fanden sich keine mit dicht behaarten Vorderschienen, doch zeigten sich bei einigen Stücken vereinzelte Haare, welche wohl die Ueberreste einer ehemaligen Behaarung sind. Man kann daher annehmen, dass nicht nur bei *telifer*, *Rothschildi* und *perakensis*, sondern wohl bei allen *Theodosia*-Arten die ♂♂ im frischen Zustande behaarte Vorderschienen besitzen und diese Behaarung sehr leicht aus noch unbekanntem, mit ihrer Lebensweise zusammenhängenden Gründen verlieren.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Moser J.

Artikel/Article: [Synonymische Bemerkungen. 273](#)