

Die Rhynchoten-Fauna der Mark Brandenburg.

Von F. Schumacher.

III. *)

Fam. **Lygaeidae. Pyrrhocoridae.**

Ergänzungen und Berichtigungen zum I. Teil.

- (62.) *Sehirus dubius* Scop. ist wieder zu streichen, da ich in Erfahrung gebracht habe, daß mit der Fundortsbezeichnung „Plaue“ Plaue in Thüringen gemeint ist (und nicht Plaue an der Havel).
62. *Carpocoris fuscispinus* Boh. betrachte ich nunmehr als besondere Art und von *C. purpureipennis* Geer verschieden. Sie ist zwischen 35 u. 36 einzureihen.

Verzeichnis der Lygaeiden.

88. *Lygaeus equestris* L.
89. *Arocatus melanocephalus* F.
90. *Arocatus roeseli* Schumm.
91. *Nysius jacobaeae* Schill.
92. *Nysius thymi* Wlff.
93. *Nysius ericae* Schill.
94. *Nysius senecionis* Schill.
95. *Nysius lineatus* Costa.
96. *Nysius punctipennis* H.-Sch.
97. *Cymus glandicolor* Hhn.
98. *Cymus obliquus* Horv.
99. *Cymus clavicultus* Fall.
100. *Ischnorhynchus resedae* Pz.
101. *Ischnodemus sabuleti* Fall.
102. *Hencstaris halophilus* Burm.
103. *Geocoris grylloides* L.
104. *Geocoris dispar* Waga.
105. *Geocoris ater* L.
106. *Chilacis typhae* Perr.
107. *Heterogaster artemisiae* Schill.
108. *Heterogaster urticae* F.
109. *Platyplax salviae* Schill.

*) I. Siehe Zoolog. Anz. Bd. XXXVII, 1911. Nr. 6—7. p. 129—136.
II. Siehe Berl. Ent. Zeitschr. LVI. 1911, p. 128—132.

F. Schuhmacher:

110. *Camptotelus lineolatus* Schill.
111. *Oxycarenus modestus* Fall.
112. *Macroplox preyssleri* Fieb.
113. *Pamera fracticollis* Schill.
114. *Pamera lurida* Hhn.
115. *Rhyparochromus antennatus* Schill.
116. *Rhyporochromus praetextatus* H.-Sch.
117. *Rhyparochromus chiragra* F.
118. *Tropistethus holosericeus* Sz.
119. *Pterotmetus staphylinoides* Burm.
120. *Ischnocoris hemipterus* Schill.
121. *Macrodema micropterum* Curt.
122. *Pionosomus varius* Wlff.
123. *Plinthisus pusillus* Sz.
124. *Plinthisus brevipennis* Latr.
125. *Lasiosomus enervis* H.-Sch.
126. *Acompus rufipes* Wlff.
127. *Stygnocoris rusticus* Fall.
128. *Stygnocoris pedestris* Fall.
129. *Stygnocoris fuliginus* Fourcr.
130. *Stygnocoris pygmaeus* F.
131. *Peritrechus angusticollis* Sahlb.
132. *Peritrechus geniculatus* Hhn.
133. *Peritrechus nubilus* Fall.
134. *Peritrechus sylvestris* F.
135. *Microtoma atrata* Gze.
136. *Trapezonotus anorus* Flor.
137. *Trapezonotus arenarius* L.
138. *Sphragisticus nebulosus* Fall.
139. *Calyptonotus rolandri* L.
140. *Aphanus lynceus* F.
141. *Aphanus quadratus* F.
142. *Aphanus vulgaris* Schill.
143. *Aphanus pini* L.
144. *Beosus maritimus* Scop.
145. *Emblethis verbasci* F.
146. *Gonianotus marginepunctatus* Wlff.
147. *Eremocoris plebejus* Fall.
148. *Ereinocoris podagricus* F.
149. *Eremocoris erraticus* F.
150. *Drymus sylvaticus* F.
151. *Drymus brunneus* Sahlb.
152. *Scolopostethus pictus* Schill.
153. *Scolopostethus affinis* Schill.

154. *Scolopostethus thomsoni* Reut.
155. *Scolopostethus decoratus* Hhn.
156. *Gastrodes ferrugineus* L.

Fam. Pyrrhocoridae.

157. *Pyrrhocoris apterus* L.

Fundorte seltener und bemerkenswerter Arten.

88. **Lygaeus equestris** L.

Häufig im südlichen und mittleren Deutschland, ziemlich selten und sehr vereinzelt im Norddeutschen Flachland, aber an den Orten seines Vorkommens gewöhnlich gesellig, bis zu den Küsten der Nord- und Ostsee verbreitet (Oldenburg, Mus. Oldenburg!; Insel Rügen: Göhren, 31. 8. 01, Enderlein!; Misdroy, Stein!). Fundorte in Brandenburg: Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!; Müggelberge, 24. VIII. Schirmer! Kommt auch in unseren Nachbarprovinzen vor: Prov. Sachsen: Halle, v. Baerensprung!; Prov. Posen: Nakel, Torka! (auf *Nigella sativa*).

89. **Arocatus melanocephalus** F.

Selten in Brandenburg, bisher nur Pfaueninsel bei Potsdam, V. 05, Ude! Die Art lebt hier am Fuße alter Eichen, auch in alten Gängen von *Cerambyx cerdo*. Als ein solches zerfressenes Stammstück im Kgl. Zool. Museum in Berlin aufgestellt werden sollte, kam eine größere Zahl dieser Lygacide zum Vorschein.

90. **Arocatus roeseli** Schumm.

Ziemlich selten in Brandenburg: Umgebung Berlins, Erichson! v. Baerensprung!, Stein!

91. **Nysius jacobaeae** Schill.

Häufig auf den Kämmen der deutschen Mittelgebirge, z. B. Riesengebirge, Thüringerwald!, Schwarzwald!, Vogesen!, selten im Norddeutschen Flachland. Die Art wurde vor Jahren von v. Baerensprung! bei Berlin gefangen. Der Fund bedarf der Bestätigung.

98. **Cymus obliquus** Horv.

Brandenburg: (nicht selten); Müggelsee-Ufer, Obst!; Teufelssee bei Freienwalde, 16. V. 10!! Ich habe dies Tier auch aus Westpreußen, Schlesien, Sachsen, Hessen-Nassau und vom Isergebirge gesehen.

101. **Ichnodemus sabuleti** Fall.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung!, Stein!; Bredow b. Nauen, 7. VII. 07!! Macroptere Stücke kommen auch bei uns vor und sind von v. Baerensprung und von Stein mehrfach gesammelt worden. Das Tier geht auch bis zur Ostseeküste und ist z. B. bei Stralsund von Habelmann! gefunden worden.

102. **Henestaris halophilus** Burm.

Kommt nur an Salzstellen vor und ist z. B. bei Magdeburg (Sülldorf etc.), am Salzsee bei Mansfeld häufig. In der Koll. v. Baerensprung habe ich 1 Exemplar aus der Umgebung Berlins gesehen. Da das Tier nur an salzhaltigen Stellen vorkommt, so könnte es nur von einer der wenigen bei uns vorhandenen Salzstellen herkommen, vielleicht aus dem Havelland. Das Wiederauffinden des interessanten Tieres wäre sehr erwünscht.

103. **Geocoris grylloides** L.

An sandigen und sonnigen Orten, besonders in Heidegegenden nicht selten, aber nur stellenweise, daselbst öfters in kleinen Gesellschaften: Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung!, Stein!, Schirmer!; ferner Spreeheide und Rehberge b. Baumschulenweg, 8. IX. 05, 21. IX. 05, 18. VII. 06, 4. X. 08!!; Wuhlheide b. Coepenick, 8. VII. 06!!; Seegefeld bei Spandau, 19. VII. 07!!; Kagel b. Strausberg, 14. VI. 10!!; Wilhelmshagen, 26. VII. 06!!; Spitzmühle b. Strausberg, 15. VII. 06!!; Grünau-Schulzendorf, 29. VII. 06!!; um Oranienburg, 9. VIII. 06, 12. VIII. 06, 16. VI. 07, 27. VI. 07, 29. VI. 07!!; Birkenwerder, 1. IX. 06!!; Buckow, Schirmer!; Bredower Forst b. Nauen, 7. VII. 07!!; Plagefenn b. Chorin (Naturreservat) Dahl. Makroptere Exemplare sind nicht selten. v. Baerensprung und Stein haben sie schon bei Berlin beobachtet und ich habe sie auch mehrfach gefunden (bei Oranienburg, Rehberge b. Baumschulenweg, Wilhelmshagen, Seegefeld, Grünau-Schulzendorf).

104. **Geocoris dispar** Waga.

Selten in Brandenburg: Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!, bei Oranienburg!!; Briesetal b. Birkenwerder, 1. IX. 06!!; Rehberge b. Baumschulenweg, 28. 7. 06!!; Buckow, Schirmer! Ein makropteres Exemplar hat Tetens am 20. VII. 91 bei Berlin gefunden.

105. **Geocoris ater** L.

Bei uns in sandigen Gegenden auf Binnendünen, Brachen, Abhängen nicht selten, gesellig, aber nicht überall: Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!; Rehberge b. Baumschulenweg, 18. VII. 06, 28. VII. 06, 1. VIII. 06, 2. VIII. 06, 12. VIII. 06, 12. X. 06, 2. IV. 07!!; Spreeheide b. Baumschulenweg, 23. IX. 08!!; Kagel bei Strausberg, 14. VI. 10!!

106. **Chilacis typhae** Perr.

Bisher in Deutschland wenig beobachtet, wurde gefunden in Thüringen, ferner bei Halle (v. Baerensprung!), Magdeburg (Breddin). In der Provinz Brandenburg ist sie bei Charlottenburg (22. II. 85) von Breddin gefunden worden.

107. **Heterogaster artemisiae** Schill.

Selten in Brandenburg: Umgebung Berlins, v. Baerensprung! häufiger in Schlesien, Prov. Sachsen (Halle), Thüringen und dem südlichen Deutschland.

109. **Platyplax salviae** Schill.

Ziemlich selten in Brandenburg, fehlt vielen Orten. Umgebung Berlins, Burmeister!, v. Baerensprung!, Stein! Bei Wriezen!! Häufiger in Mittel- und Süd-Deutschland, auch noch bei Halle (Stein!) Magdeburg (Breddin), Aachen (Koll. Luchs).

110. **Camptotelus lineolatus** Schill.¹⁾

Umgebung Berlins: v. Baerensprung!, Stein!; frühere Hasenheide b. Berlin (nach Fieber, 1851).

111. **Oxycarenus modestus** Fall.¹⁾

Umgebung Berlins, Stein!

112. **Macroplax preysleri** Fieb.¹⁾

Umgebung Berlins. v. Baerensprung!, Stein!; Reinickendorf b. Berlin 24. IV. 07, Spaneyl.

116. **Rhyparochromus praetextatus** H.-Sch.

Selten bei Berlin (v. Baerensprung!), schon häufiger bei Halle, (v. Baerensprung!), und im südlichen Deutschland.

119. **Pterotmetus staphylinoides** Burm.

Selten in Brandenburg; Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, ferner Freienwalde, Erichson! Ist häufiger im südlichen Deutschland. Ich habe auch Stücke gesehen aus Schlesien (Stein!) und Sachsen (v. Baerensprung!).

123. **Plinthisus pusillus** Sz.

Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!

Plinthisus brevipennis Latr.

Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!, Schirmer! Oranienburg, 8. V. 07, 27. VI. 07!!; Spreeheide b. Baumschulenweg, 2. VI. 07!!; Bredower Forst b. Nauen, 5. VI. 06!!; Plägefenn b. Chorin (Naturreservat) Dahl.

135. **Microtoma atrata** Gze.

Die Art ist in der Umgebung Berlins bisher nur einmal von v. Baerensprung beobachtet worden. Aus den Nachbargebieten habe ich einige Exemplare gesehen (Sachsen, v. Baerensprung!; Thüringen, Staudinger!), häufiger im wärmeren Deutschland.

¹⁾ Vgl. meinen Aufsatz über die deutschen Arten der Unterfamilie *Oxycareninae*. (Deutsch. Ent. Zeitschrift, 1911, S. 213—215.)

139. Calyptonotus rolandri L.

Selten in Brandenburg. Ich habe bisher nur 2 Exemplare aus unsrer Provinz gesehen, eins aus der Umgebung Berlins in der Koll. v. Baerensprung, das andere von Steglitz b. Berlin in der Koll. Stein. Auch bei Halle ist die Art v. Baerensprung! gefunden worden, häufiger ist sie in Thüringen (Staudinger) und im südlichen Deutschland.

140. Aphanus lynceus F.

Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!, Schirmer!; Spreeheide b. Baumschulenweg, 23. IX. 05, 5. X. 05, 23. IX. 08!!; Rehberge b. Baumschulenweg, 28. VII. 06!!; Müncheberger Heide, 8. VI. 10!!; Rüdersdorfer Kalkberge, 11. VIII. 10!!; Treptow, 26. IX. 05!!; Oranienburg, 5. V. 07!! . Ist über ganz Deutschland verbreitet.

141. Aphanus quadratus F.

Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!, Schirmer!; Kagel b. Strausberg, 26. IV. 09, 14. VI. 10!!; Eggersdorf b. Strausberg, 15. VII. 06!!; Grünau-Schulzendorf, 24. IX. 05!!; Niederschöneeweide-Spindlersfeld, 4. X. 05!!; Oranienburg, 12. VI. 07!!; Plagefenn bei Chorin (Naturreservat) Dahl.

144. Beosus maritimus Scop.

Umgebung Berlins, Baerensprung!, Stein!, Schirmer!; Spreeheide b. Baumschulenweg, 29. IX. 05!!; Grünau-Schulzendorf, 24. IX. 05!!; Niederschöneeweide-Spindlersfeld, 8. X. 05!!; 11. X. 05!!; Lehnin, Schilsky.

145. Emblethis verbasci F.

Nicht häufig, nur stellenweise auf sehr sandigen Stellen. Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!; Rehberge b. Baumschulenweg, 28. VII. 06. Geht nördlich bis zur Ostseeküste (z. B. Wollin, Habelmann!)

146. Gonianotus marginepunctatus Wlff.

Etwas häufiger als vorige Art, an ähnlichen Orten. Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!; Kagel b. Strausberg, 2. IV. 10!! . Geht ebenfalls bis zur Ostseeküste (z. B. Wollin, v. Baerensprung!)

156. Gastroides ferrugineus L.

Umgebung Berlins, v. Baerensprung!, Stein!; Finkenkrug, Schirmer! (als *abietis* L. aufgeführt).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: [Die Rhynchoten-Fauna der Mark Brandenburg. 27-32](#)