

Farabeuf, Ueber den M. sternocleidomastoideus

Progrès médical. 1881. T. IX Nr. 15.

Theile (1844) beschrieb bekantlich zwei besondere Muskeln statt des M. sternocleidomastoideus, indem er denselben in die Mm. sternomastoideus und cleidomastoideus trennte; wie es ja auch bei manchen Tieren die Norm ist. Der Verf. schließt sich durchaus an Theile an und gibt im Einzelnen folgende Darstellung:

1) M. sternomastoideus. Liegt oberflächlich, entspringt von der Linea semicircularis superior oss. occipitis und dem vordern Rand des Processus mastoideus, wo der Ursprung ein wenig mit dem M. cleidomastoideus verschmilzt. Die meisten seiner Bündel gehen in die Sternalsehne über, die übrigen breiten sich membrauartig aus und gelangen zu dem medialen Abschnitt der Clavicula, in einer Linie, welche bis 6 cm lateralwärts vom Sternoclaviculargelenk sich erstrecken kann. Beide Abteilungen sollen hier als *Portio sternalis* (sternales Bündel) und *Portio clavicularis* (claviculares Bündel) des M. *sternomastoideus* unterschieden werden.

2) M. cleidomastoideus. Entspringt von der Spitze und den beiden Rändern des Processus mastoideus, inserirt sich an der Clavicula längs einer Rauigkeit, welche ca. 2 cm lateralwärts vom Sternoclaviculargelenk beginnt. Nach oben ist er nur ein wenig schmaler als der M. sternomastoideus.

Was nun die Verhältnisse beider Muskeln zu einander anlangt, so variiert die sternale Portion des M. sternomastoideus nur wenig, beträchtlich aber die Clavicularportion. Bei starker Entwicklung verbirgt letztere den M. cleidomastoideus vollständig. Wenn die Portio clavicularis dünn ist, schimmert der M. cleidomastoideus durch; ist sie von der Portio sternalis getrennt, so tritt der letztgenannte, tiefer gelegene Muskel im Zwischenraum beider Portionen hervor. Selten erstreckt sich die Portio clavicularis weiter lateralwärts als der M. cleidomastoideus. Einmal unter 24 Fällen fehlte rechterseits die Portio clavicularis vollständig, linkerseits war sie sehr dünn.

W. Krause (Göttingen).

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien die erste Abtheilung:

Jahresbericht

über die

Leistungen und Fortschritte

in der

gesamten Medicin.

Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten

herausgegeben von

Rud. Virchow und Aug. Hirsch.

XVI. Jahrgang. Bericht für das Jahr 1881.

2 Bände (6 Abtheilungen). Preis des Jahrgangs 37 Mark.

Einsendungen für das „Biologische Centralblatt“ bittet man an die „Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut“ zu richten.

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. — Druck von Junge & Sohn in Erlangen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Biologisches Zentralblatt](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Krause Wilhelm Johann Friedrich

Artikel/Article: [Ueber den M. sternocleidomastoideus 320](#)