Rückblick auf das

"10th Carinthian Raptor Migration Camp"

von BirdLife Kärnten

Vom 18. bis 31. August 2016 fand das zehnte Carinthian Raptor Migration Camp in Oberstossau bei Arnoldstein im Unteren Gailtal statt. Traditionell lag das Hauptaugenmerk auf dem Durchzug der Wespenbussarde (*Pernis apivorus*), die hier in der zweiten Augusthälfte bei weitem die häufigste ziehende Greifvogelart darstellen.
Die ersten Tage verliefen wie gewohnt eher unspektakulär, wobei der Durchzug am dritten Tag mit einer Tagessumme von 390 ziehenden Wespenbussarden Fahrt aufzunehmen schien. Fortan verlief der Durchzug jedoch merklich schwächer als in den meisten Vorjahren, denn im weiteren Verlauf des Camps bildeten Tagessummen zwischen 215 und 314 ziehenden Wespenbussarden die Regel, nur am 24. und 26. August konnten weniger als 200 ziehende Wespenbussarde erfasst werden.

Insgesamt konnten im Rahmen des Camps **3.447 ziehende Greifvögel** beobachtet werden, wovon **3.243 Wespenbussarde** waren. Dies entspricht zirka 94,08 % aller ziehenden Individuen. Des Weiteren wurden Mäusebussarde (117 ziehende Individuen), Rohrweihen (54), Schwarzmilane (16), Sperber (9), ein Fischadler, ein Gänsegeier, eine Wiesenweihe sowie drei unbestimmte Greifvögel ziehend beobachtet.
Die im Vergleich zu den Vorjahren geringe Gesamtsumme ist bei den Wespenbussarden wahrscheinlich auch heuer auf eine außergewöhnliche Brutzeit zurückzuführen. Diese These kann aber nicht verifiziert werden, da Untersuchungen aus dem Brutgebiet dieser Wespenbussarde fehlen.

Aufgrund des konstanten Zugverlaufs und einem zahlenstarken Abschlusstag wurde kurzfristig beschlossen, die Beobachtungsperiode zu verlängern. An diesen beiden Tagen konnten jedoch nur 106 bzw. 55 ziehende Wespenbussarde beobachtet werden, was das nahende Ende des Durchzugs signalisierte. Die einzigen erwähnenswerten anderen ziehenden Greifvögel am 01. und 02. September waren ein **Zwergadler,** ein Fischadler und eine Wiesenweihe.

Kennzahlen « 10th Carinthian Raptor Migration Camp, CRMC »

ziehende Greifvögel insgesamt	davon ziehende Wespenbussarde	andere Greifvögel	davon hervorzuheben
			1 Wiesenweihe *(Circus pygargus)*
3.447 Ind.	**3.243 Ind.**	**204 Ind.**	**16 Schwarzmilane** *(Milvus migrans)*
			1 Gänsegeier *(Gyps fulvus)*
			1 Fischadler *(Pandion haliaetus)*

Grafik: David Nayer Foto: Gebhard Brenner

Der Wespenbussard war wiederum die häufigste Greifvogelart beim Camp 2016. Vielen Dank und auf Wiedersehen 2017!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Birdlife Österreich - Projektberichte

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: 2_2016

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Rückblick auf das “10th Carinthian Raptor Migration Camp” von BirdLife Kärnten 1-2