

Artenliste der Vogelwelt

im Nationalpark Donau-Auen



Reicher Lebensraum für Vogelarten im Wasserwald.

Nationalpark
Donau Auen

FREIER FLUSS. WILDER WALD.



MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH UND DER EUROPÄISCHEN UNION



LE 14-20
Entwicklung für den ländlichen Raum

Europäischer
Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung
des ländlichen Raums
Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete





Vorwort



~ Freier Fluss. Wilder Wald. Seit 1996 schützt der Nationalpark Donau-Auen weite Teile der Aulandschaft östlich von Wien. Die Donau ist seine Lebensader. Er bietet Refugien für eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen und Erholungsraum für den Menschen.

Die Forstwirtschaft ist seit langem eingestellt, der Auwald zeigt eine gute Entwicklung zurück zur Wildnis. Im Gebiet entstanden beruhigte Bereiche, die viele sensible Arten als Lebensraum annehmen – wie der Seeadler oder der Schwarzstorch. Große Erfolge wurden im ökologischen Flussbau erzielt. Einst abgetrennte Altarme wurden wieder an die Donau angebunden, hart befestigte Uferabschnitte natürlich gestaltet. Dadurch wird der Charakter einer dynamischen Aulandschaft nicht nur erhalten, sondern verbessert.

Der Nationalpark Donau-Auen ist ein Hotspot der Artenvielfalt. Zu seinem Reichtum zählen rund 100 Brutvogelarten, darunter sehr seltene Vertreter. In den Bereichen Schutz, Erforschung und Monitoring der Vogelwelt besteht mit den Expertinnen und Experten von BirdLife Österreich eine langjährige, enge Partnerschaft.


Gemeinsam gelingt es erfolgreich, die Bestände nicht nur zu schützen, sondern auch die Rückkehr charakteristischer Arten der Flusslandschaften und Wälder zu fördern.

Als Gast kann man die Vogelwelt der Donau-Auen das ganze Jahr über erleben. Mitunter sieht man die Tiere nicht sofort, findet aber dennoch Hinweise oder erkennt ihren Gesang. In dieser Broschüre werden einige wichtige Vertreter vorgestellt. Neben der Artenliste aller aktuell nachgewiesenen Vögel empfehlen wir drei ausgewählte Wanderrouen, auf denen eine Vielzahl an Arten erspäht oder zumindest gehört werden kann. Ein lohnender Tipp sind auch spezielle Themenwanderungen in Begleitung von Nationalpark-Rangerinnen und -Rangern, die Schwerpunkte auf die Vogelwelt legen: Von Eulen und Seeadlern bis zum jährlichen Frühlingskonzert und den gefiederten Wintergästen.

Ich lade Sie herzlich ein, die vielfältige Vogelwelt im Nationalpark Donau-Auen zu erfahren und erleben.

Nationalparkdirektorin
Dlⁱⁿ Edith Klauser

Alles im Fluss – Vogelparadies Donau-Auen




~ Der Nationalpark Donau-Auen schützt auf ca. 9.600 ha eine der letzten großen **Aulandschaften** Mitteleuropas. Die Donau ist auch in diesem Abschnitt vor mehr als 100 Jahren reguliert worden. Da sie hier jedoch durch kein Wasserkraftwerk aufgestaut wurde, konnte sie ihren **Fließcharakter** bewahren. Die landschaftsgestaltende Kraft der Hochwässer wirkt weiterhin. Dies bedingt eine Fülle **unterschiedlicher Lebensräume** mit großen Wasser- und Schilfflächen sowie eine laufende dynamische Entwicklung. Der Wechsel von ausgedehnten Wäldern, großen Wiesen, stillen Altarmen und durchströmten Seitenarmen sowie der Fluss selbst bieten Lebensraum für eine Vielfalt an Organismen. Insbe-

sondere kommt diese reich strukturierte Aulandschaft der **Vogelwelt** zugute.

Seit der Gründung des Nationalparks hat man laufend **Renaturierungsprojekte** und **Artenschutzmaßnahmen** umgesetzt.

Vor allem im Wasserbau wurden und werden Meilensteine gesetzt. So werden Donauufer vom harten Korsett der Blocksteine befreit und Seitenarme wieder an den Fluss angebunden. Mit jedem Hochwasser verstärkt sich der **Einfluss des Wassers auf die Landschaftsgestaltung**. Es entstehen hunderte Meter lange Steilufer und große Kiesinseln. Dies kommt bereits selten gewordenen Vogelarten zugute. Der **Eisvogel** brütet in den Steilufern, der **Flussregenpfeifer** am blanken Schotter.



Die Kiesgruben der Umgebung beherbergen eine weitere ornithologische Besonderheit – den **Bienenfresser**. Einst brütete er in den steilen Ufern der unregulierten Flüsse. Die Zeichen mehren sich und es gibt Hoffnung, dass er an der Donau und ihren Seitenarmen seine ursprüngliche Bruthabitate wieder zurückerobert.

Die großen Auwälder mit ihren **alten Bäumen** sind ein wichtiges Brutbiotop für Greifvögel wie den **Seeadler** und **Kaiseradler**. Lange Zeit als ausgerottet gewertet, kehrten diese als Brutvogel wieder zurück. Der Seeadler zog erstmalig 2005 Junge auf und der Kaiseradler folgte einige Zeit später. Mittlerweile brüten jährlich einige Paare in den Donau-Auen.

Die Außernutzung-Stellung der Wälder hat bereits zu einem großen Anteil an **Totholz**, sowohl liegend als auch stehend, in unterschiedlichen Zersetzungsstadien geführt. Verschiedene Arten von **Spechten**, **Halsbandschnäpper**, **Kleiber** und **Meisen** sind die Profiteure, denn sie nutzen die Totholzstrukturen als Höhlenbaum oder Futterplatz.

Das breite Band der Donau und ihrer Seitengewässer ist besonders in der Zeit des **Vogelzuges** von großer Bedeutung und so manche Rarität kann beobachtet werden. Die im Regelfall eisfreie Donau bietet im Winter Sichtungen von Wasservögeln wie **Schellente**, **Gänsesäger** und vielen anderen Arten.

Beobachten, ohne zu stören

~ Der Nationalpark Donau-Auen, zwischen den Ballungsräumen Wien und Bratislava liegend, wird von zahlreichen Gästen zur Naherholung und Freizeitnutzung frequentiert. Wildtiere und damit auch Vögel reagieren sehr sensibel auf menschliche Annäherungen. Ambitionierte Vogelbeobachterinnen und -beobachter wissen, wie wichtig das **Respektieren der Fluchtdistanz** ist. Häufige Störungen wirken sich extrem negativ auf die Möglichkeiten zur Futtersuche, den Energiehaushalt und Bruterfolg aus.

In allen Bereichen des Nationalpark Donau-Auen ist es daher wichtig, die Wege nicht zu verlassen. Empfohlen wird die **Benützung der markierten Wanderwege**. Sollten Sie mit Ihrem Hund unterwegs sein, ist dieser ausnahmslos an der Leine zu führen. Das Betreten von Wiesen, Wald, Schilf- und Wasserflächen ist verboten. Radfahren ist nur auf den

grün markierten Routen gestattet.

Die Einhaltung der Regelungen wird durch beide Wachorgane, die **Nationalparkaufsicht**, überwacht. Deren Anordnungen ist Folge zu leisten. Wenn bei Ihrem Besuch Übertretungen durch andere Besucherinnen und Besucher auffallen, melden Sie dies bitte unter Tel. 02212/3555 im schlossORTH Nationalpark-Zentrum.

Das Fotografieren ist vom Weg aus erlaubt, das dauerhafte Verweilen und/oder die Errichtung von Unterständen ist verboten, ebenso alle Arten des Anfütterns von Wildtieren. Der Einsatz von Flugmodellen jeglicher Art, darunter fallen auch Drohnen, ist verboten.

Aktuelle und weiterführende Informationen zu den Lebensräumen, der Tier- und Pflanzenwelt und dem Besucherprogramm des Nationalparks finden Sie unter **www.donauauen.at**

A photograph of two people, a man and a woman, standing on a grassy bank next to a body of water. They are both holding binoculars to their eyes, looking across the water. The water reflects the surrounding greenery and reeds. In the background, there is a dense line of tall reeds and trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Beobachtung melden

Melden Sie Ihre Beobachtung online auf **www.ornitho.at** oder direkt im Gebiet mit der **App NaturaList**. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Sammlung von wissenschaftlichen und naturschutzrelevanten Erkenntnissen über unsere Vogelwelt.


Vogelbeobachtungsrouten 1: Hainburg (Donau-Rundwanderweg)


~ Greifvogelfreunde kommen auf dieser Route („Donau-Rundwanderweg“) auf ihre Kosten. Der Rundwanderweg startet beim Hafen in Hainburg. An dieser Stelle kann man besonders im Winter verweilen, um **Möwen** und **Enten** zu bestimmen.

In den warmen Monaten jagen **Flussseeschwalben** oftmals im Hafen oder entlang der Donau. Weiter auf dem schmalen Pfad zwischen Donau und den Hängen des Braunsbergs ist man den Felsformationen der Hainburger Berge besonders nah. Im kurzen Tunnelsystem kann mit etwas Geschick der Brutplatz eines **Hausrotschwanzes** entdeckt werden. Unentdeckt bleibt jedoch der Brutplatz des **Uhus**. Er verrät sich nur durch seinen Gesang im Spätwinter bzw. zeitigen Frühjahr und Herbst.

Der Weg steigt sanft an und bietet einen Blick in die „Altarm-Kasteln“, wo **Eisvogel**, **Graureiher** und **Silberreiher** ganzjährig bei der Jagd beobachtet werden können. Nach einem steileren Anstieg erreicht man die Ruine Rötelsstein, eine ehemalige Raubritterburg. Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick auf die Donau, den Spittelauer Arm und die Stopfenreuther Au. Dieser dynamische Auebereich zieht aufgrund seines Nahrungsreichtums und seiner ruhigen Lage im Winter Jagdgäste wie **Seeadler** und **Kaiseradler** an. Während der Brutzeit sind nur die lokalen Adler-Brutpaare anwesend, dafür mischen sich **Wespenbussard**, **Rotmilan**, **Schwarzmilan** und **Schwarzstorch** unter die „Segelnden“. Oftmals verstärken **Mäusebussard** und **Turmfalke** das Schauspiel.

Die tiefborkigen Eichen sind interessant für **Mittelspecht** und **Kleiber**. Im Sommer durchziehen Rufe der bunten **Bienenfresser** die Luft, die auf den Trockenrasenflächen rund um die Ruine einen besonderen Insektenreichtum vorfinden. Der Rückweg durch den Auwald verspricht im Frühjahr ein Vogelstimmenerlebnis mit u. a. **Buchfink**, **Halsbandschnäpper**, **Mönchsgrasmücke**, **Pirol**, **Sumpfmieze** und **Stieglitz**.





Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Gewicht: ca. 4,4 kg (Männchen)
bis 5,9 kg (Weibchen)

Körperlänge: ca. 77 – 95 cm

Flügelspannweite: 210 – 230 cm

Altvogel: Weißer Schwanz sowie hellbrauner Kopf, der zum dunklen braunen Körper kontrastiert, mächtiger gelber Schnabel, im Flug sehr breite Flügel, kurzer Schwanz und langer Hals.

Jungvögel: Dunkles Erscheinungsbild, 2 – 3jährige Exemplare scheckig, Schnabel teilweise dunkel.

Stimme: Relativ hohe Rufreihe – krick-rick-rick-rick des Männchens, etwas tiefer und dunkler das Weibchen.

Besonderes: Die Balz findet sehr zeitig im Jahr statt – bereits im Jänner können die Seeadlerpaare bei ihren Balzflügen beobachtet werden.

Vogelbeobachtungsroute 2: Zu den Orther Heustadlböden


~ Vogelbeobachter erwartet am „**Orther Schrittweg**“ eine bezaubernde Lebensraumvielfalt und damit auch eine hohe Vogelvielfalt. Am erfolgversprechendsten ist eine **Wanderung während der Brutzeit** zwischen Mitte Mai und Ende Juni.

Beginnend beim Sportplatz verlässt man das Siedlungsgebiet Richtung Westen, begleitet von den Gesängen von **Hausrotschwanz**, **Haussperling**, **Rotkehlchen** und **Girlitz**. An der Wegkreuzung sticht die rund 150 Jahre alte Bildeiche ins Auge – ein Eldorado für Höhlenbrüter wie **Meisen** und **Kleiber**. Man taucht in eine vielfältige Klangkulisse ein, mit herausragenden Stimmen von **Buchfink**, **Mönchsgrasmücke**, **Singdrossel** und **Pirol**. Weiter des Weges finden sich struktur- und totholzreiche Wälder verschiedener Altersklassen, durchsetzt von kleineren Wiesen. **Schwarzspecht** und **Grünspecht** lassen nicht lange auf sich warten.

Schließlich erreicht man die „Heustadlwiese“, einen Trockenrasen der mit dornigen Einzelbüschen und Einzelbäumen wie z. B. Robinien durchsetzt ist. Im Sommer erinnert die Landschaft an die afrikanische Savanne. Rufe von jagenden **Bienenfressern** können den Eindruck verstärken. Sie finden hier einen besonderen Reichtum an Schmetterlingen und anderen Insekten. Davon profitieren auch der unter Schutz stehende **Neuntöter** und der **Wespenbussard**. Die beiden Arten sind typische Brutvögel derartiger Landschaften. Der Neuntöter hat zudem eine spezielle Angewohnheit: Er spießt seine Nahrung an den dornigen Büschen auf und baut in ihnen auch sein

Nest. Ein weiterer klassischer Brutvogel von Trockenrasen ist die mittlerweile seltene **Turteltaube**, deren Bestand europaweit rückläufig ist.

Mäusebussard und **Turmfalke** ziehen oftmals ihre Kreise über die Wiese, auf der Suche nach Kleinsäuget. Auch **Sperber**






sind auf den „Heustadlböden“ gut zu beobachten. Nicht selten steuern **Stockenten** die Wiese an, was vorerst irritierend wirken mag, der Grund ist aber schnell entdeckt: Hier befinden sich die „Heustadlteiche“, stillgelegte Schotterteiche, die von Wasservögeln regelmäßig aufgesucht werden. Kiefern und Pappeln säumen das Gewässer.

Den typischen Gesang der **Goldammer** kann man sich gut einprägen und mit etwas Glück kann man sie auf der Spitze der Einzelbüsche oder in der jungen Streuobstwiese beobachten. Sie ist eine Charakterart der Halboffenlandschaft. Der Weg führt weiter durch eine Geländesenke, einen ehemaligen Seitenarm der Donau, in einen unterwuchsreichen Auwald und vorbei an charakteristischen Silberpappelbeständen. Der Altholz-,

Totholz- und Höhlenreichtum ist nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar, wenn die charakteristische Reviermarkierung und Partnerwerbung von **Halsbandschnäppern** erklingt. Dieser schwarz-weiße Schnäpper ist als spät ankommender Zugvogel auf ein gutes Höhlenangebot angewiesen, denn **Kohlmeisen**, **Blaumeisen** und **Stare** besetzen die Brutplätze viel zeitiger. Nachts durchziehen im Frühjahr und Herbst die eindrucksvollen Gesänge des **Waldkauzes** den Wald, untertags ist er nur schwer nachzuweisen. Potentielle Höhlen- und Spechtbäume sind jedoch auf der Route leicht zu entdecken. Auf dem letzten Abschnitt säumt eine mächtige Silberpappel den Weg. Ein Stück begleitet der Weg den Fadenbach, bevor es wieder zurück ins Siedlungsgebiet geht.



Neuntöter *Lanius collurio*

Gewicht: ca. 22,5 – 35 g (Männchen)
bis 41 g (Weibchen)

Körperlänge: ca. 17 cm

Altvögel: Das Männchen besitzt einen rotbraunen Rücken und eine schwarze Augenmaske, Kopf und Nacken sind aschgrau. Das Weibchen besitzt einen braunen Augenstreif, einen rostroten Oberkopf und Rücken, die Unterseite und Flanken zeigen eine wellenförmige Bänderung.

Jungvögel: Die Jungtiere sehen den Weibchen sehr ähnlich, besitzen jedoch auch oberseits eine Bänderung.

Stimme: Gesang selten, leise schwätzend, sehr variabel, bei Beunruhigung „dschä“-Rufe oder auch gereiht „schak-schak-schak“.

Besonderes: Spießt größere Beutetiere auf Pflanzendornen bzw. -stacheln zur Bevorratung oder zum Zerkleinern auf.



Wespensussard *Pernis apivorus*

Gewicht: ca. 0,7 kg (Männchen)
bis 0,8 kg (Weibchen)

Körperlänge: ca. 52 – 60 cm

Flügelspannweite: ca. 118 – 144 cm

Altvögel: Sehr variabel, hell bis dunkelbraun, leicht mit Mäusebussard zu verwechseln. Typische Schwanzzeichnung: dunkle Endbinde, zwei breitere Binden an der Basis. Hellgelbe Iris. Horizontale Flügelhaltung im Flug (beim Mäusebussard V-förmig). Weibchen besitzen an den Unterseiten der Schwung- und Steuerfedern eine dichtere Bänderung als Männchen.

Jungvögel: Jungtiere sehen juvenilen Mäusebussard ähnlich, jedoch ohne helles Brustband.

Stimme: Langgezogener heller Ruf; „wiehieh“.


Besonderes: Als Nahrung dienen vorwiegend Wespen und deren Larven, die aus dem Boden ausgegraben werden.

Vogelbeobachtungsroute 3: Rundwanderweg Schönau

~ Der Rundwanderweg („Schönauer Donaurunde“) führt durch den wildschönen Auwald bei Schönau an der Donau. Die Wanderung beginnt beim Imbissstand „Radler-Treff“. Über den Schönauer Rückstaudamm gelangt man in den abgedämmten Auwald des Nationalparks und zum unteren Abschnitt des „Kühwörther Wassers“. Dieses ist ein ehemaliger Seitenarm der Donau, das durch die Donauregulierung zu einem Stillgewässer wurde und nun ausgedehnte Schilfbereiche aufweist.

Graureiher und **Silberreiher** sind oft nahrungssuchend am Gewässerrand anzutreffen. Mit etwas Glück kreisen **Seeadler** über dem Auwald. Dieser Teil des Waldes wird nur bei starken Hochwässern überflutet. Weiter führt die Wanderung über den Marchfeldschutzdamm in den donaanahen Teil des Auwaldes. Hier ist der Einfluss der Hochwässer gut sichtbar und man kann hier von einer klassischen „weichen Au“ sprechen. Zwei Brücken führen über den „Schönauer Arm“ zum Ufer der Donau. Durch eine Absenkung des Treppelweges wird dieser Seitenarm wieder regelmäßig durchströmt, was dem Wasser die Möglichkeit gibt, Schotterinseln selbst zu formen. Diese Strukturen sind einer der meistbedrohten Lebensräume Europas und die Schönauer Schotterinseln beherbergen die höchste Dichte an **Flussregenpfeifer**-Revieren an der Oberen Donau. Mit den Brücken als Aussichtspunkte hat man gute Chancen, **Flussregenpfeifer**, **Seeadler**, **Schwarzmilan**, **Flussuferläufer**, **Eisvogel**, **Schwarzspecht**, **Kleinspecht**, **Gänsesäger** u. a. zu beobachten.

Wanderungen sind zu jeder Jahreszeit reizvoll, jedoch lohnt sich ein Besuch zur **Brutzeit im Frühjahr** und zu **Beginn des Sommers** besonders. Zu dieser Zeit können Brutvögel wie **Flussregenpfeifer** und **Eisvogel** in Hochstimmung erlebt werden. Im Winter lassen sich Gäste wie z. B. **Schellenten** und **Kormorane** an der Donau beobachten.





Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Gewicht: ca. 26 – 53 g

Körperlänge: ca. 14 – 17 cm

Altvögel: Oberseits sandbraun, unterseits weiß gefärbt. Prachtkleid: Das Männchen besitzt ein schwarzes Stirnband und eine schwarze Augenbinde, die beim Weibchen mit bräunlichen Federn durchsetzt sind. Gelber Augenring und dunkler Schnabel. Schlichtkleid: Schwarze Partien werden braun.

Jungvögel: Besitzen keinen kontrastreichen Kopf, Federn der Oberseite mit hellen Rändern.

Stimme: Ruf bei Erregung „piu“, Balzruf „rererere...“.

Besonderes: „Rollt“ (läuft) bei der Nahrungssuche sehr schnell und stoppt abrupt ab.



Die Artenliste

~ Die Artenliste führt **304 Vogelarten** an, die bislang im Nationalpark Donau-Auen oder dessen unmittelbarer Nähe nachgewiesen werden konnten. Sie umfasst **Brutvögel, Durchzügler und Wintergäste**. 19 dieser Arten konnten nur im Umland, aber bisher noch nicht im Nationalpark selbst festgestellt werden. Als Brutvögel wurden insgesamt 171 Vogelarten im Gebiet nachgewiesen. Ein beträchtlicher Teil davon, 39 Arten, brütet aktuell nicht mehr im Gebiet. Das liegt vor allem an menschlichen Eingriffen in historischer Zeit – einerseits an den tiefgreifenden landschaftlichen Veränderungen, die Folge der Regulierung der Donau im 19. Jahrhundert waren, und andererseits an der damals starken direkten Verfolgung vieler Großvogelarten. Die aktuelle Brutvogelfauna umfasst somit 132 Vogelarten, davon brüten 113 Arten regelmäßig. Zehn der aktuellen Brutvogelarten brüten derzeit nur im Umland des Nationalparks. Als regel-


mäßige Durchzügler oder Wintergäste kommen 186 Vogelarten vor.

Das hier behandelte Gebiet umfasst die komplette Fläche des Nationalparks (ca. 9.600 ha) sowie das angrenzende Umland. Bei vielen Vogelarten ist eine scharfe Trennung zwischen Nationalpark und Umgebung nicht sinnvoll. Das gilt insbesondere für die Donau und andere Gewässer. „An Land“ existiert zwar oft eine klare Lebensraumgrenze – Nationalpark ist gleich Wald, Umland ist gleich Agrarlandschaft – doch es gibt sowohl Waldflächen, die nicht im Nationalparkgebiet liegen, als auch Nationalparkflächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Hinzu kommt, dass Vögel mobil sind, sodass auch von diesem Gesichtspunkt aus eine weniger strenge Grenzziehung gerechtfertigt ist. Als Richtwert zur Einbeziehung des Umlandes wurde eine Distanz von maximal 1.000 Metern zur Nationalparkgrenze verwendet. Eine Konsequenz der Mitbehandlung des Umlandes ist, dass dadurch für manche Arten eine andere Einstufung zustande kommt als bei alleiniger Betrachtung der Nationalparkfläche.

Weiters wurden einige Arten bis dato noch gar nicht direkt auf Nationalparkgebiet festgestellt. Dies ist in der Liste entsprechend gekennzeichnet. Insbesondere gilt das für Nachweise an der Wiener Donau (Stauration Freudenau, untere Neue Donau).

Die Artenliste beruht überwiegend auf dem Archiv von BirdLife Österreich, in dem seit den 1950er Jahren Vogelbeobachtungen gesammelt werden. Seit dem Jahr 2013 sammelt BirdLife Meldungen mittels der Internet-Plattform **www.ornitho.at**. Daten aus dieser Quelle wurden bis zum Stichtag 9.5.2022 berücksichtigt, insgesamt lieferte ornitho.at für das behandelte Gebiet gut 370.000 Beobachtungen. In vielen Fällen sind diese Meldungen punktgenau verortet. Ein Teil liegt jedoch nur rasterbezogen vor (Raster mit einer Kantenlänge von etwa 615 Metern). Alle Raster, die das behandelte Gebiet auch nur teilweise berührten, wurden in dieser Auswertung verwendet. Das kann

in Einzelfällen dazu führen, dass Nachweise mit einbezogen wurden, die tatsächlich etwas weiter als 1.000 m von der Nationalparkgrenze entfernt liegen. Für sehr selten in Österreich auftretende Vogelarten wurde die jeweilige Einstufung der Meldungen durch die Österreichische Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich berücksichtigt, und zwar bis inklusive den am 14.4.2022 auf deren Website veröffentlichten Entscheidungen (**www.birdlife-afk.at**). Als weitere Quelle wurden die für den Nationalpark relevanten Gebietsbeschreibungen im 2009 publizierten Buch „Important Bird Areas in Österreich“ verwendet. Für historische Nachweise von Vogelarten wurden verschiedene Quellen benutzt. Insbesondere hervorzuheben sind die Publikationen von Kronprinz Rudolf von Österreich sowie das „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“. Nicht zuletzt war die erste Version der Artenliste für den Nationalpark Donau-Auen, die in



den späten 1990er Jahren erschienen ist, eine wichtige Grundlage für die vorliegende Überarbeitung.

Die Reihenfolge und Benennung der hier angeführten Vogelarten richtet sich nach der „Artenliste der Vögel Österreichs“, die im Dezember 2021 von der Österreichischen Avifaunistischen Kommission veröffentlicht worden ist (www.birdlife-afk.at). Die Kommission wiederum folgt in ihrer Liste der IOC „World Bird List“ der International Ornithologists’ Union.

Die verwendete Klassifikation richtet sich nach der im Jahr 2020 publizierten Artenliste der Avifauna des Neusiedler See-Gebiets, wobei dieses System in wenigen Fällen aus praktischen Gründen leicht abgewandelt wurde. Für jede Vogelart ist eine Einstufung zur Häufigkeit oder Regelmäßigkeit als Brutvogel sowie als Durchzügler/Wintergast angegeben. Die dazu verwendeten Kürzel und Definitionen sind

in der Tabelle angeführt. Zur Einstufung wurde für die obersten Klassen (h, mh, s, ss) der Zeitraum 2016 – 2022 herangezogen, für die Klassen u und A der Zeitraum 2003 – 2022 und für die Klassen (A), a und a’ der Zeitraum 1980 – 2022. Zusätzlich wird für fast alle Vogelarten auch das jahreszeitliche Auftreten in vereinfachter Form angegeben. Dafür werden zwölf Felder verwendet, die den zwölf Monaten eines Jahres entsprechen. Für jedes Monat liegt eine Angabe vor, ob und mit welcher Häufigkeit die Art im Gebiet angetroffen werden kann.

	kein Auftreten
	Ausnahme unregelmäßig sehr selten
	selten mäßig häufig
	häufig

	Brut	D/W*	Brut (Paare)		D/W* (Individuen)
			Singvögel	Nicht-singvögel	
häufig	h		>200	>100	>300
mäßig häufig	mh		>50	>20	>30
selten	s		>10	>5	>10
sehr selten (aber mehr oder weniger alljährlich)	ss		<=10	<=5	<=10
unregelmäßig (nicht alljährlich)	u				**
ausnahmsweise	A				***
ausnahmsweise (kein Nachweis seit 1980)		(A)			
ausgestorben (letzte Brut historisch oder vor 1980)	a				
ausgestorben (letzte Brut nach 1980)	a'				
Gefangenschaftsflüchtling oder eingebürgert	/G				
teilweise Gefangenschaftsflüchtling oder eingebürgert	/(G)				
bislang nur außerhalb der Nationalparkgrenzen nachgewiesen	/x				

* Durchzügler & Wintergäste

** in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren nachgewiesen, aber insgesamt mehr als fünf Nachweise

*** maximal fünf Nachweise in den letzten 20 Jahren

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
-----	---	-----	----------------------------

Entenverwandte *Anseriformes*

Kanadagans <i>Branta canadensis</i> Canada Goose		u/G	J F M A M J J A S O N D
Streifengans <i>Anser indicus</i> Bar-headed Goose		A/G	J F M A M J J A S O N D
Graugans <i>Anser anser</i> Greylag Goose	ss/(G)	mh	J F M A M J J A S O N D
Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i> Pink-footed Goose		(A)	J F M A M J J A S O N D
Tundrasaatgans <i>Anser serrirostris</i> Tundra Bean Goose		u	J F M A M J J A S O N D
Blässgans <i>Anser albifrons</i> Greater White-fronted Goose		mh	J F M A M J J A S O N D
Zwerggans <i>Anser erythropus</i> Lesser White-fronted Goose		A	J F M A M J J A S O N D
Trauerschwan <i>Cygnus atratus</i> Black Swan		A/G	J F M A M J J A S O N D
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i> Mute Swan	s	h	J F M A M J J A S O N D
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i> Whooper Swan		u	J F M A M J J A S O N D
Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i> Egyptian Goose		A/G/x	J F M A M J J A S O N D
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i> Common Shelduck		u	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i> Ruddy Shelduck		A/G	J F M A M J J A S O N D
Moschusente <i>Cairina moschata</i> Muscovy Duck		A/G	J F M A M J J A S O N D
Brautente <i>Aix sponsa</i> Wood Duck	A/G	u/G	J F M A M J J A S O N D
Mandarinente <i>Aix galericulata</i> Mandarin Duck		ss/G	J F M A M J J A S O N D
Knäkente <i>Spatula querquedula</i> Garganey	a'	mh	J F M A M J J A S O N D
Löffelente <i>Spatula clypeata</i> Northern Shoveler	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Schnatterente <i>Mareca strepera</i> Gadwall	a	mh	J F M A M J J A S O N D
Pfeifente <i>Mareca penelope</i> Eurasian Wigeon		mh	J F M A M J J A S O N D
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i> Mallard	mh	h	J F M A M J J A S O N D
Spießente <i>Anas acuta</i> Northern Pintail	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Krickente <i>Anas crecca</i> Eurasian Teal	u	mh	J F M A M J J A S O N D
Kolbenente <i>Netta rufina</i> Red-crested Pochard		s	J F M A M J J A S O N D
Tafelente <i>Aythya ferina</i> Common Pochard		mh	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Moorente <i>Aythya nyroca</i> Ferruginous Duck	a	u	J F M A M J J A S O N D
Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i> Ring-necked Duck		A/x	J F M A M J J A S O N D
Reiherente <i>Aythya fuligula</i> Tufted Duck	A	mh	J F M A M J J A S O N D
Bergente <i>Aythya marila</i> Greater Scaup		ss	J F M A M J J A S O N D
Eiderente <i>Somateria mollissima</i> Common Eider		A	J F M A M J J A S O N D
Samtente <i>Melanitta fusca</i> Velvet Scoter		ss	J F M A M J J A S O N D
Trauerente <i>Melanitta nigra</i> Common Scoter		u	J F M A M J J A S O N D
Eisente <i>Clangula hyemalis</i> Long-tailed Duck		u	J F M A M J J A S O N D
Schellente <i>Bucephala clangula</i> Common Goldeneye		mh	J F M A M J J A S O N D
Zwergsäger <i>Mergellus albellus</i> Smew		ss	J F M A M J J A S O N D
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i> Common Merganser	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i> Red-breasted Merganser		ss	J F M A M J J A S O N D
Schwarzkopf-Ruderente <i>Oxyura jamaicensis</i> Ruddy Duck		A/G/x	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i> White-headed Duck		(A)	J F M A M J J A S O N D

Hühnervögel *Galliformes*

Truthuhn <i>Meleagris gallopavo</i> Wild Turkey	a/(G)	A/G	J F M A M J J A S O N D
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i> Grey Partridge	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Fasan <i>Phasianus colchicus</i> Common Pheasant	h/G	h/G	J F M A M J J A S O N D
Pfau <i>Pavo cristatus</i> Indian Peafowl		A/G	J F M A M J J A S O N D
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i> Common Quail	mh	mh	J F M A M J J A S O N D

Nachtschwalbenvögel *Caprimulgiformes*

Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i> European Nightjar	A	u	J F M A M J J A S O N D
--	---	---	-------------------------

Seglervögel *Apodiformes*

Alpensegler <i>Tachymarptis melba</i> Alpine Swift		A/x	J F M A M J J A S O N D
Mauersegler <i>Apus apus</i> Common Swift	s	h	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
-----	---	-----	----------------------------

Trappen *Otidiformes*

Großstrappe <i>Otis tarda</i> Great Bustard	ss/x	A	J F M A M J J A S O N D
--	------	---	-------------------------

Kuckucke *Cuculiformes*

Kuckuck <i>Cuculus canorus</i> Common Cuckoo	h	h	J F M A M J J A S O N D
---	---	---	-------------------------

Tauben *Columbiformes*

Straßentaube <i>Columba livia f. domestica</i> Feral Pigeon	h	h	J F M A M J J A S O N D
Hohltaube <i>Columba oenas</i> Stock Dove	mh	h	J F M A M J J A S O N D
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i> Common Wood Pigeon	h	h	J F M A M J J A S O N D
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i> European Turtle Dove	h	h	J F M A M J J A S O N D
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i> Eurasian Collared Dove	mh	h	J F M A M J J A S O N D

Kranichvögel *Gruiformes*

Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i> Water Rail	s	s	J F M A M J J A S O N D
Wachtelkönig <i>Crex crex</i> Corn Crane	u	u	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i> Spotted Crake	a	u	J F M A M J J A S O N D
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i> Common Moorhen	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Blässhuhn <i>Fulica atra</i> Eurasian Coot	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Zwergsumpfhuhn <i>Zapornia pusilla</i> Baillon's Crake		(A)	J F M A M J J A S O N D
Kleines Sumpfhuhn <i>Zapornia parva</i> Little Crake	A	u	J F M A M J J A S O N D
Kranich <i>Grus grus</i> Common Crane		mh	J F M A M J J A S O N D

Lappentaucher *Podicipediformes*

Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i> Little Grebe	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i> Red-necked Grebe	a	u	J F M A M J J A S O N D
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i> Great Crested Grebe	u	s	J F M A M J J A S O N D
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i> Horned Grebe		ss	J F M A M J J A S O N D
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i> Black-necked Grebe		ss	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
-----	---	-----	----------------------------

Regenpfeifervögel *Charadriiformes*

Triel <i>Burhinus oedicnemus</i> Eurasian Stone-curlew	a	(A)	J F M A M J J A S O N D
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i> Eurasian Oystercatcher		u	J F M A M J J A S O N D
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i> Black-winged Stilt		A	J F M A M J J A S O N D
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i> Pied Avocet		A	J F M A M J J A S O N D
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i> Northern Lapwing	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i> Sociable Lapwing		A/x	J F M A M J J A S O N D
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i> European Golden Plover		u	J F M A M J J A S O N D
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i> Grey Plover		A	J F M A M J J A S O N D
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i> Common Ringed Plover		A	J F M A M J J A S O N D
Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i> Little Ringed Plover	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i> Eurasian Whimbrel		A	J F M A M J J A S O N D
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i> Eurasian Curlew		u	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Pfuhlschnepfe <i>Limosa lapponica</i> Bar-tailed Godwit		(A)	J F M A M J J A S O N D
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i> Black-tailed Godwit		A	J F M A M J J A S O N D
Kampfläufer <i>Calidris pugnax</i> Ruff		u	J F M A M J J A S O N D
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i> Curlew Sandpiper		A	J F M A M J J A S O N D
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i> Temminck's Stint		A	J F M A M J J A S O N D
Sanderling <i>Calidris alba</i> Sanderling		A	J F M A M J J A S O N D
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i> Dunlin		u	J F M A M J J A S O N D
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i> Little Stint		A	J F M A M J J A S O N D
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i> Eurasian Woodcock	a	s	J F M A M J J A S O N D
Zwergschnepfe <i>Lymnocyrtus minimus</i> Jack Snipe		ss	J F M A M J J A S O N D
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i> Common Snipe		ss	J F M A M J J A S O N D
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i> Red-necked Phalarope		A/x	J F M A M J J A S O N D
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i> Common Sandpiper	s	mh	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i> Green Sandpiper	a	mh	J F M A M J J A S O N D
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i> Common Redshank	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i> Marsh Sandpiper		A	J F M A M J J A S O N D
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i> Wood Sandpiper		ss	J F M A M J J A S O N D
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i> Spotted Redshank		u	J F M A M J J A S O N D
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i> Common Greenshank		ss	J F M A M J J A S O N D
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i> Collared Pratincole		(A)	J F M A M J J A S O N D
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i> Black-legged Kittiwake		A	J F M A M J J A S O N D
Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i> Sabine's Gull		A/x	J F M A M J J A S O N D
Lachmöwe <i>Chroicocephalus ridibundus</i> Black-headed Gull	a	h	J F M A M J J A S O N D
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i> Little Gull		ss	J F M A M J J A S O N D
Schwarzkopfmöwe <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> Mediterranean Gull		ss	J F M A M J J A S O N D
Fischmöwe <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i> Pallas's Gull		A/x	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Sturmmöwe <i>Larus canus</i> Common Gull		h	J F M A M J J A S O N D
Ringschnabelmöwe <i>Larus delawarensis</i> Ring-billed Gull		A/x	J F M A M J J A S O N D
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i> Great Black-backed Gull		A	J F M A M J J A S O N D
Polarmöwe <i>Larus glaucoides</i> Iceland Gull		(A)	J F M A M J J A S O N D
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i> European Herring Gull		ss	J F M A M J J A S O N D
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i> Caspian Gull		mh	J F M A M J J A S O N D
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i> Yellow-legged Gull		h	J F M A M J J A S O N D
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i> Lesser Black-backed Gull		ss	J F M A M J J A S O N D
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i> Gull-billed Tern	a	A/x	J F M A M J J A S O N D
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i> Caspian Tern		ss	J F M A M J J A S O N D
Brandseeschwalbe <i>Thalasseus sandvicensis</i> Sandwich Tern		A	J F M A M J J A S O N D
Zwergseeschwalbe <i>Sterna albifrons</i> Little Tern	a	A	J F M A M J J A S O N D
Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i> Common Tern	a	ss	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i> Arctic Tern		A/x	J F M A M J J A S O N D
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i> Whiskered Tern		A	J F M A M J J A S O N D
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i> White-winged Tern	a	A	J F M A M J J A S O N D
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i> Black Tern	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i> Pomarine Jaeger		A/x	J F M A M J J A S O N D
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i> Parasitic Jaeger		A	J F M A M J J A S O N D

Seetaucher *Gaviiformes*

Sterntaucher <i>Gavia stellata</i> Red-throated Loon		ss	J F M A M J J A S O N D
Prachtaucher <i>Gavia arctica</i> Black-throated Loon		ss	J F M A M J J A S O N D
Eistaucher <i>Gavia immer</i> Common Loon		A	J F M A M J J A S O N D
Gelbschnabeltaucher <i>Gavia adamsii</i> Yellow-billed Loon		A/x	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
-----	---	-----	----------------------------

Störche *Ciconiiformes*

Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i> Black Stork	ss	s	J F M A M J J A S O N D
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i> White Stork	s/x	s	J F M A M J J A S O N D

Ruderfüßer *Suliformes*

Zwergscharbe <i>Microcarbo pygmaeus</i> Pygmy Cormorant		ss	J F M A M J J A S O N D
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i> Great Cormorant	a	h	J F M A M J J A S O N D

Pelikanvögel *Pelecaniformes*

Sichler <i>Plegadis falcinellus</i> Glossy Ibis		(A)	J F M A M J J A S O N D
Löffler <i>Platalea leucorodia</i> Eurasian Spoonbill		A	J F M A M J J A S O N D
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i> Eurasian Bittern	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i> Little Bittern	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i> Black-crowned Night Heron	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i> Squacco Heron		A	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i> Western Cattle Egret		A/x	J F M A M J J A S O N D
Graureiher <i>Ardea cinerea</i> Grey Heron	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i> Purple Heron	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Silberreiher <i>Ardea alba</i> Great Egret	a	mh	J F M A M J J A S O N D
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i> Little Egret		ss	J F M A M J J A S O N D
Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i> Great White Pelican		(A)	J F M A M J J A S O N D

Greifvögel *Accipitriformes*

Fischadler <i>Pandion haliaetus</i> Western Osprey	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i> European Honey Buzzard	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i> Griffon Vulture		A	J F M A M J J A S O N D
Schlangenadler <i>Circus gallicus</i> Short-toed Snake Eagle		(A)	J F M A M J J A S O N D
Schreiadler <i>Clanga pomarina</i> Lesser Spotted Eagle	a	A	J F M A M J J A S O N D
Schelladler <i>Clanga clanga</i> Greater Spotted Eagle		A	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Zwergadler <i>Hieraetus pennatus</i> Booted Eagle	a	A	J F M A M J J A S O N D
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i> Eastern Imperial Eagle	ss	ss	J F M A M J J A S O N D
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i> Golden Eagle		A	J F M A M J J A S O N D
Sperber <i>Accipiter nisus</i> Eurasian Sparrowhawk	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Habicht <i>Accipiter gentilis</i> Northern Goshawk	s	s	J F M A M J J A S O N D
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i> Western Marsh Harrier	ss	mh	J F M A M J J A S O N D
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i> Hen Harrier	a	s	J F M A M J J A S O N D
Steppenweihe <i>Circus macrourus</i> Pallid Harrier		A	J F M A M J J A S O N D
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i> Montagu's Harrier	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Rotmilan <i>Milvus milvus</i> Red Kite	ss	s	J F M A M J J A S O N D
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i> Black Kite	ss	s	J F M A M J J A S O N D
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i> White-tailed Eagle	s	s	J F M A M J J A S O N D
Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i> Rough-legged Buzzard		ss	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i> Long-legged Buzzard		A	J F M A M J J A S O N D
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i> Common Buzzard	h	h	J F M A M J J A S O N D

Eulen *Strigiformes*

Schleiereule <i>Tyto alba</i> Western Barn Owl	A	A	J F M A M J J A S O N D
Steinkauz <i>Athene noctua</i> Little Owl	a'	A	J F M A M J J A S O N D
Sperbereule <i>Surnia ulula</i> Northern Hawk-Owl		(A)/x	J F M A M J J A S O N D
Zwergohreule <i>Otus scops</i> Eurasian Scops Owl		A/x	J F M A M J J A S O N D
Waldohreule <i>Asio otus</i> Long-eared Owl	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i> Short-eared Owl	a	A	J F M A M J J A S O N D
Uhu <i>Bubo bubo</i> Eurasian Eagle-Owl	s	s	J F M A M J J A S O N D
Waldkauz <i>Strix aluco</i> Tawny Owl	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Habichtskauz <i>Strix uralensis</i> Ural Owl		A/G	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
-----	---	-----	----------------------------

Hornvögel *Bucerotiformes*

Wiedehopf <i>Upupa epops</i> Eurasian Hoopoe	ss	ss	J F M A M J J A S O N D
---	----	----	---

Rackenvögel *Coraciiformes*

Blauracke <i>Coracias garrulus</i> European Roller	a	A	J F M A M J J A S O N D
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i> Common Kingfisher	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i> European Bee-eater	s	mh	J F M A M J J A S O N D

Spechtvögel *Piciformes*

Wendehals <i>Jynx torquilla</i> Eurasian Wryneck	s	s	J F M A M J J A S O N D
Mittelspecht <i>Dendrocoptes medius</i> Middle Spotted Woodpecker	h	h	J F M A M J J A S O N D
Kleinspecht <i>Dryobates minor</i> Lesser Spotted Woodpecker	h	h	J F M A M J J A S O N D
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i> Syrian Woodpecker	s	s	J F M A M J J A S O N D
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i> Great Spotted Woodpecker	h	h	J F M A M J J A S O N D
Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i> White-backed Woodpecker		A	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i> Black Woodpecker	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Grünspecht <i>Picus viridis</i> European Green Woodpecker	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Grauspecht <i>Picus canus</i> Grey-headed Woodpecker	s	s	J F M A M J J A S O N D

Falken *Falconiformes*

Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i> Common Kestrel	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i> Red-footed Falcon		u	J F M A M J J A S O N D
Merlin <i>Falco columbarius</i> Merlin		ss	J F M A M J J A S O N D
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i> Eurasian Hobby	s	s	J F M A M J J A S O N D
Sakerfalke <i>Falco cherrug</i> Saker Falcon	ss	ss	J F M A M J J A S O N D
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i> Peregrine Falcon		ss	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
-----	---	-----	----------------------------

Sperlingsvögel *Passeriformes*

Neuntöter <i>Lanius collurio</i> Red-backed Shrike	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i> Lesser Grey Shrike	a	A	J F M A M J J A S O N D
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i> Great Grey Shrike	a	ss	J F M A M J J A S O N D
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i> Woodchat Shrike	a	A	J F M A M J J A S O N D
Pirol <i>Oriolus oriolus</i> Eurasian Golden Oriole	h	h	J F M A M J J A S O N D
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i> Eurasian Jay	mh	h	J F M A M J J A S O N D
Elster <i>Pica pica</i> Eurasian Magpie	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i> Spotted Nutcracker		A	J F M A M J J A S O N D
Dohle <i>Coloeus monedula</i> Western Jackdaw	ss/x	h	J F M A M J J A S O N D
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i> Rook	s/x	h	J F M A M J J A S O N D
Rabenkrähe <i>Corvus corone</i> Carrion Crow	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i> Hooded Crow	h	h	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Kolkrabe <i>Corvus corax</i> Northern Raven	ss	s	J F M A M J J A S O N D
Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i> Bohemian Waxwing		u	J F M A M J J A S O N D
Tannenmeise <i>Periparus ater</i> Coal Tit	u	s	J F M A M J J A S O N D
Haubenmeise <i>Lophophanes cristatus</i> European Crested Tit		u	J F M A M J J A S O N D
Sumpfmeise <i>Poecile palustris</i> Marsh Tit	h	h	J F M A M J J A S O N D
Weidenmeise <i>Poecile montanus</i> Willow Tit	u	ss	J F M A M J J A S O N D
Blaumeise <i>Cyanistes caeruleus</i> Eurasian Blue Tit	h	h	J F M A M J J A S O N D
Kohlmeise <i>Parus major</i> Great Tit	h	h	J F M A M J J A S O N D
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i> Eurasian Penduline Tit	s	s	J F M A M J J A S O N D
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i> Bearded Reedling	u	s	J F M A M J J A S O N D
Heidelerche <i>Lullula arborea</i> Woodlark		u	J F M A M J J A S O N D
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i> Eurasian Skylark	h	h	J F M A M J J A S O N D
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i> Crested Lark	s/x	s	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i> Sand Martin	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i> Barn Swallow	mh/x	h	J F M A M J J A S O N D
Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i> Common House Martin	mh/x	h	J F M A M J J A S O N D
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i> Long-tailed Tit	h	h	J F M A M J J A S O N D
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Wood Warbler	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i> Yellow-browed Warbler		A	J F M A M J J A S O N D
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i> Willow Warbler	s	h	J F M A M J J A S O N D
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i> Common Chiffchaff	h	h	J F M A M J J A S O N D
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i> Great Reed Warbler	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Mariskenrohrsänger <i>Acrocephalus melanopogon</i> Moustached Warbler		A	J F M A M J J A S O N D
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Sedge Warbler	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i> Eurasian Reed Warbler	h	h	J F M A M J J A S O N D
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i> Marsh Warbler	mh	mh	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i> Icterine Warbler	h	h	J F M A M J J A S O N D
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i> River Warbler	s	s	J F M A M J J A S O N D
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i> Savi's Warbler	s	s	J F M A M J J A S O N D
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i> Common Grasshopper Warbler	s	s	J F M A M J J A S O N D
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i> Eurasian Blackcap	h	h	J F M A M J J A S O N D
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i> Garden Warbler	s	s	J F M A M J J A S O N D
Sperbergrasmücke <i>Curruca nisoria</i> Barred Warbler	ss	ss	J F M A M J J A S O N D
Klappergrasmücke <i>Curruca curruca</i> Lesser Whitethroat	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Dorngrasmücke <i>Curruca communis</i> Common Whitethroat	h	h	J F M A M J J A S O N D
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapilla</i> Common Firecrest	u	ss	J F M A M J J A S O N D
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i> Goldcrest		mh	J F M A M J J A S O N D
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i> Eurasian Wren	h	h	J F M A M J J A S O N D
Kleiber <i>Sitta europaea</i> Eurasian Nuthatch	h	h	J F M A M J J A S O N D


Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i> Wallcreeper		A	J F M A M J J A S O N D
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i> Eurasian Treecreeper	h	h	J F M A M J J A S O N D
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i> Short-toed Treecreeper	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Rosenstar <i>Pastor roseus</i> Rosy Starling		A	J F M A M J J A S O N D
Star <i>Sturnus vulgaris</i> Common Starling	h	h	J F M A M J J A S O N D
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i> Song Thrush	h	h	J F M A M J J A S O N D
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i> Mistle Thrush	A	mh	J F M A M J J A S O N D
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i> Redwing		mh	J F M A M J J A S O N D
Amsel <i>Turdus merula</i> Common Blackbird	h	h	J F M A M J J A S O N D
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i> Fieldfare		h	J F M A M J J A S O N D
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i> Ring Ouzel		(A)	J F M A M J J A S O N D
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i> Spotted Flycatcher	h	h	J F M A M J J A S O N D
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i> European Robin	h	h	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i> Bluethroat	a'	u	J F M A M J J A S O N D
Sprosser <i>Luscinia luscinia</i> Thrush Nightingale	a	A	J F M A M J J A S O N D
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i> Common Nightingale	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i> Red-breasted Flycatcher		A	J F M A M J J A S O N D
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i> European Pied Flycatcher	A	mh	J F M A M J J A S O N D
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i> Collared Flycatcher	h	h	J F M A M J J A S O N D
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> Black Redstart	h	h	J F M A M J J A S O N D
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Common Redstart	s	mh	J F M A M J J A S O N D
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i> Common Rock Thrush	a/x	(A)/x	J F M A M J J A S O N D
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i> Whinchat	a	s	J F M A M J J A S O N D
Europ. Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i> European Stonechat	mh	mh	J F M A M J J A S O N D
Sibir. Schwarzkehlchen <i>Saxicola maurus</i> Siberian Stonechat		A/x	J F M A M J J A S O N D
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i> Northern Wheatear	A/x	mh	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i> White-throated Dipper		A	J F M A M J J A S O N D
Feldsperling <i>Passer montanus</i> Eurasian Tree Sparrow	h	h	J F M A M J J A S O N D
Haussperling <i>Passer domesticus</i> House Sparrow	h	h	J F M A M J J A S O N D
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i> Duncock	h	h	J F M A M J J A S O N D
Schafstelze <i>Motacilla flava</i> Western Yellow Wagtail	u/x	mh	J F M A M J J A S O N D
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i> Citrine Wagtail		A	J F M A M J J A S O N D
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i> Grey Wagtail	A	mh	J F M A M J J A S O N D
Bachstelze <i>Motacilla alba</i> White Wagtail	h	h	J F M A M J J A S O N D
Brachpieper <i>Anthus campestris</i> Tawny Pipit	a	A	J F M A M J J A S O N D
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i> Meadow Pipit		h	J F M A M J J A S O N D
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i> Tree Pipit	u	mh	J F M A M J J A S O N D
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i> Red-throated Pipit		A	J F M A M J J A S O N D
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i> Water Pipit		mh	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i> Common Chaffinch	h	h	J F M A M J J A S O N D
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i> Brambling		mh	J F M A M J J A S O N D
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i> Hawfinch	h	h	J F M A M J J A S O N D
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Eurasian Bullfinch		h	J F M A M J J A S O N D
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i> Common Rosefinch		A	J F M A M J J A S O N D
Grünling <i>Chloris chloris</i> European Greenfinch	h	h	J F M A M J J A S O N D
Berghänfling <i>Linaria flavirostris</i> Twite		A	J F M A M J J A S O N D
Bluthänfling <i>Linaria cannabina</i> Common Linnet	mh/x	h	J F M A M J J A S O N D
Taigabirkenzeisig <i>Acanthis flammea</i> Common Redpoll		u/x	J F M A M J J A S O N D
Alpenbirkenzeisig <i>Acanthis cabaret</i> Lesser Redpoll		u	J F M A M J J A S O N D
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i> Red Crossbill		ss	J F M A M J J A S O N D
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i> European Goldfinch	h	h	J F M A M J J A S O N D
Girlitz <i>Serinus serinus</i> European Serin	mh	mh	J F M A M J J A S O N D

Art	B	D/W	Jahreszeitliches Auftreten
Erlenzeisig <i>Spinus spinus</i> Eurasian Siskin		mh	J F M A M J J A S O N D
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i> Lapland Longspur		(A)	J F M A M J J A S O N D
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i> Snow Bunting		A	J F M A M J J A S O N D
Grauummer <i>Emberiza calandra</i> Corn Bunting	u	u	J F M A M J J A S O N D
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i> Yellowhammer	h	h	J F M A M J J A S O N D
Zippammer <i>Emberiza cia</i> Rock Bunting		A	J F M A M J J A S O N D
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i> Ortolan Bunting		A	J F M A M J J A S O N D
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i> Common Reed Bunting	mh	mh	J F M A M J J A S O N D



Index (Deutsch)

A

Adlerbussard 34
Alpenbirkenzeisig 44
Alpensegler 23
Alpenstrandläufer 27
Amsel 41
Austernfischer 26

B

Bachstelze 43
Bartmeise 38
Baumfalke 36
Baumpieper 43
Bekassine 27
Bergente 22
Bergfink 44
Berghänfling 44
Bergpieper 43
Beutelmeise 38
Bienenfresser 5, 8, 35
Blässhuhn 20
Blässhuhn 25
Blaukehlchen 42
Blaumeise 38
Blauracke 35
Bluthänfling 44
Blutspecht 35
Brachpieper 43
Brandgans 20
Brandseeschwalbe 29
Braunkehlchen 42
Brautente 21
Bruchwasserläufer 28
Buchfink 8, 10, 44
Buntspecht 35

D

Dohle 37
Dorngrasmücke 40
Dreizehenmöwe 28
Drosselrohrsänger 39
Dunkler Wasserläufer 28

E

Eichelhäher 37
Eiderente 22
Eisente 22
Eistaucher 30
Eisvogel 4, 8, 14, 35
Elster 37
Erlenzeisig 45
Europ. Schwarzkehlchen 42

F

Fasan 23
Feldlerche 38
Feldschwirl 40
Feldsperling 43
Fichtenkreuzschnabel 44

Fischadler 32
Fischmöwe 28
Fitis 39
Flussregenpfeifer 4, 14, 15, 26
Flussseeschwalbe 8, 29
Flussuferläufer 14, 27

G

Gänsegeier 5, 14, 32
Gänsesäger 5, 14, 22
Gartenbaumläufer 41
Gartengrasmücke 40
Gartenrotschwanz 42
Gebirgsstelze 43
Gelbbrauen-Laubsänger 39
Gelbschnabeltaucher 30
Gelbspötter 40
Gimpel 44
Girrlitz 10, 44
Goldammer 11, 45
Goldregenpfeifer 26
Grauammer 45
Graugans 20
Graureiher 8, 14, 32
Grauschnäpper 41
Grauspecht 36
Großer Brachvogel 26
Großtrappe 24
Grünling 44
Grünschenkel 28
Grünspecht 10, 36

H

Habicht 33
Habichtskauz 34
Halsbandschnäpper 5, 8, 42
Haubenlerche 38
Haubenmeise 38
Haubentaucher 25
Hausrotschwanz 8, 10, 42
Haussperling 10, 43
Heckenbraunelle 43
Heidelerche 38
Heringsmöwe 29
Höckerschwan 20
Hohltaube 24

K

Kaiseradler 5, 8, 33
Kampfläufer 27
Kanadagans 20
Karmingimpel 44
Kernbeißer 44
Kiebitz 26
Kiebitzregenpfeifer 26
Klappergrasmücke 40
Kleiber 5, 8, 10, 40
Kleines Sumpfhuhn 25
Kleinspecht 14, 35

Knärente 21
Kohlmeise 11, 38
Kolbenente 21
Kolkkrabe 38
Kormoran 14, 31
Kornweihe 33
Kranich 25
Krickente 21
Kuckuck 24
Kuhreiher 32
Kurzschnabelgans 20
Küstenseeschwalbe 30

L

Lachmöwe 28
Lachseeschwalbe 29
Löffelente 21
Löffler 31

M

Mandarinente 21
Mantelmöwe 29
Marikenrohrsänger 39
Mauerläufer 41
Mauersegler 23
Mäusebussard 8, 10, 13, 34
Mehlschwalbe 39
Mertin 36
Misteldrossel 41
Mittelmeermöwe 29
Mittelsäger 22
Mittelspecht 8, 35
Mönchsgrasmücke 8, 10, 40
Moorente 22
Moschusente 21

N

Nachtigall 42
Nachtreiher 31
Nebelkrähe 37
Neuntöter 10, 12, 37
Nilgans 20

O

Odinshühnchen 27
Ohrentaucher 25
Ortolan 45

P

Pfau 23
Pfeifente 21
Pfuhlschnepfe 27
Pirol 8, 10, 37
Polarmöwe 29
Prachtaucher 30
Purpureiher 32

R

Rabenkrähe 37
Rallenreier 31
Raubseeschwalbe 29
Raubwürger 37
Rauchschwalbe 39
Raufußbussard 33
Rebhuhn 23
Regenbrachvogel 26
Reiherente 22
Ringdrossel 41
Ringeltaube 24
Ringschnabelente 22
Ringschnabelmöwe 29
Rohrhammer 45
Rohrdommel 31
Rohrschwirl 40
Rohrweihe 33
Rosapelikan 32
Rosenstar 41
Rostgans 21
Rotdrossel 41
Rotflügel-Brachschwalbe 28
Rotfußfalke 36
Rothalstaucher 25
Rotkehlchen 10, 41
Rotkehlpieper 43
Rotkopfwürger 37
Rotmilan 8, 33
Rotschenkel 28

S

Saatkrähe 37
Säbelschnäbler 26
Sakerfalke 36
Samtente 22
Sanderling 27
Sandregenpfeifer 26
Schafstelze 43
Schelladler 32
Schellente 5, 22
Schilfrohrsänger 39
Schlagschwirl 40
Schlangenadler 32
Schleiereule 34
Schmarotzerraubmöwe 30
Schnatterente 21
Schneeammer 45
Schreiadler 32
Schwalbenmöwe 28
Schwanzmeise 39
Schwarzhalstaucher 25
Schwarzkopfmöwe 28
Schwarzkopf-Ruderente 22
Schwarzmilan 8, 14, 33
Schwarzspecht 10, 14, 36
Schwarzstirnwürger 37
Schwarzstorch 3, 9, 31
Seedler 3, 8, 9, 14, 33

Seidenreier 32
Seidenschwanz 38
Sibir. Schwarzkehlchen 42
Sichelstrandläufer 27
Sichler 31
Silbermöwe 29
Silberreier 8, 14, 32
Singdrossel 10, 41
Singschwan 20
Sommergoldhähnchen 40
Spatelraubmöwe 30
Sperber 10, 33
Sperbereule 34
Sperbergrasmücke 40
SpieBente 21
Spornammer 45
Sprosser 42
Star 11, 41
Steinadler 33
Steinkauz 34
Steinrötel 42
Steinschmätzer 42
Stelzenläufer 26
Steppenkiebitz 26
Steppenmöwe 29
Steppenweihe 33
Sterntaucher 30
Stieglitz 8, 44
Stockente 11, 21
Straßentaube 24
Streifengans 20
Sturmmöwe 29
Sumpfmeise 8, 38
Sumpfohreule 34
Sumpfrohrsänger 39

T

Tafelente 21
Taigabirkenzeisig 44
Tannenhäher 37
Tannenmeise 38
Teichhuhn 25
Teichrohrsänger 39
Teichwasserläufer 28
Temminckstrandläufer 27
Trauerente 22
Trauerschnäpper 42
Trauerschwan 20
Trauerseeschwalbe 30
Triel 26
Truthuhn 23
Tundrasaatgans 20
Tüpfelsumpfhuhn 25
Türkentaube 24
Turmfalke 8, 10, 36
Turteltaube 10, 24

U

Uferschnepfe 27
Uferschwalbe 39
Uhu 8, 34

W

Wacholderdrossel 41
Wachtel 23
Wachtelkönig 24
Waldbaumläufer 41
Waldkauz 11, 34
Waldlaubsänger 39
Waldohreule 34
Waldschnepfe 27
Waldwasserläufer 28
Wanderfalke 36
Wasseramsel 43
Wasserralle 24
Weidenmeise 38
Weißbart-Seeschwalbe 30
Weißflügel-Seeschwalbe 30
Weißkopf-Ruderente 23
Weißrückenspecht 35
Weißstorch 31
Wendehals 35
Wespenbussard 8, 10, 13, 32
Wiedehopf 35
Wiesenpieper 43
Wiesenweihe 33
Wintergoldhähnchen 40

Z

Zaunkönig 40
Ziegenmelker 23
Zilpzalp 39
Zippammer 45
Zitronenstelze 43
Zwergadler 33
Zwergdommel 31
Zwerggans 20
Zwergmöwe 28
Zwergohreule 34
Zwergsäger 22
Zwergscharbe 31
Zwergschnäpper 42
Zwergschnepfe 27
Zwergseeschwalbe 29
Zwergstrandläufer 27
Zwergsumpfhuhn 25
Zwergtaucher 25

Index (wissenschaftlich)

A

Acanthis cabaret 44
Acanthis flammea 44
Accipiter gentilis 33
Accipiter nisus 33
Acrocephalus arundinaceus 39
Acrocephalus melanopogon 39
Acrocephalus palustris 39
Acrocephalus schoenobaenus 39
Acrocephalus scirpaceus 39
Actitis hypoleucos 27
Aegithalos caudatus 39
Aix galericulata 21
Aix sponsa 21
Alauda arvensis 38
Alcedo atthis 35
Alopochen aegyptiaca 20
Anas acuta 21
Anas crecca 21
Anas platyrhynchos 21
Anser albifrons 20
Anser anser 20
Anser brachyrhynchus 20
Anser erythropus 20
Anser indicus 20
Anser serrirostris 20
Anthus campestris 43
Anthus cervinus 43
Anthus pratensis 43
Anthus spinoletta 43
Anthus trivialis 43
Apus apus 23
Aquila chrysaetos 33
Aquila heliaca 33
Ardea alba 32
Ardea cinerea 32
Ardea purpurea 32
Ardeola ralloides 31
Asio flammeus 34
Asio otus 34
Athene noctua 34
Aythya collaris 22
Aythya ferina 21
Aythya fuligula 22
Aythya marila 22
Aythya nyroca 22

B

Bombicilla garrulus 38
Botaurus stellaris 31
Branta canadensis 20
Bubo bubo 34
Bubulcus ibis 32
Bucephala clangula 22
Burhinus oedionemus 26
Buteo buteo 34
Buteo lagopus 33
Buteo rufinus 34

C

Cairina moschata 21
Calcarius lapponicus 45
Calidris alba 27
Calidris alpina 27
Calidris ferruginea 27
Calidris minuta 27
Calidris pugnax 27
Calidris temminckii 27
Caprimulgus europaeus 23
Carduelis carduelis 44
Carpodacus erythrinus 44
Certhia brachydactyla 41
Certhia familiaris 41
Charadrius dubius 15, 26
Charadrius hiaticula 26
Chlidonias hybrida 30
Chlidonias leucopterus 30
Chlidonias niger 30
Chloris chloris 44
Chroicocephalus ridibundus 28
Ciconia ciconia 31
Ciconia nigra 31
Cinclus cinclus 43
Circus aeruginosus 32
Circus aeruginosus 33
Circus macrourus 33
Circus pygargus 33
Clanga clanga 32
Clanga pomarina 32
Clangula hyemalis 22
Coccothraustes coccothraustes 44
Coloeus monedula 37
Columba livia f. domestica 24
Columba oenas 24
Columba palumbus 24
Coracias garrulus 35
Corvus corax 38
Corvus cornix 37
Corvus corone 37
Corvus frugilegus 37
Coturnix coturnix 23
Crex crex 24
Cuculus canorus 24
Currucula communis 40
Currucula curruca 40
Currucula nisoria 40
Cyanistes caeruleus 38
Cygnus atratus 20
Cygnus cygnus 20
Cygnus olor 20

D

Delichon urbicum 39
Dendrocopos leucotos 35
Dendrocopos major 35
Dendrocopos syriacus 35

Dendrocoptes medius 35
Dryobates minor 35
Dryocopus martius 36

E

Egretta garzetta 32
Emberiza calandra 45
Emberiza cia 45
Emberiza citrinella 45
Emberiza hortulana 45
Emberiza schoeniclus 45
Erithacus rubecula 41

F

Falco cherrug 36
Falco columbarius 36
Falco peregrinus 36
Falco subbuteo 36
Falco tinnunculus 36
Falco vespertinus 36
Ficedula albicollis 42
Ficedula hypoleuca 42
Ficedula parva 42
Fringilla coelebs 44
Fringilla montifringilla 44
Fulica atra 25

G

Galerida cristata 38
Gallinago gallinago 27
Gallinula chloropus 25
Garrulus glandarius 37
Gavia adamsii 30
Gavia arctica 30
Gavia immer 30
Gavia stellata 30
Gelochelidon nilotica 29
Glareola pratincola 28
Grus grus 25
Gyps fulvus 32

H

Haematopus ostralegus 26
Haliaeetus albicilla 33
Hieraaetus pennatus 33
Himantopus himantopus 26
Hippolais icterina 40
Hirundo rustica 39
Hydrocoloeus minutus 28
Hydroprogne caspia 29

I

Ichthyaetus ichthyaetus 28
Ichthyaetus melanocephalus 28
Ixobrychus minutus 31

J

Jynx torquilla 35

L

Lanius collurio 37
Lanius excubitor 37
Lanius minor 37
Lanius senator 37
Larus argentatus 29
Larus cachinnans 29
Larus canus 29
Larus delawarensis 29
Larus fuscus 29
Larus glaucooides 29
Larus marinus 29
Larus michahellis 29
Limosa lapponica 27
Limosa limosa 27
Linaria cannabina 44
Linaria flavivestris 44
Locustella fluviatilis 40
Locustella luscinioides 40
Locustella naevia 40
Lophophanes cristatus 38
Loxia curvirostra 44
Lullula arborea 38
Luscinia luscinia 42
Luscinia megarhynchos 27
Luscinia svecica 42
Lymnocyrtus minimus 27

M

Mareca penelope 21
Mareca strepera 21
Melanitta fusca 22
Melanitta nigra 22
Meleagris gallopavo 23
Mergellus albellus 22
Mergus merganser 22
Mergus serrator 22
Merops apiaster 35
Microcarbo pygmaeus 31
Milvus migrans 33
Milvus milvus 33
Monticola saxatilis 42
Motacilla alba 43
Motacilla cinerea 43
Motacilla citreola 43
Motacilla flava 43
Muscicapa striata 41

N

Netta rufina 21
Nucifraga caryocatactes 37
Numenius arquata 26
Numenius phaeopus 26
Nycticorax nycticorax 31

O

Oenanthe oenanthe 42
Oriolus oriolus 37
Otis tarda 24

Otus scops 34
Oxyura jamaicensis 22
Oxyura leucocephala 23

P

Pandion haliaetus 32
Panurus biarmicus 38
Parus major 38
Passer domesticus 43
Passer montanus 43
Pastor roseus 41
Pavo cristatus 23
Pelecanus onocrotalus 32
Perdix perdix 23
Periparus ater 38
Pernis apivorus 13, 32
Phalacrocorax carbo 31
Phalaropus lobatus 27
Phasianus colchicus 23
Phoenicurus ochruros 42
Phoenicurus phoenicurus 42
Phylloscopus collybita 39
Phylloscopus inornatus 39
Phylloscopus sibilatrix 39
Phylloscopus trochilus 39
Pica pica 37
Picus canus 36
Picus viridis 36
Platalea leucorodia 31
Plectrophenax nivalis 45
Plegadis falcinellus 31
Pluvialis apricaria 26
Pluvialis squatarola 26
Podiceps auritus 25
Podiceps cristatus 25
Podiceps grisegena 25
Podiceps nigricollis 25
Poecile montanus 38
Poecile palustris 38
Porzana porzana 25
Prunella modularis 43
Pyrrhula pyrrhula 44

R

Rallus aquaticus 24
Recurvirostra avosetta 26
Regulus ignicapilla 40
Regulus regulus 40
Remiz pendulinus 38
Riparia riparia 39
Rissa tridactyla 28

S

Saxicola maurus 42
Saxicola rubetra 42
Saxicola rubicola 42
Scolopax rusticola 27
Serinus serinus 44
Sitta europaea 40

Somateria mollissima 22
Spatula clypeata 21
Spatula querquedula 21
Spinus spinus 45
Stercorarius parasiticus 30
Stercorarius pomarinus 30
Sterna hirundo 29
Sterna paradisaea 30
Stemula albigularis 29
Streptopelia decaocto 24
Streptopelia turtur 24
Strix aluco 34
Strix uralensis 34
Stumus vulgaris 41
Sumia ulula 34
Sylvia atricapilla 40
Sylvia borin 40

T

Tachybaptus ruficollis 25
Tachymarpis melba 23
Tadorna ferruginea 21
Tadorna tadorna 20
Thalasseus sandvicensis 29
Tichodroma muraria 41
Tringa erythropus 28
Tringa glareola 28
Tringa nebularia 28
Tringa ochropus 28
Tringa stagnatilis 28
Tringa totanus 28
Troglodytes troglodytes 40
Turdus iliacus 41
Turdus merula 41
Turdus philomelos 41
Turdus pilaris 41
Turdus torquatus 41
Turdus viscivorus 41
Tyto alba 34

U

Upupa epops 35

V

Vanellus gregarius 26
Vanellus vanellus 26

X

Xema sabini 28

Z

Zapornia parva 25
Zapornia pusilla 25

Index (English)

A

Alpine Swift 23
Arctic Tern 30

B

Baillon's Crake 25
Bar-headed Goose 20
Barn Swallow 39
Barred Warbler 40
Bar-tailed Godwit 27
Bearded Reedling 38
Black-crowned Night Heron 31
Black-headed Gull 28
Black Kite 33
Black-legged Kittiwake 28
Black-necked Grebe 25
Black Redstart 42
Black Stork 31
Black Swan 20
Black-tailed Godwit 27
Black Tern 30
Black-throated Loon 20
Black-winged Stilt 26
Black Woodpecker 36
Bluethroat 42
Bohemian Waxwing 38
Booted Eagle 33
Brambling 44

C

Canada Goose 20
Carriion Crow 37
Caspian Gull 29
Caspian Tern 29
Citrine Wagtail 43
Coal Tit 38
Collared Flycatcher 42
Collared Pratincole 28
Common Blackbird 41
Common Buzzard 34
Common Chaffinch 44
Common Chiffchaff 39
Common Crane 25
Common Cuckoo 24
Common Eider 22
Common Firecrest 40
Common Goldeneye 22
Common Grasshopper Warbler 40
Common Greenshank 28
Common Gull 29
Common House Martin 39
Common Kestrel 36
Common Kingfisher 35
Common Linnet 44
Common Loon 30
Common Merganser 22
Common Moorhen 25
Common Nightingale 42
Common Pheasant 23

Common Pochard 21
Common Quail 23
Common Redpoll 44
Common Redshank 28
Common Redstart 42
Common Reed Bunting 45
Common Ringed Plover 26
Common Rock Thrush 42
Common Rosefinch 44
Common Sandpiper 27
Common Scoter 22
Common Shelduck 20
Common Snipe 27
Common Starling 41
Common Swift 23
Common Tern 29
Common Whitethroat 40
Common Wood Pigeon 24
Corn Bunting 45
Corn Crane 24
Crested Lark 38
Curlew Sandpiper 27

D

Dunlin 27
Dunnock 43

E

Eastern Imperial Eagle 33
Egyptian Goose 20
Eurasian Bittern 31
Eurasian Blackcap 40
Eurasian Blue Tit 38
Eurasian Bullfinch 44
Eurasian Collared Dove 24
Eurasian Coot 25
Eurasian Curlew 26
Eurasian Eagle-Owl 34
Eurasian Golden Oriole 37
Eurasian Hobby 36
Eurasian Hoopoe 35
Eurasian Jay 37
Eurasian Magpie 37
Eurasian Nuthatch 40
Eurasian Oystercatcher 26
Eurasian Penduline Tit 38
Eurasian Reed Warbler 39
Eurasian Scops Owl 34
Eurasian Siskin 45
Eurasian Skylark 38
Eurasian Sparrowhawk 33
Eurasian Spoonbill 31
Eurasian Stone-curlew 26
Eurasian Teal 21
Eurasian Tree Sparrow 43
Eurasian Treecreeper 41
Eurasian Whimbrel 26
Eurasian Wigeon 21
Eurasian Woodcock 27

Eurasian Wren 40
Eurasian Wryneck 35
European Bee-eater 35
European Crested Tit 38
European Golden Plover 26
European Goldfinch 44
European Greenfinch 44
European Green Woodpecker 36
European Herring Gull 29
European Honey Buzzard 32
European Nightjar 23
European Pied Flycatcher 42
European Robin 41
European Roller 35
European Serin 44
European Stonechat 42
European Turtle Dove 24

F

Feral Pigeon 24
Ferruginous Duck 22
Fieldfare 41

G

Gadwall 21
Garden Warbler 40
Garganey 21
Glossy Ibis 31
Goldcrest 40
Golden Eagle 33
Great Black-backed Gull 29
Great Bustard 24
Great Cormorant 31
Great Crested Grebe 25
Great Egret 32
Great Grey Shrike 37
Great Reed Warbler 39
Great Spotted Woodpecker 35
Great Tit 38
Great White Pelican 32
Greater Scaup 22
Greater Spotted Eagle 32
Greater White-fronted Goose 20
Green Sandpiper 28
Grey Heron 32
Grey Partridge 23
Grey Plover 26
Grey Wagtail 43
Grey-headed Woodpecker 36
Greylag Goose 20
Griffon Vulture 32
Gull-billed Tern 29

H

Hawfinch 44
Hen Harrier 33
Hooded Crow 37
Horned Grebe 25
House Sparrow 43

I

Iceland Gull 29
Icterine Warbler 40
Indian Peafowl 23

J

Jack Snipe 27

L

Lapland Longspur 45
Lesser Black-backed Gull 29
Lesser Grey Shrike 37
Lesser Redpoll 44
Lesser Spotted Eagle 32
Lesser Spotted Woodpecker 35
Lesser White-fronted Goose 20
Lesser Whitethroat 40
Little Bittern 31
Little Crane 25
Little Egret 32
Little Grebe 25
Little Gull 28
Little Owl 34
Little Ringed Plover 26
Little Stint 27
Little Tern 29
Long-eared Owl 34
Long-legged Buzzard 34
Long-tailed Duck 22
Long-tailed Tit 39

M

Mallard 21
Mandarin Duck 21
Marsh Sandpiper 28
Marsh Tit 38
Marsh Warbler 39
Meadow Pipit 43
Mediterranean Gull 28
Merlin 36
Middle Spotted Woodpecker 35
Mistle Thrush 41
Montagu's Harrier 33
Moustached Warbler 39
Muscovy Duck 21
Mute Swan 20

N

Northern Goshawk 33
Northern Hawk-Owl 34
Northern Lapwing 26
Northern Pintail 21
Northern Raven 38
Northern Shoveler 21
Northern Wheatear 42

O

Ortolan Bunting 45

P

Pallas's Gull 28
Pallid Harrier 33
Parasitic Jaeger
Peregrine Falcon 36
Pied Avocet 26
Pink-footed Goose 20
Pomarine Jaeger 30
Purple Heron 32
Pygmy Cormorant 31

R

Red Crossbill 44
Red Kite 33
Red-backed Shrike 37
Red-breasted Flycatcher 42
Red-breasted Merganser 22
Red-crested Pochard 21
Red-footed Falcon 36
Red-necked Grebe 25
Red-necked Phalarope 27
Red-throated Loon 30
Red-throated Pipit 43
Redwing 41
Ring Ouzel 41
Ring-billed Gull 29
Ring-necked Duck 22
River Warbler 40
Rock Bunting 45
Rook 37
Rosy Starling 41
Rough-legged Buzzard 33
Ruddy Duck 22
Ruddy Shelduck 21
Ruff 27

S

Sabine's Gull 28
Saker Falcon 36
Sand Martin 39
Sanderling 27
Sandwich Tern 29
Savi's Warbler 40
Sedge Warbler 39
Short-eared Owl 34
Short-toed Snake Eagle 32
Short-toed Treecreeper 41
Siberian Stonechat 42
Smew 22
Snow Bunting 45
Sociable Lapwing 26
Song Thrush 41
Spotted Crane 25
Spotted Flycatcher 41
Spotted Nutcracker 37
Spotted Redshank 28
Squacco Heron 31
Stock Dove 24
Syrian Woodpecker 35

T

Tawny Owl 34
Tawny Pipit 43
Temminck's Stint 27
Thrush Nightingale 42
Tree Pipit 43
Tufted Duck 22
Tundra Bean Goose 20
Twite 44

U

Ural Owl 34

V


Velvet Sooter 22

W

Wallcreeper 41
Water Pipit 43
Water Rail 24
Western Barn Owl 34
Western Cattle Egret 32
Western Jackdaw 37
Western Marsh Harrier 33
Western Osprey 32
Western Yellow Wagtail 43
Whinchat 42
Whiskered Tern 30
White Stork 31
White Wagtail 43
White-backed Woodpecker 35
White-headed Duck 23
White-tailed Eagle 33
White-throated Dipper 43
White-winged Tern 30
Whooper Swan 20
Wild Turkey 23
Willow Tit 38
Willow Warbler 39
Wood Duck 21
Wood Sandpiper 28
Wood Warbler 39
Woodchat Shrike 37
Woodlark 38

Y

Yellow-billed Loon 30
Yellow-browed Warbler 39
Yellow-legged Gull 29
Yellowhammer 45



Impressum

Herausgeber: Nationalpark Donau-Auen GmbH & BirdLife Österreich, Ges. f. Vogelkunde

Koordination: Bernadette Strohmaier

Autorinnen/Autoren Texte: Christina Nagl, Matthias Kuhn, Norbert Teufelbauer

Autorinnen/Autoren Artenliste: Norbert Teufelbauer & Benjamin Schedl, basierend auf der von Andreas Ranner, Eva Karner-Ranner und Thomas Zuna-Kratky erstellten Erstversion

Fotos: Kern, Kovacs, Kreinz, Kucs, Kudich, Leitner, Neumair, Roland, Schneider, Zeman.

Karten: [www.projektblatt.at/Angela Batik](http://www.projektblatt.at/Angela%20Batik)

Gestaltung: SchneeAufMoss, **Druck:** Janetschek, **Auflage:** 5.000 Stk.

Stand: Oktober 2022

Teufelbauer, N., Nagl, C., Kuhn, M., Schedl, B & B. Strohmaier,

2022: Artenliste der Vogelwelt des Nationalpark Donau-Auen.

Nationalpark Donau-Auen & BirdLife Österreich, Orth an der Donau & Wien



gedruckt nach den Richtlinien des
Österreichischen Umweltzeichens,
Druckerei Janetschek GmbH
UW-Nr. 637

MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH UND DER EUROPÄISCHEN UNION



LE 14-20
Entwicklung für eine lebensfähige Natur

Europäischer
Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung
des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Birdlife Österreich - Projektberichte](#)

Jahr/Year: 2023

Band/Volume: [32 2023](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Artenliste der Vogelwelt im Nationalpark Donau-Auen 1-52](#)