

VOLKER HALBRITTER

Anmerkungen zur Mykorrhizabindung und Verbreitung von *Rozites caperatus*

Der Reispilz bzw. Zigeuner ist in Mitteleuropa vor allem ein Mykorrhizapilz von *Pinus*, aber auch von *Picea* und *Fagus*. Er meidet nährstoffreiche Böden und besitzt eine große Toleranz gegenüber verschiedenen Feuchtstufen des Bodens. Trockene Standorte im Flachland (z.B. Flechten-Kiefernwald) werden ebenso besiedelt wie moorige Fichtenbestände in Gebirgslage. Im Erzgebirge gehört die Art inzwischen zu den Besonderheiten. Deswegen möchte ich meine Funde der letzten Jahre in knapper Form zur Kenntnis geben und auch auf eigene Funde außerhalb Mitteleuropas hinweisen:

- Tschechische Republik, Erzgebirge, Gottesgabener Spitzberg, N-Hang, Moorfichtenwald zusammen mit *Cortinarius collinitus*, ca. 1040 m NN.

- Tschechische Republik, Erzgebirge, Hochmoor westlich von „Velky mocal“, bei *Pinus mugo*, ca. 930 m NN.

- Tschechische Republik, Erzgebirge, bei Jeleni, Bergbauhalde, *Picea*-Bestand, ca. 920 m NN.

- Polen, Ostseeküste, bei Leba, mooriger Kiefernwald mit *Ledum palustre*.

Im borealen bis subarktischen Bereich habe ich die Art bisher mit *Betula tortuosa* und *B. nana* assoziiert gefunden (Schwedisch Lappland), des Weiteren mit *Betula spec.* (Alaska) und *Pinus pumila* (Kamtschatka).

Anschrift des Verfassers:

VOLKER HALBRITTER, Pfarrgasse 11, D-09456 Annaberg-Buchholz



Abb. 3: *Rozites caperatus* auf einer Halde bei Jeleni / Tschechien (Foto: V. HALBRITTER).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Boletus - Pilzkundliche Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 2008/09

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Halbritter Volker

Artikel/Article: [Anmerkungen zur Mykorrhizabindung und Verbreitung von *Rozites caperatus* 131](#)