



Hymenialsetae von *Onnia leporina* (a) und *O. triquetra* (b), ca 1200 x vergr.

Literatur

- BENKERT, D. (1978): Die Porlinge und Schichtpilze der Potsdamer Umgebung. *Gleditschia* 5: 165 — 202.
- ČERNÝ, A. (1974): Bionomy chorose *Onnia circinata* (FR.) P. KARST. jeho hospodárský význam a rozšírení v Československu. *Lesnictví* 20: 203 — 218.
- JAHN, H. (1978): Die Gattung *Onnia* P. KARST., Filzporlinge. *Westfäl. Pilzbriefe* 11: 79 — 93.

Dr. D. BENKERT

Bereich Botanik und Arboretum des Museums für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin
DDR-1195 Berlin-Baumschulenweg, Späthstraße 80/81

Kartierung von Großpilzen

Wir bitten alle Mitarbeiter, an der neuen Kartierungsliste (*Boletus* II/2, p. 29) folgende Änderungen anzubringen:

Gruppe I:

Phaeolepiota aurea, Glimmerschüppling, ist zu streichen und in die Gruppe III einzufügen.

Gruppe II:

Armillaria luteovirens (ALB. et SCHW. ex FR.) GILL. ist besser als *Tricholoma luteovirens* (ALB. et SCHW. ex FR.) RICKEN (= *Tricholoma apium* J. SCHFF.) zu bezeichnen. Vgl. hierzu MICHAEL/HENNIG/KREISEL, Bd. III, Nr. 218!

Gruppe III:

Albatrellus „ocinus“ ist durch *Albatrellus ovinus* zu ersetzen.

H. KREISEL, D. BENKERT, H. DÖRFELT

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Boletus - Pilzkundliche Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Kreisel Hanns, Benkert Dieter, Dörfelt Heinrich

Artikel/Article: [Kartierung von Großpilzen 31](#)