

17. (Hym. Vespidae) – Die Norwegische Wespe *Dolichovespula norwegica* (FABRICIUS, 1781) eine im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) weitere, seltene Faltenwespenart.

Die Kurzmitteilung von mir im BOMBUS über den Fund der im Norden Deutschlands seltenen Kuckuckswespenart *Dolichovespula adulterina* (BUYSSON, 1905) am 26.06.2005 in Horst/IZ endete mit der Aussage, dass ich die Norwegische Wespe im Kreis Steinburg bisher nicht fand (LANGE 2006). Es sollte noch 13 Jahre dauern, bis mir der Nachweis der Art *norwegica* gelang. Bei großer Hitze flog am 17.07.2018 ein Exemplar in der Nähe eines Holzstapels im inneren Waldrand des Schierenwaldes bei Lockstedt/IZ. Im Flug sehen sich die Faltenwespenarten *Vespula rufa* und *D. norwegica* sehr ähnlich. Verwechslungen im Feld sind also möglich. Unter dem Mikroskop ist aber der Unterschied Kurzkopfwespe (*Vespula*) zu Langkopfwespe (*Dolichovespula*) gut zu erkennen.

Die Norwegische Wespe gilt in der Norddeutschen Tiefebene als Seltenheit (WOYDAK, 2006). Sie wird bei VAN DER SMISSEN (2001) als extrem selten mit bis zu drei Fundorten in Schleswig-Holstein ab 1975 und als Waldart genannt. Das „Nest wird stets im Freien, am Boden oder in Bodennähe, im Gebüsch, in Erdvertiefungen oder zwischen Baumwurzeln, abschüssigen moosdurchsetzten Waldwiesen gebaut. Selten wird es an Gebäuden oder Felsvorsprüngen und noch seltener unter die Erde in Mäuselöcher gebaut (WOYDAK, 2006).

LITERATUR:

- LANGE, L. (2006): Die Falsche Kuckuckswespe *Dolichovespula adulterina* (BUYSSON, 1905) eine im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) seltene Faltenwespenart. – BOMBUS 3: 70-71, Faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland: 284.
- SMISSEN, J. VAN DER (2001): Die Wildbienen und Wespen Schleswig-Holsteins – Rote Liste. Hrsg.: LLUR, Flintbek: 138 S.
- WOYDAK, H. (2006): Die Faltenwespen von Nordrhein-Westfalen (Hymenoptera, Vespoidea; Vespidae und Eumenidae) (Soziale Papier- und Lehmwespen). – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 68(1): 133 S.

Manuskripteingang 10.07.2019

LUTZ LANGE, Wewelsfleth

18. (Col. Dermestidae) – *Dermestes (Dermestinus) erichsoni* GANGLBAUER, 1904 beim Kiefernspinner (*Dendrolimus pini* (LINNAEUS, 1758)) – Neuigkeiten zur Ökologie einer seltenen Speckkäferart.

Die Gattung *Dermestes* ist geprägt durch eine hohe Diversität. Weltweit finden sich circa 100 valide Taxa, etwa die Hälfte gehört zur Untergattung *Dermestinus*. Aus Deutschland wurden bislang circa 20 Taxa der Gattung *Dermestes* nachgewiesen. Dreiviertel davon gehören zur Untergattung *Dermestinus*. In diesen Zusammenhang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [BOMBUS - Faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 2018-2022

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Lange Lutz

Artikel/Article: [\(Hym. Vespidae\) - Die Norwegische Wespe *Dolichovespula norwegica* \(Fabricius, 1781\) eine im Kreis Steinburg \(Schleswig-Holstein\) weitere, seltene Faltenwespenart](#)
[89](#)