

Zur Synonymie der europäischen Tipuliden

(Dipt.) II ¹⁾

Von

BERNHARD MANNHEIMS, Bonn

Nach Überprüfung von Typen- und Originalexemplaren bisher beschriebener europäischer Tipuliden stelle ich folgende Synonymien fest:

Gattung *Pales* Meig. 1800

(= *Nephrotoma* Meig. 1803 = *Pachyrhina* Macq. 1834)

- P. chromicolor* (Pierre) 1919 (v!) = *euchroma* (Mik) 1874
P. zonata (Pierre) 1919 (v!) = *luteata* (Wiedem.) 1818
P. bichroma (Pierre) 1924 (v!) = *flavipalpis* (Meig.) 1830 (v!)
P. appendiculata (Pierre) 1919 (v!) = *maculata* (Meig.) 1804 (v!)

Bemerkung: Im Muséum National d'Histoire Naturelle Paris — ich verdanke die Untersuchung der Sammlungen Meigen, Macquart und Pierre der freundlichen Mithilfe von Herrn Dir. E. Séguy — stecken unter Nr. 372 (die Nummern im Kasten entsprechen denen der handschriftlichen Artenlisten Meigens) 1 ♂ und 2 ♀, von denen ein ♂ ♀ von Meigens Hand mit „*maculosa*“ bezettelt ist.

Ich benütze die Gelegenheit, auch das Überprüfungsergebnis der anderen, bisher zweifelhaft oder ungedeutet gebliebenen Arten nach den Originalstücken der Coll. Meigen anzufügen:

P. picta (Meig.) 1838 (v!), 373, 1 ♀ ohne Abdomen, = *lunulicornis* (Schumm.) 1833

[und nicht *scurra* (Meig.) 1818 (v!).]

P. histrio (Meig.) 1818 (v!) = *flavescens* (Linn.) 1758

Sowohl ♂ als auch ♀, mit „*Tipula histrio*“ bezettelt, zeigen matte Krücke der praescutalen Seitenstreifen, sind also jene Art, die für *flavescens* Linn. gehalten wird (und nicht *submaculosa* (Edw.) 1928).

P. cornicina (Meig.) (nec Linn.) (v!) = *maculata* (Meig.) 1804 (v!)

In Coll. Meigen steckt unter Nr. 376 1 ♂ mit Meigens handschriftl. Etikett „*cornicina* (4 *faria*) ♂“, das *maculata* Mg. (und nicht *flavescens* L.) ist. Daneben ein ♂ ohne Determinationsetikett (Nr. 919/40) ist *lunulicornis* Schumm.

P. dentata (Meig.) 1838 (v!) = *quadrifaria* (Meig.) 1804

In Coll. Meigen steckt unter Nr. 377 mit handschriftl. Determinations-Etikett „*Tipula dentata*“ ein ♀. Ich vermisse in der Meigenschen Sammlung eine mit *quadrifaria* bezettelte Art, was sich wohl daraus erklärt, daß Meigen (1830, Syst. Besch. VI: 286) *quadrifaria* „wohl ziemlich gewiß“ für *cornicina* Linn. hielt. Nach der Originalbeschreibung aber (S. B. I: 199-200, in der Meigen das charakteristische Flügelmerkmal „Spitze und bisweilen auch die Queradern braun angelaufen“ angibt) ist *quadrifaria* von allen späteren Autoren einheitlich gedeutet worden.

P. sannio (Meig.) 1838 (v!) = *cornicina* (Linn.) 1758

Unter Nr. 371 stecken 3 ♂ und 1 ♀; das Determinationszettel tragende ♂ ♀ leider ohne Abdomen.

P. imperialis (Meig.) 1818 (v!) = *scalaris* (Wiedem.) 1813

Das einzige unter Nr. 367 steckende ♀ trägt Meigens handschriftliches Etikett „Berlin imperialis“.

368 „*crocata* ♀“, 369 „*pratensis* ♂“, 370 *flavipalpis* ♀ sowie 374 „*Limnobia scurra* Hffmg. *dorsalis* F.“ (ein ♂) entsprechen der allgemeinen Deutung.

Die Originalstücke von *P. luteata* und *scalaris* — von Wiedemann aus der Sammlung von Hoffmannsegg beschrieben — sind nicht in Coll. Meigen.

Anschrift des Verfassers: Dr. B. MANNHEIMS, (22c) Bonn a. Rh., Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig.

¹⁾ Als Fortsetzung von I in: Bonn. zool. Beitr. 1951, p. 139-140.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bonn zoological Bulletin - früher Bonner Zoologische Beiträge.](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Mannheims Bernhard J.

Artikel/Article: [Zur Synonymie der europäischen Tipuliden \(Dipt.\) II 228](#)