

**Sept nouveaux Cérambyciens (Col.) de Chine
du Musée Alexander Koenig, Bonn**

Par

MAURICE PIC, Paris

Lemula inaequalicollis n. sp.

Oblong, peu brillant, à longue pubescence grise écartée, à coloration d'un roux brunâtre avec les élytres plus clairs, dessous des premiers articles des antennes et partie des cuisses rousseâtre. Tête à forte ponctuation, sillonnée entre les yeux et impressionnée sur le vertex. Thorax plus long que large, plus étroit en avant qu'en arrière, non tuberculé latéralement, muni d'un sillon longitudinal et antérieurement d'un autre transversal, marqué d'une dépression postérieure qui est impressionnée sur son milieu, à ponctuation forte un peu rapprochée. Elytres bien plus larges que le thorax, assez longs, brièvement rétrécis à l'extrémité à ponctuation irrégulière, diversement grosse et peu écartée.

Longueur: 8 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 6-IV-1938, J. Klapperich. — Nombreux Paratypes.

Toxotus griseopubens n. sp.

Allongé, atténué postérieurement, opaque, noir, orné d'une pubescence dense grise, les élytres ayant de petites costules pubescentes qui tranchent un peu sur le reste de la pubescence. Tête un peu creusée entre les yeux et sur le vertex. Thorax court, impressionné transversalement et diversement au milieu, à faible tubercule latéral. Elytres bien plus larges que le thorax à la base, progressivement atténués en arrière, brièvement déhiscent au sommet.

Long. 18 mm. Holotype: Nord Yunnan: A-tun-tse, 4000 m, 17-VIII-1936, H. Höne. — Trois Paratypes.

Rhondia bicoloripes n. sp.

Oblong, très brillant, glabre, de coloration générale testacée avec les membres, moins la base des cuisses largement testacée, noirs. Thorax ayant un profond sillon antérieur et les angles antérieurs marqués; la partie postérieure, qui est subglobuleuse, bombée, dépourvue de tubercule, présente une trace de sillon transversal postérieur et cet organe est finement et éparsément ponctué. Elytres courts et larges, peu rétrécis en arrière, tronqués-subarrondis au sommet, à ponctuation assez fine et écartée, ayant, sur chaque étui, une impression présuturale antérieure et les épaules munies d'une épine pointue.

Long. 14 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 4-IV-1938, J. Klapperich. — Un Paratype.

Strangalia klapperichi n. sp.

Etroit et allongé, avec les élytres très rétrécis sur leur moitié apicale, presque opaque, pubescent de gris, noir, abdomen en majeure partie testacé (les trois premiers segments sont diversement marqués de noir sur les côtés), élytres jaunes, à suture très étroitement noire, avec deux macules noires, une antérieure isolée de la suture, une prémédiane qui la joint, en surplus une bordure postérieure noire. Antennes testacées, à premier article noir, les articles deux à sept marqués de foncé au sommet, les huit à dix clairs et le dernier noir. Quatre pattes antérieures plutôt claires avec les tarse ou tibias en partie rembrunis, pattes postérieures foncées avec la base des cuisses largement et genoux testacés. Tête longue ayant les yeux n'atteignant pas la base, d'où tempes courtes, densément ponctuée, à fine ligne brillante entre les yeux. Thorax long, plus étroit en avant, à sillon transversal antérieur peu profond, à angles postérieurs peu saillants, densément ponctué. Elytres longs, bien plus larges que le thorax à la base, très rétrécis à partir du milieu, un peu déhiscents au sommet, à ponctuation pas très forte et peu rapprochée. Abdomen débordant les élytres, étroit à l'extrémité (non cupuliforme) aplati et tronqué à l'apex.

Long. 19 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 20-VI-1938, J. Klapperich.

Strangalina invittaticollis n. sp. ¹⁾

Très étroit et allongé avec les élytres très rétrécis postérieurement; presque opaque, à pubescence jaunâtre, testacé, abdomen taché de noir sur son milieu et au sommet, élytres ornés d'une macule prémédiane latérale, d'une autre apicale et d'un trait externe postérieur noirs, à antennes noires, premiers articles teintés de testacé en dessous, grêles, de la longueur du corps. Tête très détachée du thorax, yeux grands, touchants les bords postérieurs, d'où tempes nulles. Thorax long, sinué latéralement, très rétréci en avant avec un faible sillon transversal antérieur, angles postérieurs non saillants. Élytres, à la base, bien plus larges que le thorax, très longs, un peu étranglés vers le milieu, ces organes étant très étroits postérieurement et chaque étui apparaissant un peu divariqué au sommet. Dernier segment dorsal de l'abdomen long, dépassant les élytres, cupuliforme, non entaillé en dessous, ayant un appendice clair plat, incisé au milieu.

Long. 18 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 10-VI-1938, J. Klapperich. — 6 Paratypes.

Ressemble un peu à *vittaticollis* Pic, s'en distingue par le thorax entièrement clair, les élytres plus rétrécis postérieurement et les antennes noires.

¹⁾ Cette espèce et la suivante, par leur forme allongée et étroite, les élytres très amincis postérieurement, conjointement à la structure abdominale de forme allongée et spéciale (au moins chez le ♂) dans sa terminaison, peut constituer un sous-genre nouveau pour lequel je propose le nom de *Pygostrangalia* subgen. n.

Strangalina fukienensis n. sp.

Très étroit et allongé avec les élytres très rétrécis postérieurement, presque opaque, éparsément pubescent de gris, dessous testacé avec les côtés de la poitrine et aussi du premier segment de l'abdomen, noirs, dessus noir, devant de la tête, une ligne sur le vertex et le milieu du thorax testacés, élytres testacés avec une bordure suturale étroite noire et une autre plus large latérale, celle-ci éloignée de la base. Membres grêles, testacés, derniers articles des antennes marqués de foncé, tibias intermédiaires à ligne brune, pattes postérieures en majeure partie foncées avec la base des cuisses largement testacée. Tête très large, yeux grands, touchant le bord postérieur d'où tempes nulles. Thorax assez long, plus étroit en avant, sans sillon transversal, angles postérieurs peu marqués, à ponctuation fine et dense. Élytres ayant la même forme que chez l'espèce précédente mais un peu plus courts et plus largement débordés par l'abdomen, ces organes à ponctuation assez forte et écartée. Dernier segment de l'abdomen assez analogue à celui de l'espèce précédente mais entièrement clair.

Long. 19 mm. Holotype: Kuantun (Fukien), 8-VI-1938, J. Klapperich.

Parait se rapprocher de *St. lineaticollis* Gressitt avec une forme plus gracile, le dessin noir des élytres étant linéolé et non maculiforme.

Cleomenes semilineatus n. sp.

Long et étroit, presque mat, très densément pubescent de blanc jaunâtre en dessous, en dessus avec l'avant-corps orné en partie d'une pubescence dorée, les élytres étant brièvement et éparsément pubescents de gris. Coloration générale noire avec les élytres jaunes ayant une bande suturale noire étroite et, latéralement, les dessins noirs suivants sur chaque étui: une bande humérale antérieure, une bordure latérale à contours internes irréguliers, se joignant à une macule antémédiane une fascie oblique antéapicale qui remonte sur la suture, et une tache transversale préapicale. Membres testacés, cuisses postérieures un peu rembrunies sur leur massue. Tête avec les yeux plus larges que le thorax, densément ponctuée, en majeure partie revêtue d'une pubescence dorée. Thorax long et étroit, subsinué latéralement, densément ponctué, revêtu d'une pubescence dorée qui ne laisse en dessus de chaque côté qu'une large portion noire glabre. Élytres un peu plus larges que le thorax, plus larges sur la base, très longs, à ponctuation forte et écartée.

Long. 10 mm. Holotype: Kuantun (Fukien), 18-IV-1938, J. Klapperich.

Voisin de *longipennis* Gressitt, et en différent, au moins comme variété, par le dessin noir irrégulier sur les côtés des élytres et la massue des cuisses postérieures en partie rembrunie.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bonn zoological Bulletin - früher Bonner Zoologische Beiträge.](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Sept nouveaux Cérambyciens \(Col.\) de Chine du Musée Alexander Koenig, Bonn 75-77](#)