

dein stipite protruso rupta, partim in pileo remanens verrucaeformis; partiale annulus superus, membranaceus, reflexus. Stipes centralis, e floccis plus minus contextis farctus, dein subcavus, squamoso-fibrillosus, basi incrassatus. Pileus disco carnosus, margine tenuis, e campanulato-planus, subverrucosus: verrucis discretis, mollibus, secedentibus; epidermide diu irrigata viscosa. Lamellae postice attenuatae, liberae, antice latiores, ventricosae confertae, parum inaequales, sub anthesi denticulatae. Color varius, lamellarum potissimum albus. Amant loca sylvarum umbrosa, temperaturam minus frigidam et solum humosum. Fine aestati et autumno optime vigent.

* Stipite basi volva distincta cincto, apice nudo: *Agaricus (Amanita) griseus* Sadl. Pileo planiusculo murino laevi, margine sulcato, lamellis arcuatis stipiteque solido albis, volva lata, cylindrica, mediocri, alba.

In fagetis et quercetis circa Batsko C. Zempliniensis mensibus Sept. et Oct. 2—3 poll. Sapor et odor gratus.

A g. (A m.) *Neesii* Sadl. Solitaria; pileo haemisphaerico subumbonato eleganter flavo, lamellis et stipite solido deorsum incrassato, albis; volva ampla laxa, alutacea, alba, intus pileo concolore.

Alt. 3—5 poll. Fungum pulcherrimum et distinctissimum inter fagos Com. Zemplinensis ad Gálszécs Septembri invenit Sadler.

** Stipite basi volva oblitterata, apice annulo cincto.

A g. (A m.) *Partsii* Sadl. Tota candida; pileo pulvinato, stipite bulboso, super bulbo cavo, bulbo globoso.

In sylvis montis Dargo Com. Zemplinensis mense Sept. Alt. 3—4-poll. Singularis haec species volvam habet obsoletam sicut Ag. muscarius, et annulum distinctissimum tenuem flaccidum

fixum; stipes elongatus est, supra bulbum ad pileum usque cavus; bulbus solidus nucleus, quasi secundarium bulbum, continet.

Systematisches Verzeichniss aller seit Thunberg in Japan gesammelten Pflanzen.

(Sir William Hooker theilt im Anhange zu C. P. Hodgson's „A Residence at Nagasaki and Hakodate in 1859—1860. London, Bentley, 1862. 8vo. min.“ — ein systematisches Verzeichniss aller seit Thunberg bekannt gewordenen Japanischen Pflanzen mit, das auf seine Anregung von Herrn Black, dem Curator des Kewer Herbariums zusammengestellt ward, und auf die Arbeiten Siebold's und Zuccarini's, Blume's, Decaisne's, A. Gray's und Kunze's fußt. Es umfasst im Ganzen etwa 1600 Phanerogamen und Farne. Auf unser Anrathen hat sich Herr Black dazu verstanden, sein Verzeichniss nochmals durchzusehen und manches Fehlende einzutragen. Einzelnes fand sich noch in Zollinger's Systematischem Verzeichniss, Schott's Synopsis Aroidearum, den von Wilford auf der Insel Tsus-Sima, in der Strasse von Correa gemachten Sammlungen u. s. w., so dass die Totalsumme der Pflanzen auf etwa 1714 Phanerogamen und Farne steigt. Lichenes sind bis jetzt noch nicht von dort veröffentlicht.

Da wir noch immer keine Flora von Japan besitzen, so dürfte dieses Verzeichniss allen Systematikern als wichtiger Anhaltspunkt zu weiteren Forschungen willkommen sein.

Red. der Bonplandia.)

Ranunculaceae.

- Clematis paniculata*, Thbg.
- fusca, Turcz.
- Sieboldii*, Don.
- biternata, DC.
- japonica*, Thbg.
- florida, Thbg.
- stans, S. et Z.
- Williamsii*, A. Gray.
- patens, Morren et DCne.
- (caerulea, Lindl.)
- Flammula*, L.
- apiifolia, A. Gray.
- Thalictrum rubellum*, S. et Z.
- actaeifolium, S. et Z.
- hypoleuca, S. et Z.
- affine, Led.
- Thunbergii*, DC.
- Anemone cernua*, Thbg.
- japonica, S. et Z.
- umbrosa, Led.

Anemone altaica, Fisch.

- baikalensis, Turcz.
- narcissiflora, L.
- dichotoma, L.
- Hepatica*, Gaertn.
- pennsylvanica, L.
- Adonis sibirica*, Patr.
- Ranunculus japonicus*, Thbg.
- asiaticus, Thbg.
- ternatus, Thbg.
- auricomus, Thbg.
- sceleratus, L.
- repens, L.
- propinquus, L.
- var. hirsutus.
- Caltha palustris*, L.
- Trollius*, sp.
- Coptis trifolia*, Salisb.
- brachypetala, S. et Z.
- anemonaeifolia, S. et Z.
- Isopyrum japonicum*, S. et Z.

Anemonopsis macrophylla, S. et Z.

- Aquilegia Bürgeriana*, S. et Z.
- flabellata, S. et Z.
- Aconitum chinense*, Sieb.
- japonicum, Thbg.
- Cimicifuga foetida*, L.
- racemosa, Bart.
- cordifolia, Psh.
- Trautvetteria japonica*, S. et Z.
- Actaea spicata*, L.
- Pityrospurma acerina*, S. et Z.
- obtusilobum, S. et Z.
- biternatum, S. et Z.
- Paeonia Moutan*, Sims.
- officinalis, L.
- albiflora, Pall.
- Glaucidium palmatum*, S. et Z.
- Magnoliaceae.*
- Illicium religiosum*, S. et Z.
- Bürgeria stellata*, S. et Z.
- obovata, S. et Z.

Bürgeria salicifolia, S. et Z.
 Magnolia hypoleuca, S. et Z.
 var. concolor.
 Kobus, Dene.
 parviflora, S. et Z.
 Michelia, sp.

Berberidaceae.
 Berberis Thunbergii, DC.
 vulgaris, Thbg.
 japonica, S. et Z.
 Nandina domestica, Thbg.
 Epimedium Muschianum, DC.
 macranthum, Dene.
 violaceum, Dene.
 Ikariso, Sieb.
 Aceranthus diphyllus, Dene.
 sagittatus, S. et Z.
 Caulophyllum thalictroides, Mich.
 Diphylleia cymosa, Mich.

Schizandraceae.
 Kadsura japonica, S. et Z.
 (Uvaria japonica, Thbg.)
 Sphaerostemma repandum, S. et Z.
 (Trochostigma repandum, S. et Z.)
 japonicum, A. Gray.
 (Maximowiczia chinensis, Rupr.?)

Menispermaceae.
 Cocculus japonicus, DC.
 Thunbergii, DC.
 Stephania hernandifolia, Walp.

Lardizabaleae.
 Akebia quinata, Dene.
 lobata, Dene.
 clematifolia, S. et Z.
 quercifolia, S. et Z.
 Stauntonia hexaphylla, Dene.

Nymphaeaceae.
 Nelumbium speciosum, Willd.
 Euryale ferox, Salisb.
 Nymphaea, 2 spp.
 Nuphar japonica, DC.

Papaveraceae.
 Papaver somniferum, L.
 Rhoes, L.
 Chelidonium majus, L.
 Hylomeeon vernale, Max.
 (Chelidonium uniflorum, S. et Z.)

Fumariaceae.
 Pteridophyllum racemosum, S. et Z.
 Eucapnos spectabilis, S. et Z.
 (Diclytra spectabilis, DC.)
 Dicentra pusilla, S. et Z.
 Corydalis ambigua, Cham.
 decumbens, Pers.
 incisa, Pers.
 heterocarpa, S. et Z.
 pallida, Pers.
 linearifolia, S. et Z.
 orthoceras, S. et Z.

Cruciferae.
 Nasturtium amphibium, L.
 officinale, R. Br.
 palustre, DC.
 Cardamine scutata, Thbg.
 (trifolia, Thbg.)
 Impatiens, L.
 macrophylla, Willd.
 Draba nemoralis, Ehrb.
 (muralis, Thbg.)
 Capsella Bursa Pastoris, Moench.
 Brassica chinensis, L.
 (orientalis, Thbg.)
 Rapa, L.
 Sinapis cernua, Thbg.
 japonica, Thbg.
 Raphanus sativus, L.
 Arabis hirsuta, Scop.
 lyrata, L.
 japonica, A. Gray.
 alpina, L. var.
 Turritis glabra, L.
 Matthiola annua, Sweet.

Capparideae.
 Gynandropsis viscosa, Bunge.

Bixaceae.
 Hisingera japonica, S. et Z.

Violaceae.
 Viola canina, L.
 imberbis, Led.
 Patrinii, DC.
 sylvatica, Fries.
 verecunda, A. Gray.
 palustris, L.
 japonica, Langsd.
 Gmeliniana, R. et S.
 var. glabra, Led.
 grypoceras, A. Gray.
 laciniosa, A. Gray.
 Selkirkii, Pursh.

Polygalaceae.
 Salomonia striata, Juss.
 Polygala japonica, Houtt.

Pittosporaceae.
 Pittosporum Tobira, Ait.

Caryophylleae.
 Stellaria uliginosa, L.
 (undulata, Thbg.)
 media, L.
 modesta, Fzl.
 Dianthus japonicus, Thbg.
 chinensis, L.
 Caryophyllus, L.?
 superbus, L.
 Silene firma, S. et Z.
 Lychnis grandiflora, Jacq.
 Senno, S. et Z.
 Chalcedonicum, L.
 Honckenya peploides, Ehrh.
 Moehringia lateriflora, Fenzl.

Sagina maxima, A. Gray.
 Malachium aquaticum, Fries.
 Arenaria serpyllifolia, L.
 Cerastium viscosum, L.
 Fischerianum, Seringe.
 Mollugo stricta, L.

Lineae.
 Linum, 2 spp.

Malvaceae.
 Malva Mauritia, L. ?
 ruderalis, Blume.
 Urena morifolia, DC. ?
 Althaea rosea, L.
 Hibiscus Hamabo, S. et Z.
 mutabilis L. ?
 syriacus, L.
 Gossypium herbaceum, Thbg.

Sterculiaceae.
 Sterculia japonica.

Elaeocarpeae.
 Elaeocarpus photiniaefolius, Hook.
 japonicus, S. et Z.

Tiliaceae.
 Tilia, 2 spp.
 Corchoropsis crenata, S. et Z.

Buettneriaceae.
 Pentapetes phoenicea, Thbg.

Ternstroemiacae.
 Ternstroemia japonica, Thbg.
 microcarpa, Turcz.
 dasyanthera, Turcz.
 Eurya japonica, Thbg.
 chinensis, Br.
 littoralis, Sieb.
 microphylla, Sieb.
 uniflora, Sieb.
 hortensis, Sieb.
 montana, Sieb.
 Cleyera japonica, Thbg.
 Mertensiana, S. et Z.
 Ochnacea, DC.
 (Japonica, S. et Z., non Thbg.)
 Stuartia monadelpha, S. et Z.
 Camellia japonica, L.
 Sasanqua, Thbg.
 Thea chinensis, L.
 maliflora, Seem.
 (Camellia maliflora Lindl.
 C. rosaeflora, Hook.)
 Actinidia callosa, Lindl.
 (Kalomikta, Rupr.
 Trochostigma arguta, S. et Z.
 rufa, S. et Z.)
 polygama.
 (Trochostigma polygama, S. et Z.)
 volubilis.
 (Trochistigma volubilis, S. et Z.)
 Stachyurus praecox, S. et Z.

Aurantiaceae.
 Aegle sepiaria, L.

- (*Citrus trifolia*, Thbg.)
Citrus japonicus, Thbg.
aurantium, L.
Decumana, L.
Olacineae.
Schoepfia jasminodora, S. et Z.
Hypericineae.
Hypericum patulum, Thbg.
 (*Norysca patula*, Bl.)
salicifolium, S. et Z.
 (*Norysca salicifolia*, Bl.)
erectum, Thbg.
chinense? L.
japonicum, Thbg.
 (*Brathys japonica*, Bl.)
monogynum, L.
perforatum, L.
 var. *elatum*.
Brathys laxa, Bl.
Roscyna japonica, Bl.
Elodea japonica, Bl.
 crassifolia, Bl.
Acerineae.
Acer distylum, S. et Z.
palmatum, Thbg.
carpinifolium, S. et Z.
crataegifolium, S. et Z.
rufinerve, S. et Z.
micranthum, S. et Z.
japonicum, Thbg.
pictum, Thbg.
trifidum, Thbg.
polymorphum, S. et Z.
sessilifolium, S. et Z.
dissectum, Thbg.
 2 spp., undescribed.
Negundo cissifolium, S. et Z.
Coriarieae.
Coriaria japonica, A. Gray.
Sapindaceae.
Sapindus Mukorossi, Gaertn.
Koelreuteria paniculata, Laxm.
Aesculus chinensis, Bunge.
 turbinata, Blume.
 dissimilis, A. Gray.
Meliosmeae.
Meliosma rigida, S. et Z.
 myriantha, S. et Z.
Meliaceae.
Melia Azederach, L.
 Toosendau, S. et Z.
 japonica, Don.
Piptosacea hypophyllantha, Turcz.
Ampelideae.
Ampelopsis tricuspidata, S. et Z.
 heterophylla, S. et Z.
 2 vars.
 japonica, S. et Z.
Vitis vinifera, L.
 flexuosa, Thbg.
- Vitis japonica*, S. et Z.
 Thunbergii, S. et Z.
 (*ficifolia*, Bunge.)
Cissus viticifolia, S. et Z.
 japonica, Bl.
 pentaphylla, Willd.
 Thunbergii, S. et Z.
Geraniaceae.
Geranium Thunbergii, S. et Z.
 erianthum, Fisch.
Oxalideae.
Oxalis corniculata, L.
 Acetosella, L.
Balsamineae.
Impatiens Balsamina, Thbg.
 Noli-tangere, L.
Zygophylleae.
Zygophyllum, sp., S. et Z.
Rutaceae.
Boenninghausenia albiflora, Steud.
Ruta graveolens, L.
Diosmeae.
Dictamnus, vix a *D. Fraxinella* di-
 versus.
Zanthoxyleae.
Zanthoxylum piperitum, DC.
 schinifolium, S. et Z.
 ailanthoides, S. et Z.
 planispinum, S. et Z.
 serrulatum, Bl.?
Boymia rutaecarpa, A. Juss.
Skimmia japonica, Thbg.
Evodia ramiflora, A. Gray.
Simarubaceae.
Picrasma japonica, A. Gray.
Celastrineae.
Elaeodendron, sp.
Celastrus articulatus, Thbg.
 punctatus, Thbg.
 Orixa, S. et Z.
 striatus, Thbg.
Euonymus japonicus, Thbg.
 Sieboldianus, Blume.
 Thunbergianus, Bl.
 (*Celastrus alatus*, Thbg.)
Melanocarya alata, Turcz.)
 subtriflorus, Blume.
 Hamiltonianus, Wall.
 latifolius, Mill.?
Euscaphis staphyleoides, S. et Z.
 simplicifolia, S. et Z.
Staphylea Bumalda, S. et Z.
Aquifoliaceae.
Ilex crenata, Thbg.
 macrophylla, Bl.
 integra, Thbg.
 latifolia, Thbg.
 rotunda, Thbg.
 serrata, Thbg.
- Ilex Aquifolium*, L.
 var. *heterophylla*.
Iaevigata, Bl.
Rhamneae.
Rhamnus globosus, Bunge.
 crenatus, S. et Z.
 catharticus, L.
Hovenia dulcis, Thbg.
Berchemia racemosa, S. et Z.
Zizyphus sinensis, Lam.
 nitida, Roxb.
Paliurus Aubletia, R. et S.?
Terebinthaceae.
Rhus semialata, Murr.
 javanica, L. (cult.)
 succedanea, L.
 sylvestris, S. et Z.
 verniciifera, DC.
Toxicodendron, L. var.
Juglandaceae.
Platycarya strobilacea, S. et Z.
 (*Fortunea chinensis*, Lindl.)
Pterocarya sorbifolia, S. et Z.
 rhoifolia, S. et Z.
Juglans, 3 spp.
Leguminosae.
Thermopsis fabacea, DC.
Crotalaria eriantha, S. et Z.
Lotus corniculatus, L.
Medicago lupulina, L.
Indigofera decora, Lindl.
 tinctoria, L.
Caragana Chamlagu, Lam.
Astragalus lotoides, Lam.
Lathyrus palustris, L.
 maritimus, Big.
Pisum sativum, L.
Orobus lathyroides, L.
Hedysarum coronarium, L. (cult.)
Vicia Faba, L.
 japonica, A. Gray.
 sativa, L.
 tetrasperma, L.
 sp.
Desmodium racemosum, DC.
 reticulatum, Champ.?
Lespedeza cuneata, G. Don.
 striata, Hook. et Arn.
 virgata, DC.
 argyraea, S. et Z.
 bicolor, Turcz.
 pilosa, S. et Z.
Pachyrrhizus Thunbergianus, S. et Z.
Dumasia truncata, S. et Z.
Soja hispida, Moench.
Glycine Soja, S. et Z.
Canavalia incurva, DC.
Phaseolus Mungo, L.
 farinosus, L.
Lablab vulgaris, Sav.
 cultratus, DC.

Rhynchosia volubilis, DC.
Wistaria sinensis, DC.
brachybotrys, S. et Z.
(Milletia) japonica, S. et Z.
Sophora japonica, L.
angustifolia, S. et Z.
Caesalpinia japonica, S.
sepiaria, Roxb.
Cassia Tora, L.
Albizzia Julibrissin, Benth.
Acacia Nemu, Willd.
 sp.
Rosaceae.
Cerasoides apetala, S. et Z.
Prunus persica, L.
Padus, L.
paniculata, Thunb.
Mume, S. et Z.
japonica, Thbg.
tomentosa, Thbg.
spinulosa, S. et Z.
macrophylla, S. et Z.
Pseudo-Cerasus, Lindl.
Maximowiczii ? Rupr.
Spiraea callosa, Thbg.
Chamaedrys, Thbg.
 (S. Reevesii.)
Thunbergii, S. et Z.
prunifolia, S. et Z.
chamaedrifolia, L.
japonica, Sieb.
betulaefolia, Pall.
palmata, Thbg.
Aruncus, L.
salicifolia ? L.
Stephanandra flexuosa, S. et Z.
Rhodotypos kerrioides, S. et Z.
Kerria japonica, DC.
Sieversia dryadoides, S. et Z.
Agrimonia viscidula, Bunge.
Eupatoria, L.
Fragaria chilensis, Ehbrg.
 indica, L.
Geum strictum, Ait.
Potentilla japonica, Bl.
anserina, L.
fragiformis, Willd.
 var. *japonica*.
fragarioides, L.
reptans, L.
 var. *trifoliata*.
gelida, Mey.
Kleiniana, Wight.
Comarum palustre, L.
Rubus parvifolius, L.
 (trifyllus, Thbg.)
Thunbergii, Bl.
palmatus, Thbg.
corchorifolius, Lin. fil.
 (vilosus, Thbg.)
microphyllus, L. fil.
pubinervis, Bl.

Rubus Sieboldii, Bl.
ribifolius, S. et Z.
 (incisus, Thbg.)
hydrastifolius, A. Gray.
coptophyllus, A. Gray.
Chamaemorus, L.
Wrightii, A. Gray.
Rosa sempervirens, L.
multiflora, Thbg.
 var. *platyphylla*, Radd.
Banksiae, R. Br.
Hystrix, Lindl.
microphylla, Roxb.
rugosa, Thbg.
polyantha, S. et Z.
canina, Thbg. non L.
gallica, Thbg. non L.
Raphiolepis japonica, S. et Z.
Mertensii, S. et Z.
Stranvaisia digyna, S. et Z.
Photinia serrulata, Lindl.
villosa, DC.
Crataegus cuneata, S. et Z.
alnifolia, S. et Z.
Eriobotrya japonica, Lindl.
Aronia asiatica, S. et Z.
Osteomeles anthyllidifolia, Lindl.
Pyrus Malus, L. (*culta*).
 spectabilis, Ait.
communis, L.
 (Sorbus) *gracilis*, S. et Z.
rivularis ? Gray.
Aucuparia, L.
Cydonia sinensis, Thouin.
japonica, Pers.
vulgaris, Pers.
Sanguisorba tenuifolia, Fisch.
Calycanthaceae.
Chimonanthus fragrans, Lindl.
Combretaceae.
Quisqualis sinensis, Lindl.
Onagraceae.
Epilobium, sp. 2, S. et Z.
Circaeaa mollis, S. et Z.
alpina, L.
Halorageae.
Ceratophyllum demersum, Thbg.
Myriophyllum, sp.
Haloragis micrantha, R. Br.
Trapa bispinosa, Roxb.
 incisa, S. et Z.
Callitricha verna, Thbg.
Salicarieae.
Ammannia, 2 spp.
Lythrum salicaria, L.
Lagerstroemia indica, L. (*cult.*)
Tamariscineae.
Tamarix chinensis, Lour.
 (gallica, Thbg.)

Melastomaceae.
Melastoma Nobotan, Blume.
Osbeckia chinensis, L.
 et 3 spp.
Bredia hirsuta, Blume.
Philadelphaceae. Don.
Philadelphus coronarius, L.
tenuifolius, Rupr. et Max.
Deutzia crenata, S. et Z.
gracilis, S. et Z.
scabra, S. et Z.
canescens, Sieb.
Myrtaceae.
Punica Granatum, L.
Rhodomyrtus tomentosa, DC.
Metrosideros, sp., S. et Z.
Cucurbitaceae.
Bryonia japonica, L.
Momordica Charantia, L.
Luffa foetida, Cav.
Lagenaria vulgaris, Ser.
hispida, Ser.
Cucumis Melo, L.
sativus, L.
Conomon, Thbg.
flexuosus, L.
Colocynththis, L.
Cucurbita Pepo, L.
Citrullus, L.
Trichosanthes anguina, L
cucumberina, L.
Sicyos angulata, L.
Passifloreae.
Passiflora caerulea, L. (*cult.*)
Portulaceae.
Portulaca oleracea, L.
Tetragonia expansa, Ait.
Begoniaceae.
Begonia grandis, Dryand.
Crassulaceae.
Sedum Sieboldii, Sweet.
 kamtschaticum ? Fisch.
lineare, Thbg.
japonicum, Sieb.
hybridum, Z.
Cacteae.
Opuntia, sp. (*Cactus Ficus*, Thbg.)
Grossulaceae.
Ribes fasciculatum, S. et Z.
laxiflorum, Pursh.
Cynosbati, Thbg.
Saxifrageae.
Saxifraga sarmentosa, L.
cortusaefolia, S. et Z.
Mitellopsis japonica, S. et Z.
Hoteia japonica, Morr.
 Thunbergii, A. Gray.
Hydrangea Hortensia, DC.
acuminata, S. et Z.
Azisai, Sieb.

Hydrangea Belzonii, S. et Z.
bracteata, S. et Z.
cordifolia, S. et Z.
hirta, S. et Z.
involucrata, S. et Z.
japonica, S. et Z.
Otaksa, S. et Z.
paniculata, S. et Z.
petiolaris, S. et Z.
stellata, S. et Z.
Thunbergii, Sieb.
virens, Sieb.
Cardiandra alternifolia, S. et Z.
Schizophagma hydrangeoides, S. et Z.
Platycrater arguta, S. et Z.
Rodgersia podophylla, A. Gray.
Chrysosplenium Kamtschaticum, Cham.
ovalifolium, M. Bieb.
Droseraceae.
Drosera rotundifolia, L.
 2 spp.
Parnassia mucronata, S. et Z.
Umbelliferae.
Hydrocotyle interrupta, Mühl.
globata, Bl.
Sanicula elata, Hamilt.
 (europaea, L. var.)
Cryptotaenia canadensis, DC.
Apium graveolens, L.
Foeniculum vulgare, Gaertn.
Ligusticum scoticum, L.
 acutilobum, S. et Z.
Peucedanum japonicum, Thbg.
Torilis japonica, DC.
 scabra, DC.?
Osmorrhiza japonica, S. et Z.
 longistylis, DC.
Heracleum lanatum, Michx.
Archangelica officinalis, Hoffm.?
Bupleurum multinerve, DC.
Angelica japonica, A. Gray.
Anthriscus sylvestris, Hoffm.
Coelopleurum Gmelini, Led.
Cymopteris littoralis, (A. Gray).
 glaber, (A. Gray).
Araliaceae.
Panax innovans, S. et Z.
ricinifolium, S. et Z.
divaricatum, S. et Z.
Echinopanax horridus, Pl. et Dcne.
Aralia japonica, Thbg.
 nudicaulis, L. (Blume.)
pentaphylla, Thbg.
edulis, S. et Z.
canescens, S. et Z.
quinquefolia, L.
Hedera Helix, L., Thbg.
 rhombea, S. et Z.
Trochodendron aralioides, S. et Z.

Loranthaceae.
Viscum japonicum, Thbg.
 Kaempferi, DC.
Loranthus Jodoniki, Sieb.
Compositae.
Adenostemma viscosum, Forst.
Adenocaulon himalaicum? Edgw.
Nardosmia japonica, S. et Z.
Eupatorium chinense, L. Thbg.
 Finlaysonianum, Wall.
japonicum, Thbg.
cannabinum, L.
Reevesii, Wall.
 sp. n.?
Erigeron Thunbergii, A. Gray.
 (Aster japonicus, Thbg.)
Aster tartaricus, L.
 discolor, Max.?
Aster Kaempferi, A. Gray.
 trinervius, Roxb.
Tripolium vulgare, Nees.
Calimeris amplexifolia, S. et Z.
Döllingeria scabra, Nees.
Callistephus sinensis, Cass.
Heteropappus incisus, S. et Z.
 subserratus, S. et Z.
rigens, S. et Z.
 (hispidus, Less.)
Conyza japonica, Less.
Asteromaea indica, Blume.
Solidago Virgaurea, L.
 leiocarpa, DC.
Inula Helenium, L.
 squarrosa, L.?
salicina, L.?
japonica, Thbg.
Eclipta prostrata, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Xanthium Strumarium, L.
Helianthus annuus, L. var.
Porophyllum japonicum, DC.
Tagetes patula, L.
Bidens chinensis, Willd.
Spilanthes oleracea, Jacq.
Ptarmica sibirica, Led.
 Mongholica, DC.
Achillaea japonica, Schz-Bip.
Pyrethrum sinense, Sabine.
Chrysanthemum coronarium, L.
Zollingera scandens, Schz-Bip.
Artemisia borealis, Pall.
 capillaris, Thbg.
japonica, Thbg.
vulgaris, L.
indica, Willd.
annua, L.
 2 spp.
Matricaria inodora? DC.
Myriogyne minuta, Less.
Gnaphalium confusum, DC.
 japonicum, Thbg.
polycephalum, Mx.

Gnaphalium multiceps, Wall.
Antennaria margaritacea, DC.
Carpesium divaricatum, S. et Z.
 Thunbergianum, S. et Z.
Ligularia japonica, Less.
gigantea, S. et Z.
Kaempferii, S. et Z.
 (Farfugium grande, Lindl.)
Erythrochaete palmatifida, S. et Z.
 dentata, A. Gray.
Syneilesis aconitifolia, Max.
 (Cfr. Erythrochaete)
Cacalia delphinifolia, S. et Z.
farfaraefolia, S. et Z.
hastata, Linn.
Senecio subensiformis, DC.
 palmatus, Pall.
Pseudo-Arnica, Less.
japonicus, Thbg.
Calendula officinalis, L.
Saussurea japonica, DC.
Aplotaxis multicaulis, DC.
Carthamus tinctorius, L.
Spanioptilon lineare, Less.
Cirsium japonicum, DC.
 kamtschaticum, Led. var.
pectinellum, A. Gray.
brevicaule, A. Gray.
Lappa major, Gaertn.
Atractylodes lyrata, S. et Z.
 ovata, DC.
Anandria bellidiastrium, DC.
Pertya scandens, Schz-Bip. (Bonpl. tab. 10.)
 (Erigeron scandens, Thunb.
 Leucomeris scand., Schz-Bip.)
Ainsliaea uniflora, Schz-Bip.
 auriflora, Schz-Bip.
 apiculata, Schz-Bip.
Cichorium Intybus, L.
Pieris japonica, Thbg.
 hieracioides, L.
Youngia Thunbergiana, DC.
Hieracium umbellatum, L.
Taraxacum Dens-Leonis, Desf.
Ixeris (Choris) repens, A. Gray.
 stolonifera, A. Gray.
 debilis, A. Gray.
 ramosissima, A. Gray.
 Thunbergii, A. Gray.
 albiflora, A. Gray.
 linguaefolia, A. Gray.
Lampsana parviflora, A. Gray.
Sonchus oleraceus, Thbg.
Achyrophorus ciliatus, Schultz.
Balsamiflueae.
Liquidambar, sp.
styraciflua, L. (ex Miq. Zoll.
 Syst. Verz. p. 108.)
Hamamelideae.
Hamamelis japonica, S. et Z.

Corylopsis spicata, S. et Z.	Campanula punctata, Lam. (nobilis, Lindl.)	Pyrola rotundifolia, L.
pauciflora, S. et Z.	Rubiaceae.	P. japonica, Sieb.
Distylium racemosum, S. et Z.	Asperula odorata, L.	Moneses grandiflora, Salisb.
<i>Corneae.</i>	Galium strigosum, Thbg.	Monotropa uniflora, L.
Benthamia japonica, S. et Z.	Aparine, L.	Diapensiaceae.
Cornus officinalis, S. et Z.	trachyspermum, A. Gray.	Diapensia lapponica, L.
sanguinea, Thbg. (non L.)	verum, L.	Styraceae.
alba, Thbg.	var. laesiocarpum.	Styrax japonicum, S. et Z.
suecica, L.	triflorum, Mx.	Obassia, S. et Z.
canadensis, L.	Rubia Munjista, Roxb.	Pterostyrax corymbosum, S. et Z.
Aucuba japonica, Thbg.	peregrina ? L.	mieranthum, S. et Z.
Quadrialia lanceolata, S. et Z.	Serissa foetida, Comm.	hispidum, S. et Z.
<i>Alangieae.</i>	Paederia foetida, L.	Symplocos japonica, DC.
Marlea platanifolia, S. et Z.	Mitchella undulata, S. et Z.	prunifolia, S. et Z.
macrophylla, S. et Z.	Damnacanthus indicus, Gaertn.	myrtacea, S. et Z.
<i>Caprifoliaceae.</i>	major, S. et Z.	lancifolia, S. et Z.
Linnaea borealis, Gronov.	Hedyotis cordata, Zucc.	leptostachys, S. et Z.
Abelia serrata, S. et Z.	Ophiorrhiza japonica, Blume.	theophrastaefolia, S. et Z.
spathulata, S. et Z.	Nauclea racemosa, S. et Z.	neriifolia, S. et Z.
Diervilla hortensis, S. et Z.	Gardenia florida, L.	sinica, Ker.
grandiflora, S. et Z.	maruba, Sieb.	(Crataegoides, Don.)
versicolor, S. et Z.	grandiflora, Lour.	Ebenaceae.
floribunda, S. et Z.	radicans, Thbg.	Diospyros Kaki, L.
Lonicera japonica, Thbg.	Oldenlandia paniculata, L.	japonica, S. et Z.
affinis, Hook.	Vaccineae.	Sapotaceae.
brachypoda, DC.	Vaccinium bracteatum, Thbg.	Achras Sapota, L.
xylosteum, var.	Smallii, A. Gr.	Sideroxylon, sp.
Morrowii, A. Gray.	Wrightii, A. Gr.	Myrsinaceae.
Viburnum plicatum, Thbg.	Vitis-Idaea, L.	Myrsine neriifolia, S. et Z.
tomentosum, Thbg.	macrocarpum, Ait.	Ardisia crispa, A. DC.
cordifolium, Wall.	sp. nov. ?	glabra, A. DC.
cuspidatum, Thbg.	Ericaceae.	japonica, Bl.
erosum, Thbg.	Clethra barbinervis, S. et Z.	pusilla, A. DC.
dilatatum, Thbg.	sp.	Maesa Doraena, Bl.
urceolatum, S. et Z.	Gaultheria triquetra, S. et Z.	(Doraena japonica, Thbg.)
Awafouki, Sieb.	Pieris japonica, S. et Z.	Primulaceae.
phlebotrichum, S. et Z.	elliptica, S. et Z.	Primula cortusoides, L.
odoratissimum, DC.	ovalifolia, Don.	japonica, A. Gray.
Opulus, L.	Leucothoe chlorantha, A. Gr.	Androsace patens, C. W.
Sambucus ebuloides, Desv.	Tripetaleia paniculata, S. et Z.	Lysimachia japonica, Thbg.
japonica, Thbg.	Rhododendron Metternichii, S. et Z.	clethroides, Duby.
pubens, Michx.	(Hymenanthes japonica, Bl.)	Iubinioides, S. et Z.
<i>Valerianaceae.</i>	ledifolium, DC.	lineariloba, Hook.
Patrinia villosa, Sieb.	linearifolium, S. et Z.	ephemerum, L.
parviflora, S. et Z.	brachycarpum, Don.	vulgaris, L. ?
Valeriana dioica, L.	Azalea mollis, Bl.	multiflora, Wall.
officinalis, Thbg. (L. ?)	indica, L.	Anagallis arvensis, L.
<i>Dipsaceae.</i>	rosmarinifolia, Burm.	(α) floribus phoeniceis, Thbg.
Scabiosa maritima, Thbg.	serpyllifolia, A. Gr.	(β) " caeruleis, Sieb.
<i>Lobeliaceae.</i>	Japonica, A. Gr.	Naumburgia thrysiflora, Moench.
Isolobus campanuloides, DC.	Ledum palustre, L.	Jasmineae.
radicans, A. DC.	Menziesia ferruginea, Sm.	Jasminum grandiflorum, L.
<i>Campanulaceae.</i>	Meisteria cernua, S. et Z.	Sambac, Ait.
Campanumaea lanceolata, S. et Z.	(Tritomodon japonicum, Turcz.)	nudiflorum, Lindl.
Platycodon grandiflorum, DC.	Meisteria, sp. n. ?	Sieboldianum, Bl.
Adenophora verticillata, Fisch.	Enkianthus, sp. ?	floridum, Bunge.
sp.	Pyrolaceae.	Oleaceae.
Wahlenbergia marginata, DC.	Chimaphila, sp.	Olea aquifolium, S. et Z.
Campanula Trachelium, L.	Pyrola media, Sm.	japonica, Sieb.
remotiflora, S. et Z.	minor, L.	fragrans, Thbg.

Osmanthus fragrans, Lour.
Ligustrum Ibota, Sieb.
 ciliatum, Bl.
 reticulatum, Bl.
ovalifolium, Hassk.
obtusifolium, S. et Z.
japonicum, Thbg.
micranthum, Zucc.
Fraxinus longicuspis, S. et Z.
 Sieboldiana, Blum.
pubinervis, Bl.
 obovata, Bl. (cult.)
Forsythia suspensa, Vahl.
Loganiaceae.
Gardneria nutans, S. et Z.
Gentianae.
Gentiana Thunbergii, Griseb.
 squarrosa, Led.
Pleurogyne rotata, Griseb.
Ophelia bimaculata, S. et Z.
 chinensis, Bge.
 (Japonica, Griseb.)
Crawfurdia japonica, S. et Z.
Limnanthemum peltatum, Griseb.
Menyanthes trifoliata, L.
Apocynae.
Vinca rosea, L.
Nerium odorum, Soland.
Rhynchospermum jasminoides, Ldl.
 (Malouetia asiatica, S. et Z.)
Parechites Thunbergii, A. Gr.
Amsonia elliptica, R. et S.
Asclepiadaceae.
Metaplexis chinensis, R. Br.
 Stauntoni, R. et S.
Vincetoxicum purpurascens, Morr.
 et Dene.
 macrophyllum, S. et Z.
 applexicaule, S. et Z.
japonicum, Morr. et Dene.
acuminatum, DC.
atratum, Bunge.
micranthum, S. et Z.
Pycnostelma chinense, Bunge.
Marsdenia tomentosa, Morr. et Dene.
Pergularia minor, Andr.
 (japonica, Thbg.)
Boragineae.
Lithospermum erythrorhizon, S. et Z.
 officinale, L.
japonicum, A. Gray.
Omphalodes, sp.
Mertensia maritima, Roth.
Bothriospermum asperugoides, S. et Z.
Cynoglossum japonicum, Thbg.
Myosotis arvensis, L.
 chinensis, DC.
Eritrichium Gulielmi, A. Gray.
 pedunculare, DC.
Heliotropium japonicum, A. Gray.

Cordiaceae.
Cordia thrysiflora, S. et Z.
Labiate.
Plectranthus amethystoides, Benth.
 brachiatus, Benth.
 2 spp.
Perilla arguta, Benth.
Salvia japonica, Thbg.
 plebeia, R. Br.
Melissa Clinopodium, Bth.
Prunella vulgaris, L.
Leonurus cardiaca, L.
Cedronella japonica, Hassk.
Scutellaria indica, L.
 scordifolia, Fisch.
japonica, Morr. et Dene.
hederacea, Kth.
Nepeta Glechoma, Benth.
 var. hirsuta, S. et Z.
 var. grandis, A. Gray.
Lophanthus rugosus? F. et Mey.
Lamium amplexicaule, L.
 barbatum, S. et Z.
 petiolatum, Royle.
Ajuga remota, Benth.
 ciliata, Bunge.
orientalis, Thbg.
decumbens, Thbg.
pygmaea, A. Gray.
Teucrium japonicum, Thbg.
Thymus serpyllum, L.
Elsholtzia, sp.
Stachys aspera, var. *palustris*, Mich.
Gomphostemma, sp.
Calamintha gracilis, Bent.
 chinensis, Benth.
Dracocephalum Ruyschianum.
 var. *japonicum*, A. Gray.
Polemoniaceae.
Schizocodon soldanelloides, Zucc.
Polemonium coeruleum, L.
Convolvulaceae.
Calystegia Soldanella, R. Br.
 japonica, Chois.
 (Convolvulus, Thb.)
Batatas edulis, Chois.
Pharbitis Nil, Chois.
Calonyction speciosum, Chois.
 var. *muricatum*.
Ipomoea filicaulis, Blume.
Cuscuta major, C. Bauh.
 japonica, Chois.
Solanaceae.
Nicotiana chinensis, Fisch.
Datura Stramonium, L.
 alba, Nees.
Physalis Alkekengi, L.
 ciliata, S. et Z.
peruviana, L.
 var. *minor*.
Capsicum longum, DC.

Capsicum annuum, L.
Solanum nigrum, L.
 tuberosum, L.
Melongena, L.
Dulcamara, L.
Lycium chinense, Blume.
Verbenaceae.
Verbena officinalis, L.
Priva, sp.
Vitex ovata, Thbg.
 cannabifolia, S. et Z.
Clerodendron trichotomum, Thbg.
 squamatum, Vahl.
 divaricatum, S. et Z.
 fragrans, Vent.
 (Volckameria japonica, Thbg.)
 sp.
Callicarpa japonica, Thbg.
 gracilis, S. et Z.
 mollis, S. et Z.
 Murasaki, Sieb.
Mastacanthus sinensis, Endl.
Myoporineae.
Pentacoelium bontioides, S. et Z.
Acanthaceae.
Peristrophe tinctoria, Nees.
Rostellularia procumbens, Nees.
Rhinacanthus communis, Nees.
Bignoniaceae.
Catalpa Kaempferi, S. et Z.
Campsis adrepens, Lour.
(Tecoma grandiflora, Del.)
Sesameae.
Sesamum orientale, L.
Gesneraceae.
Conandron ramondioides, Zucc.
Scrophularineae.
Paulownia imperialis, S. et Z.
(Bignonia tomentosa, Thbg.)
Vandellia angustifolia, Benth.
Gratiola, sp.
Bonnaya verbenacea, Spr.
Veronica Anagallis, L.
 paniculata, L.
 longifolia, L.
 sibirica, L.
japonica, Steud.
 Thunbergii, A. Gray.
Paederota axillaris, S. et Z.
 bracteata, S. et Z.
Siphonostegia chinensis, Benth.
Scrophularia alata, A. Gray.
Mazus rugosus, Lom.
Pedicularis resupinata, L.
Gerardia japonica, Thbg.
Orobanchaeae.
Boschniackia, sp., S. et Z.
Aeginetia japonica, S. et Z.
Phacellanthus tubiflorus, S. et Z.

*Utricularieae.**Utricularia intermedia*, Hayne.*Plantagineae.**Plantago major*, L.*Plumbagineae.**Statice Japonica*, S. et Z.*Polygonaceae.**Rheum palmatum*, L.*tartaricum*, L.*Polygonum chinense*, L.*japonicum*, Meisn.*orientale*, L.*aviculare*, L.*barbatum*, L.*perfoliatum*, L.*Fagopyrum*, L.*Thunbergii*, S. et Z.*multiflorum*, Thbg.*cuspidatum*, S. et Z.*Sieboldii*, Meisn.*Convolvulus*, L.*lapathifolium*?*Bistorta*, L.*filiforme*, Thbg.*Persicaria*, L.*Hydropiper*, L.*amoenum*, Bl.*hastatum*?*Fagopyrum emarginatum*, Meisn.*aculeatum*, Moench.*Rumex crispus*, L.? Thbg.*var. nudivalvis*, Meisn.*persicarioides*, L.*acetosa*, L.*Nyctagineae.**Mirabilis Jalapa*, L., Thbg.*Amarantaceae.**Gomphrena globosa*, L., Thbg.*Celosia margaritacea*, L.*cristata*, L.*Achyranthes aspera*, Linn.*bidentata*, Bl.*Amarantus Blitum*, L.*Euxolus caudatus*, Miq.*Chenopodiaceae.**Chenopodia maritima*, Moq.*Spinacia oleracea*, L.*Beta vulgaris*, L.*Kochia scoparia*, Schrad.*Chenopodium album*, L.*ambrosioides*, L.*virgatum*, Thbg.*Schoeberia maritima*, C. A. M.*Salsola Soda*, Sieb.*Basella rubra*, L.*Phytolacceae.**Phytolacca octandra*, L.*Kaempferi*, A. Gray.*Laurineae.**Cinnamomum dulce*, Nees.*Loureirii*, Nees.*pedunculatum*, Nees.*daphnoides*, S. et Z.*Camphora officinarum*, Banks.*Machilus Thunbergii*, S. et Z.*Japonica*, S. et Z.*longifolia*, Blume.*Benzoin trilobum*, S. et Z.*Thunbergii*, S. et Z.*sericeum*, S. et Z.*praecox*, S. et Z.*glauceum*, S. et Z.*Aperula citriodora*, Blume.*(Benzoin citriodorum*, S. et Z.)*Lindera obtusiloba*, Bl.*Tetranthera japonica*, Spreng.*Actinodaphne Chinensis*, Nees.*(Jozoste, Bl.)**Sieboldiana*, Miq.*Daphnidium Myrrha*, Nees.*strychnifolium*, S. et Z.*lancifolium*, S. et Z.*(Jozoste lancifolia*, Bl.)*Jozoste acuminata*, Bl.*Litsaea glauca*, Sieb.*foliosa*, S. et Z., non Nees.*acieulata*, Bl.*Santalaceae.**Thesium*, sp., S. et Z.*alpinum*, L.*decurrens*, Bl.*Exocarpus latifolia*, R. Br.*Helwingiaceae.**Helwingia rusciflora*, Willd.*(Osyris japonica*, Thbg.)*Elaeagnaceae.**Elaeagnus macrophylla*, Thbg.*umbellata*, Thbg.*pungens*, Thbg.*longipes*, A. Gray.*reflexa*, Morr. et Dene.*glabra*, Thbg.*crispa*, Thbg.*multiflora*, Thbg.*parvifolia*, Wall.*Thymelaeae.**Daphne odora*, Thbg.*japonica*, Hort. Lugd.*Genkwa*, S. et Z.*Pseudo-Mezereum*, A. Gray.*Edgeworthia papyrifera*, S. et Z.*Passerina (Wickstroemia) japonica*,*S. et Z.**Ganpi*, S. et Z.*Saurureae.**Houttuynia cordata*, Thbg.*Saururus Loureirii*, Dene.*Cernuus*, L.?*Empetreae.**Empetrum nigrum*, L.*Proteaceae.**Helicia lancifolia*, S. et Z.*Aristolochiaeae.**Asarum canadense*, Thbg.*sp.**Heterotropa asaroides*, Morr. et Dene.*Aristolochia Kaempferi*, Willd.*debilis*, S. et Z.*longa*, Thbg.*Chloranthaceae.**Chloranthus serratus*, Kaempf.*inconspicuus*, Bl.*brachystachys*, Bl.*Sarcandra chlorantoides*, Gaertn.*Tricercandra quadrifolia*, A. Gray.*Piperaceae.**Piper futokadsura*, Sieb.*Euphorbiaceae.**Pachysandra terminalis*, S. et Z.*Buxus microphylla*, S. et Z.*Glochidion obovatum*, S. et Z.*Cicca ? flexuosa*, S. et Z.*Phyllanthus lepidocarpus*, S. et Z.*Niruri*, L.*Croton Siraki*, S. et Z.*Röttlera japonica*, Spreng.*Ricinus communis*, L.*Elaeococca verrucosa*, Juss.*cordata*, Juss.*Mercurialis leiocarpa*, S. et Z.*Acalypha*, sp.*Hemiciccia japonica*, Baill.*Goughia nilgherrensis*, Wight.*Stillingia sebifera*, Mich.*japonica*, S. et Z.*Euphorbia palustris*, L.*Heliscopia*, L.*Sieboldiana*, Morr. et Dene.*(Guilielmii*, A. Gray.)*adenochlora*, Morr. et Dene.*humifusa*, Willd.*Jolkerii*, Boiss.*pilulifera*, L.*Antidesma japonica*, S. et Z.*Cupuliferae.**Castanea vesca*, Gaertn., var.*japonica*, Blume.*crenata*, S. et Z.*(japonica, var. crenata, Bl.)**stricta*, S. et Z.*(japonica, var. stricta, Bl.)**chinensis*, Spr. (cult.)*Fagus sylvatica*, L.*crenata*, Blume.*Quercus glabra*, Thbg.*acuta*, Thbg.*glauca*, Thbg.*cuspidata*, Thbg.

Quercus *serrata*, Thbg.
glandulifera, Blume.
dentata, Thbg.
phyllraeoides, A. Gray.
Sieboldiana, Bl.
urticaefolia, Bl.
canescens, Bl.
variabilis, Bl.
aliena, Bl.
crispula, Bl.
Bürgerii, Bl.
sessilifolia, Bl.
salicina, Bl.
myrsinaefolia, Bl.
gilva, Bl.
grosseserrata, Bl.
lacera, Bl.
marginata, Bl.
laevigata, Bl.
Corylus heterophylla, Fisch.
Sieboldiana, Bl.
Distegocarpus carpinius, S. et Z.
(Carpinus japonica, Bl.)
laxiflora, S. et Z.
(Carpinus, Bl.)
Carpinus erosa, Bl.
cordata, Bl.

Myrceae.
Myrica rubra, S. et Z.

Betulaceae.
Betula grossa, S. et Z.
carpinifolia, S. et Z.
ulmifolia, S. et Z.
japonica, Sieb.
Alnus firma, S. et Z.
japonica, S. et Z.
viridis, DC.

Salicineae.
Salix japonica, Thbg.
alba, L.
subfragilis, Anders.
purpurea, L.
padifolia, L.
viridula, Anders.
vulpina, Anders.
acutifolia, W.
Sieboldiana, Blume.
integra, Thbg.
Babylonica, L.
Populus, sp.

Celtideae. Endl.
Celtis Willdenowiana, Roem.
sinensis, Pers.
Muku, Sieb.
Sponia nudiflora, S. et Z.
Homiooceltis aspera, Bl.

Cannabineae.
Cannabis sativa, L.
Humulus Lupulus, L.
japonicus, S. et Z.

Urticaceae.
Urtica Thunbergiana, S. et Z.
angustifolia, Fisch., var.
foliosa, Bl.
Laportea bulbifera, S. et Z.
terminalis, Wedd.
Boehmeria nivea, Gaud.
biloba, Wedd.
(Splittgerbera japonica, Miq.)
macrophylla, S. et Z.
(longispica, Steud.)
spicata, Thbg.
Sieboldiana, Bl.
holosericea, Bl.
Pilea petiolaris, Bl.
(Urtica, S. et Z.)
Elatostemma japonicum, Wedd.
(Procris umbellata, S. et Z.)
radicans, Wedd.
(Procris radicans, S. et Z.)
Morocarpus edulis, S. et Z.
japonicus, Miq.
Nanocnida japonica, Bl.
Villebrunea frutescens, Bl.

Moreae.
Morus alba, L., Thbg.
indica, L., Thbg.
japonica, Sieb.
Fatoua aspera, Gaud.
pilosa, Gaud.
Maclura gerontogaea, S. et Z.
Broussonetia papyrifera, Vent.
Kaempferi, Sieb.
Sieboldii, Bl.
(Kazinoki, Sieb.)
Urostigma Hasseltii, Miq.
Ficus stipulata, Thbg.
pumila, Thbg.
erecta, Thbg.
japonica, Blume.
pyrifolia, Burm.
hirta, Vahl.
Carica, L., Thbg.
sp.

Ulmaceae.
Euptelea polyandra, S. et Z.
Ulmus parvifolia, Jacq.

Coniferae.
Glyptostrobus pendulus, Endl.?
Taxus cuspidata, S. et Z.
adpressa, Knight.
Torreya nucifera, S. et Z.
Cephalotaxus umbraculifera, Sieb.
drupacea, S. et Z.
pedunculata, S. et Z.
Fortunei, Hook.
Podocarpus macrophylla, Wall.
Maki, S. et Z.
(chinensis, Wall.)
Koraiana, Sieb.
Nageia, R. Br.

Podocarpus japonica, Sieb.
cuspidata, Endl.
grandifolia, Endl.?
Salisburia adiantifolia, Smith.
Juniperus rigida, S. et Z.
taxifolia, Hook.
chinensis, L.
procumbens, Sieb.
Thuja orientalis, L.
excelsa, Bong.
pendula, Lamb.
Thujopsis dolabrata, S. et Z.
Retinospora obtusa, S. et Z.
ericoides, Zucc.
pisifera, S. et Z.
squarrosa, S. et Z.
Cryptomeria japonica, Don.
Larix leptolepis, Sieb.
Abies Tsuga, S. et Z.
(Picea) firma, S. et Z.
(Picea) homolepis, S. et Z.
microsperma, Lindl.
Veitchii, Lindl.
Alcockiana, Lindl.
bifida, S. et Z.
jezoensis, S. et Z.
Smithiana, Loud.
(polita, S. et Z.)
Pinus densiflora, S. et Z.
Massoniana, Lamb.
parviflora, S. et Z.
koraiensis, S. et Z.
sinensis, Lamb.
Pinaster, Ait. (cult.?)
scopifera, Miq.
Cunninghamia sinensis, R. Br.
Sciadopitys verticillata, S. et Z.

Cycadaceae.
Cycas revoluta, L., Thbg.
β prolifera, S. et Z.

Palmeae.
Chamaerops excelsa, Thunb.
Biroo, Sieb.?
Rhapis flabelliformis, Lin. fil.
Sjurotsik, Sieb.
aspera, Sieb.
Kwauwon, Sieb.

Lemnaceae.
Lemna minor, L.

Aroideae.
Orontium japonicum, Thbg.
Pinella tripartita, Schott.
tuberifera, Tenore.
(Arisaema ternatum, Schott.)
Arisaema amplissimum, Bl.
ringens, Schott.
serratum, Schott.
praecox, De Vriese.
heterophyllum, Bl.
latisectum, Bl.
Thunbergii, Blume.

Arisaema japonicum, Blume.	<i>Marantaceae.</i>	Lilium ? medeoloides, A. Gray.
2 spp.	Canna sp. (an <i>C. indica</i> var. ? <i>pumila</i> .)	<i>Fortunei</i> , Lindl.
Alocasia, sp.	<i>Amaryllideae.</i>	<i>callosum</i> , S. et Z.
Arctiodracon japonicum, A. Gray.	<i>Amaryllis Sarniensis</i> , Thbg.	<i>Thunbergianum</i> , R. et S.
Acorus gramineus, Ait.	<i>Narcissus Tazetta</i> , L.	<i>Jama-juri</i> , Sieb.
<i>Calamus</i> , L.	var. <i>chinensis</i> .	<i>Coridon</i> , Sieb.
<i>Orchideae.</i>	<i>Hypoxidaceae.</i>	<i>testaceum</i> , Lindl.
Liparis liliifolia, Rich.	<i>Hypoxis spicata</i> , Thbg.	<i>excelsum</i> , Hort.
Dendrobium catenatum, Lindl.	<i>Pontederiaceae.</i>	<i>longiflorum</i> , Thbg.
<i>Devonianum</i> , Lindl.	<i>Pontederia vaginalis</i> , Linn.	(<i>candidum</i> , Thbg.)
<i>japonicum</i> , Lindl.	<i>Iridaceae.</i>	<i>Gagea triflora</i> , R. et S.
Phajus maculatus, Lindl.	<i>Pardanthus chinensis</i> , Ker.	<i>Scilla orientalis</i> , Thbg.
<i>minor</i> , Bl.	(<i>Ixia</i> , L.)	<i>japonica</i> , Thbg.
Bletia hyacinthina, Br.	<i>Iris setosa</i> , Pall.	<i>Barnardia japonica</i> , R. et S.
<i>Gebina</i> , Lindl.	<i>laevigata</i> , Fisch.	(<i>Ornithogalum</i> , Thbg.)
Cremnastra mitrata, A. Gray.	<i>orientalis</i> , Thbg.	<i>Phalangium japonicum</i> , Poir.
Hyacinthorchis variabilis, Bl.	<i>gracilipes</i> , A. Gray.	<i>Allium Schoenoprasum</i> , L.
(<i>Epidendrum striatum</i> , Thbg.)	<i>japonica</i> , Thbg.	<i>Thunbergii</i> , Don.
Luisia teres, Bl.	<i>versicolor</i> , Thbg.	<i>Victorialis</i> , L.
(<i>Epidendrum</i> , Thbg.)	<i>Sibirica</i> , L.	sp.
Cymbidium ensifolium, Sw.	<i>Alismaceae.</i>	<i>Funkia ovata</i> , Spreng.
<i>xiphifolium</i> , Lindl. ?	<i>Sagittaria sagittifolia</i> , L.	<i>Sieboldiana</i> , Lodd.
<i>virescens</i> , Br.	<i>obtusa</i> , Thbg.	<i>albo-marginata</i> , Hook.
Calanthe discolor, Lindl.	<i>Alisma flava</i> , Thbg. ?	<i>lanceifolia</i> , Spreng.
<i>striata</i> , Br.	<i>Najadeae.</i>	<i>grandiflora</i> , Sieb.
<i>Sieboldii</i> , Dene.	<i>Potamogeton natans</i> , L.	<i>Hemerocallis fulva</i> , L.
<i>Iurida</i> , Dene.	<i>Zostera marina</i> , L.	<i>Smilax stenopetala</i> , A. Gray.
<i>violacea</i> , Dene.	<i>Haemodoraceae.</i>	<i>China</i> , L.
Oreorchis lancifolia, A. Gray.	<i>Aletris japonica</i> , Lamb.	(japonica, A. Gray.)
Orchis aristata, Fisch.	<i>Liliaceae.</i>	<i>Pseudo-China</i> , L.
Platanthera tipuloides, Lindl.	<i>Paris hexaphylla</i> , Cham.	<i>Sieboldii</i> , Hassk.
Habenaria japonica, A. Gray.	<i>tetraphylla</i> , A. Gray.	<i>Heterosmilax japonica</i> , Kth.
Cephalanthera japonica, A. Gray.	<i>Trillium erectum</i> , Linn., var.	<i>Caprosanthus consanguineus</i> , Kth.
<i>ensifolia</i> , Lindl.	<i>Asparagus lucidus</i> , Lindl.	<i>Dioscoreae.</i>
<i>longibracteata</i> , Bl.	<i>micranthus</i> , S. et Z.	<i>Dioscorea japonica</i> , Thbg.
<i>erecta</i> , Bl.	<i>Wrightii</i> , A. Gray.	<i>septemloba</i> , Thbg.
(<i>Seraphis</i> , Thbg.)	<i>schoberioides</i> , Kth.	<i>quinqueloba</i> , Thbg.
<i>falcata</i> , Bl.	<i>Polygonatum vulgare</i> , Red.	<i>Batatas</i> , Dene. var.
(<i>Seraphis</i> , Thbg.)	<i>giganteum</i> , Dietr.	<i>sativa</i> L. ?
Arethusa japonica, A. Gray.	<i>multiflorum</i> , All.	<i>Roxburghiaceae.</i>
Pogonia ophioglossoides, Ker.	<i>falcatum</i> , A. Gray.	<i>Roxburghia Japonica</i> , Bl.
<i>similis</i> , Bl.	<i>Thunbergii</i> , Morr. et Dene.	<i>Ophiopogoneae.</i>
Epipactis Thunbergiana, A. Gray.	<i>japonicum</i> , Morr. et Dene.	<i>Flüggea japonica</i> , Rich.
<i>longifolia</i> , Bl.	<i>Convallaria majalis</i> , Linn.	<i>Jaburan</i> , Kth.
(<i>Seraphis</i> , Thbg.)	<i>Smilacina bifolia</i> .	<i>Ophiopogon spicatus</i> , Ker.
Gastrodia elata, Bl.	var. <i>kamtschatica</i> .	<i>Melanthaceae.</i>
<i>gracilis</i> , Bl.	<i>japonica</i> , A. Gray.	<i>Heloniopsis pauciflora</i> , A. Gray.
Listera japonica, Bl.	<i>Clintonia udensis</i> , Traut.	<i>Melanthium luteum</i> , Thbg.
<i>cordata</i> , Br.	<i>Uvularia hirta</i> , Thbg.	<i>Helonias</i> ? <i>japonica</i> , R. et S.
Spiranthes australis, Lindl.	<i>Disporum sessile</i> , Don.	<i>Veratrum nigrum</i> , L.
Goodyera similis, Bl.	<i>smilacinum</i> , A. Gray.	<i>Rhodea japonica</i> , Roth.
(<i>Neottia repens</i> , Brug.)	<i>fulvum</i> , Salis.	<i>Aspidistra elatior</i> , Bl.
<i>japonica</i> , Bl.	<i>Streptopus amplexifolius</i> , DC.	<i>Drapiezia</i> , sp.
Cypripedium japonicum, Thbg.	<i>roseus</i> , Michx.	<i>Junceae.</i>
<i>Thunbergii</i> , Bl.	<i>Orithya oxypetala</i> , Kth.	<i>Juncus effusus</i> , L.
(<i>C. Calceolus</i> , Thbg. non L.)	<i>Lilium japonicum</i> , Thbg.	<i>monticola</i> , Steud.
Mitostigma gracile, Bl.	<i>maculatum</i> , Thbg.	<i>sinensis</i> , Gay.
Lecanorchis japonica, Bl.	<i>cordifolium</i> , Thbg.	<i>xyphioides</i> , Miq.
<i>Zingiberaceae.</i>	<i>bulbiferum</i> , L.	<i>articulatus</i> , L.
Globba japonica, Thbg.	<i>speciosum</i> , Thbg.	<i>Luzula campestris</i> , L.
Zingiber Miago, Rosc.		<i>Susum</i> , sp. ?

Eriocauloneae.
Eriocaulon sexangulare, L.
Sieboldianum, S. et Z.

Commelyneae.
Commelynna polygama, Roth.
 (communis, L.)
Pollia japonica, Thbg.

Cyperaceae.
Cyperus piptolepis, Steud.
xanthopus, Steud.
laevissimus, Steud.
 (rotundus, L. ?)
pennatus, Lamk.
diformis, L.
subulatus, Steud.
 (rotundus, L. ?)
microiria, Steud.
trachyrachis, Steud.
teretifructus, Steud.
Irio, L.

Mariscus umbellatus, Vahl.
Scirpus ciliatus, Steud.
 (lacustris, Thbg.)
Eleocharis pileata, A. Gray.
Cladium japonicum, Steud.
Fimbristylis japonica, Steud.
capillacea, Hochst.
meliacea, Vahl.
Goeringeana, Steud.
*Carex bulbosa**, Boott.*
conica, Boott.
confertiflora, Boott.
dispalata, Boott.
Doniana, Spreng.
excisa, Boott.
filiformis, L.
Gaudichaudiana, Kth.
gibba, Wahl.
 (anomala, Boott.)
heterolepis, Bunge.
incisa, Boott.
isenostachys, Steud.
leucochlora, Bunge.
lanceolata, Boott.
longirostrata, C. A. Mey.
*ligulata**, Nees.
monadelpha, Boott.
Morrowii, Boott.
macrocephala, Willd.
muricata, L.
maculata, Boott.
 (micans, Boott.)
*mollicula**, Boott.
nana, Boott.
pumila, Thbg.

Carex puberula, Boott.
pisiformis, Boott.
praecox, Jacq.
picta, Boott.
phacoides, Kze.
papulosa, Boott.
parciflora, Boott.
polyrhiza, Wallr.
pilulifera, L.
pteroloma, Kze.
*pocelliformis**, Boott.
rigens, Boott.
rhizomatosa, Steud.
Ringoldiana, Boott.
rostrata, Mühl.
remota, L.
Royleana, Nees.
*retrorsa**, var., Schw.?
stipata, Mühl.
Scabrifolia, Steud.
stellulata, Good.
*suberea**, Boott.
transversa, Boott.
villosa, Boott.
vesicaria, L.
wahuensis, Mey.
Zollingerii, Kze.

Gramineae.
Ehrharta caudata, Munro.
Coix Lacryma, L.
Lasiolytrum hirtum, Steud.
 (Phalaris hispida, Thbg.)
Hierochloa borealis, R. et S.
Beckmannia erucaeformis, R. et S.
Alopecurus japonicus, Steud.
geniculatus, Sm.
malacostachys, A. Gray.
Paspalum minutiflorum, Steud.
adelogaeum, Steud.
cognatum, Steud.
Phalaris arundinacea, L.
Milium globosum, Thbg.
Oplismenus Burmanni, Beauv.
Crus-galli, Kth.
Setaria chondrachne, Steud.
glauca, Beauv.
paucisetum, Steud.
Panicum xanthorrhizum, Steud. (?)
tuberculiflorum, Steud.
densepilosum, Steud.
acroanthum, Steud.
lepidotum, Steud.
bisulcatum, Thbg.
interruptum, W.
Helopus globosus, Steud.
villosum, Nees.
 (Paspalum villosum, Thbg.)
Pennisetum japonicum, Trin.
hordeiforme, Spr.
Gymnothrix japonica, Kth.
Arundinella anomala, Steud.
Goeringii, Steud.

Urachne acutigluma, Steud. (?)
Eccolopush andropogonoides, Sted.
 (Andropogon cotuliferum? Thbg.)
Agrostis tenuiflora, Steud.
Thunbergii, Steud.
 (ciliata, Thbg.)
fertilis, Steud.
japonica, Steud.
valvata, Steud.
laxiflora, A. Rich.
scabra, Willd.
Sporobolus elongatus, Br.
Cinna japonica, Steud.
Mühlenbergia japonica, Steud.
Polypogon littoralis, Sm.
Higegameri, Steud.
Monspeliensis, Desf.
demissus, Steud.
maritimus, W.
Calamagrostis brachytricha, Steud.
Phragmites longivalvis, Steud.
Roxburghii, Kth.
japonica, Steud.
Oxyanthe japonica, Steud.
 (Arundo nitida, Thbg.)
Leptochloa eragrostoides, Steud.
Eleusine indica, Gaertn.
 (japonica, Steud.)
Trisetum flavescent, L. var.
cernuum, Trin.
Avena japonica, Steud.
sativa, L.
Eragrostis ferruginea, Beauv.
aurea, Steud.
Poa annua, L.
strictula, Steud.
trivialis, L.
familiaris, Steud.
hirta, Thbg.
acroleuca, Steud.
psilocaulis, Steud.
diantha, Steud.
 (Eragrostis) Japonica, Thbg.
multicaulis, Steud.
euchroa, Steud.
ferruginea, Thbg.
pogonia, Steud.
 (barbata, Thbg.)
bulbillifera, Steud.
pratensis, L.
nemoralis, L.
maritima, Steud.
Glyceria fluitans, R. Br.
airoides, Steud.
ischyroneura, Steud.
caspia, Trin.
Melica nutans, L.
Lophatherum japonicum, Steud.
pilosulum, Steud.
Festuca parvigluma, Steud.
pauciflora, Thbg.
misera, Thbg.

*) Das Genus *Carex* ist von Dr. Boott bearbeitet. Die mit * hinter dem Arten-Namen bezeichneten Species sind von Corea und dürften sich auch auf den Japanischen Inseln finden.

Festuca remotiflora, Steud.	Davallia tenuifolia, Sw.	Pleopeltis nuda, Hook.
Thunbergii, Kth.	rhomboidea, Hook.	elongata, Kaulf.
tertia, Steud.	hirsuta, Sw.	Polypodium vulgare, L.
rubra, L.	strigosa, Sw.	Dryopteris, L.
Hemibromus japonicus, Steud.	japonica, Sw.	punctatum, Thbg.
Bromus bifidus, Thbg.	villosa, Wall.	ellipticum, Thbg.
racemiferus, Steud.	Cyrtomium falcatum, Presl.	Drymoglossum piloselloides, Presl.
conformis, Steud.	Aspidium (Lastrea) lacerum, Sw.	carnosum, Hook.
villiferus, Steud.	decursivo-pinnatum, Kze.	Niphobolus lingua, Spr.
japonicus, Thbg.	podophyllum, Hook.	hastatus, Kze.
aveniformis, Steud.	erythrosorum, Eat.	Lygodium japonicum, Sw.
Bambusa nigra, Lodd.	setosum, Sw.	Botrychium ternatum, Sw.
gracilis, Sieb.	dilatatum, Presl.	Virginianum ? Sw.
aurea, (Sieb.)	Filix-mas, L.	Osmunda japonica, Thbg.
caesia, S. et Z. (mss.)	attenuatum, Sw.	cinnamomea, L.
reticulata, Rupr.	Polystichum polyblepharon, Roem.	regalis, L.
ruscifolia, S. et Z. (mss.)	tripteron, Kze.	lancea, Thbg.
picta, S. et Z. (mss.)	(tripteris, Eat.)	Ophioglossum vulgatum, L.
bifolia, S. et Z. (mss.)	varium, Sw.	Equisetaceae.
floribunda, Zoll.	setosum, Sw.	Equisetum arvense, L.
Arundinaria japonica, S. et Z.	lacerum, Sw.	virgatum, Bl.
glaucescens, Beauv.	aristatum, Presl.	Marsileaceae.
Phyllostachys bambusoides, S. et Z.	Nephrodium parasiticum, Presl.	Marsilea quadrifolia, L.
megastachya, Steud.	sophoroides, Sw.	Lycopodiaceae.
Brachypodium sylvaticum, Huds.?	Goeringianum, Kze.	Lycopodium lucidulum, Mx.
Triticum vulgare, L.	sporadosorum, Kze.	serratum, Thbg.
semicostatum, Nees.	Scolopendrium vulgare, L.	Selago, L.
caninum, Schreb.	Asplenium lanceolatum, Huds.	japonicum, Thbg.
Hordeum vulgare, L. (cult.)	var. elegans.	plegmaria, L.
hexastichum, L. (cult.)	davalliodes, Hook.	clavatum, L.
Perotis latifolia, Ait.	incisum, Thunb.	trichiatum, Bory.
Rottboellia latifolia, Steud.	japonicum, Thbg.	Selaginella involvens, Spreng.
foliata, Steud.	canaliculatum, Bl.	ornithopodioides, Spreng.
Andropogon serratus, Retz.	trichomanes, L. var.	Musci.
crassipes, Steud.	Athyrium Filix-foemina, Roth.	Sphagnum squarrosum, Hornsch.
anthephoroides, Steud.	fontanum, Roehl.	Phascum crispatum, Sull.
stipaeformis, Steud.	cystopteroides, Eat.	Weissia viridula, Brid.
lasicoleos, Steud.	crenatum, Rupr. var. β.	Rhabdoweisia fugax, Br. et Sch.
Iwarankusa, Roxb.	Goeringianum, Mett.	Dicranella crenata (Sull.)
laxus, Willd.	Diplazium lanceum, Presl.	obscura, Sull. et Lesq.
(serratus, Thbg.)	virescens, Kze.	Dicranum scoparium, Sull.
dichroanthus, Steud.	Onoclea sensibilis, L.	Trematodon longicollis, Hsch.
ampliflorus, Steud.	Struthiopteris orientalis, Hook.	Leucobryum glaucum (Sull.)
anthisterioides, Steud.	Onychium japonicum, Kze.	Boninense, Sull. et Lesq.
Anthistiria japonica, Willd.	Pteris cretica, L.	Trichostomum pallidum, Brid.
Imperata pedicellata, Steud.	serrulata, L.	inflexum, Bruch.
Saccharum obscurum, Steud.	aquilina, L.	Barbula unguiculata, Hedw.
Erianthus japonicus, Beauv.	semipinnata, L.	Ceratodon purpureus, Brid.
Pogonatherum saccharoideum, Beauv.	sinuata, Thbg.	Eustichium Norvegicum, Brid.
Eulalia japonica, Trin.	Lomaria nipponica, Kze.	Orthotrichum fastigiatum, Bruch.
Zoysia japonica, Steud.	eriophlebia, Kze.	japonicum, Sull. et Lesq.
Filices.	Blechnum Spicant, L.	Hedwigia ciliata, Ehrh.
Gleichenia dichotoma, Hook.	Doodia dives, Kze.	Entosthodon acuminatum (Sull.)
glauca, Hook.	Woodwardia radicans, Sw.	ericetorum, C. Muell.
Dicksonia marginalis, Sw.	japonica, Sw.	Bryum pyriforme, Hedw.
Woodsia ilvensis, Br.	Gymnogramme japonica, Kze.	nutans, Hook.
polystichoides, Eat.	serrulata, Bl.	torquescens, Br. et Sch.
Adiantum pedatum, L.	Leptogramme Totta, J. Sm.	pallescens, Br. et Sch.
caudatum, L.	Nothochlaena piloselloides, Kaulf.	megalodictyon, Sull. et Lesq.
aethiopicum, L.	Selliguea pothifolia, J. Sm.	Mnium punctatum, Hedw.
monochlamys, Eat.	Drynaria hastata, Fée.	trichomanoides, Mitt.
Davallia chinensis, Sw.	ensata, Hook.	

Mnium flagellare, Sull. et Lesq.	Hypnum gracile, Br. et Sch.	Gymnogongyucus furcellatus, Ag.
radiatum, Wils.	Fissidens laxus, Sull. et Lesq.	flabelliformis, Harv.
Bartramia pomiformis, Wahl.	incrassatus, Sull. et Lesq.	pinnulatus, Harv.
fontana? Schw.	pungens, Sull. et Lesq.	lingulatus, var. angustatus.
Atrichum angustatum, Br. et Sch.	japonicus, D. et M.	Gigartina lancifolia, Harv.
Pogonatum aloides, Brid.	Ptychomitrium Wilsoni, Sull. et Lesq.	affinis, Harv.
tortile, Sw.	Macromitrium insulare, Sull. et Lesq.	Cystoclonium armatum, Harv.
alpinum, Brid.	gymnostomum, Sull. et Lesq.	Nemastoma livida, Harv.
japonicum, Sull. et Lesq.	<i>Algae.</i>	Gloiosiphonia capillaris, Carm.
Polytrichum juniperinum, Hedw.	Sargassum filicinum, Harv.	Ceramium rubrum, Auct.
commune, L.	Ringoldianum, Harv.	Gloiopelets coliformis, Harv.
Hypnum seitum, P. B.	Rodgersianum, Harv.	Endocladia complanata, Harv.
minutulum, Hedw.	siliquastrum, Ag. var.	Caulerpa brachypus, Harv.
Starkii, Brid.	corynocarpum, Harv.	Cladophora Wrightiana, Harv.
crassinervium, Tayl.	Cystophyllum fusiforme, Harv.	Stimpsonii, Harv.
populeum, Hook.	var. β clavigerum.	densa, Harv.
salebrosum, H. et T.	Fucus Wrightii, Harv.	<i>Fungi.</i>
velutinum, L.	Babingtonii, Harv.	Agaricus adianticeps, Berk. et Curt.
rutabulum, H. et W.	Ecklonia Wrightii, Harv.	stellulatus, Berk. et Curt.
serpens, Hook.	Alaria pinnatifida, Harv.	japonicus, Berk. et Curt.
adnatum, Hedw.	Costaria Turneri, Grev. var. pertusa.	porphyrophyllus, Berk. et Curt.
denticulatum, L.	Odonthalia obtusangula, Harv.	Bolbitius Oryzae, Berk. et Curt.
serrulatum, Brid.	Desmarestia viridis, Lamour.	Corticarius Wrightii, Berk. et Curt.
microcarpum, Hsch.	Chorda lomentaria, Lyngb.	Lactarius lividatus, Berk. et Curt.
brevirostre, Brid.	Chordaria simplex, Harv.	Marasmius cremoriceps, Berk. et Curt.
triquetrum, L.	Rhytiphlaea complanata, Ag. var.?	galeatus, Berk. et Curt.
splendens, Hedw.	latiuscula, Harv.	acicola, Berk. et Curt.
Oakesii, Sull.	Chondria crassicaulis, Harv.	Lenzites japonica, Berk. et Curt.
pratense, Koch.	atropurpurea, Harv.	Boletus rhodomycetes, Berk. et Curt.
Haldanianum, Grev.	Polysiphonia Morrowii, Harv.	Polyporus (Mesopus) ochrotinctus,
cupressiforme, L.	japonica, Harv.	Berk. et Curt.
polymorphum.	Stimpsoni, Harv.	Hydnus (Mesopus) Wrightii, Berk.
cuspidatum, L.	calacantha, Harv.	et Curt.
assurgens, Sull. et Lesq.	flabellulata, Harv.	Stereum suberuentatum, Berk. et Curt.
dispersum, Sull. et Lesq.	Laurencia virgata, Ag. var.?	Lycoperdon plicatum, Berk. et Curt.
oblongifolium, Sull. et Lesq.	Lomentaria catenata, Harv.	Uromyces japonica, Berk. et Curt.
simodense, Sull. et Lesq.	Amphiroa californica, Dene.?	Helicoma fasciculatum, Berk. et Curt.
macrostegium, Sull. et Lesq.	Delesseria serrulata, Harv.	Peziza japonica, Berk. et Curt.
flaccidum, Sull. et Lesq.	Gelidium cartilaginem, Grev.	leptida, Berk. et Curt.
spinulosum, Sull. et Lesq.	corneum, Lamour.	porphyra, Berk. et Curt.
thelidictyon, Sull. et Lesq.	Wrangelia? Tanegana, Harv.	leucophaea, Berk. et Curt.
pohliaecarpum, Sull. et Lesq.	Desmia japonica, Harv.	Asterina sepulta, Berk. et Curt.
erectiusculum, Sull. et Lesq.	Gracilaria gigas, Harv.	Meliola dichotoma, Berk. et Curt.
Rodgersianum, Sull. et Lesq.	Suhria japonica, Harv.	Cystotheca Wrightii, Berk. et Curt.
eximum, Sull. et Lesq.	Halosaceion japonicum, Harv.	
Smallii, Sull. et Lesq.	Wrightii, Harv.	

Neue Bücher.

Endlicher's *Paradisus Vindobonensis*, Abbildungen seltener und schönblühender Pflanzen der Wiener und anderer Gärten und Museen, von Anton Hartinger, erläutert von Dr. Berth. Seemann. Band I, Wien 1844—1860. Gross Folio, Preis 168 fl. öst. W. oder 112 Thlr. — Band II, Lief. 1 u. 2, 1861—62, à 7 fl. öst. W. oder 4 $\frac{2}{3}$ Thlr.

Illustrations of Rare and Ornamental Plants of the Viennese and other Gardens and Museums by Anton Hartinger, described by Berthold Seemann, Ph. Dr., F. L. S. etc.

Endlicher's *Paradisus Vindobonensis*, von welchem der erste Band mit 80 Tafeln (darunter zwei Doppeltafeln) jetzt vollständig erschienen ist und zwei Lieferungen des zweiten Bandes ebenfalls durch den Buchhandel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bonplandia - Zeitschrift für die gesammte Botanik](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Bonplandia

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss aller seit Thunberg in Japan gesammelten Pflanzen. 88-100](#)