

sich mehr und mehr ausbreiten, je weiter man landeinwärts geht, wobei die zeitweise überschwemmten Gründen mehr und mehr abnehmen. Da sich aber Ebbe und Fluth noch weit in's Innere hinein bemerkbar lässt und die Hauptflüsse das ganze Land hindurch selbst bis Tebing-tingi auf dem Mussi, bis Lahat auf dem Lamattang, bis weit oberhalb Batu-radja auf dem Ogan und bis Muara-duwa auf dem Kommering befahrbar sind, so ist hieraus hinreichend ersichtlich, dass der Boden sich nicht bedeutend erhebt, während noch an allen diesen Flüssen ziemlich breite Streifen Alluvialboden sich gebildet haben, die zeitweise überschwemmt werden. Erst oberhalb Tebing-tingi fängt das Terrain an, bergig zu werden, während man zu Batu-radja am Ogan und zu Muara-duwa am Kommering noch weit vom Gebirge entfernt ist und nur in der Ferne an den Grenzen der Lampung's und von Benkulen einzelne hervorragende Gipfel erscheinen, so dass man die ganze Provinz mit Ausnahme dieses Grenzlandes von Benkulen als aus Sumpfen, Tiefland und hügeligem Terrain bestehend betrachten kann, in dem kein einziger Berg zu finden ist.

Die Bevölkerung habe ich überall sehr wohlhabend, gutgesinnt und zufrieden gefunden, so weit ich dies auf meiner kurzen Reise beobachteten konnte; die Polizei wird streng gebandelt und die geringsten Übertretungen mit Geldbußen geahndet, die das Hauptekommen der Häuptlinge anstreben. Man lebt landeinwärts viel einfacher als auf dem Hauptorte selbst; man ist mit der europäischen Regierung viel besser zufrieden, als mit der früheren der Sultane; nur in den Gröndistricten bei Benkulen und Djambi kommen einzelne Banditen vor, die das Land beunruhigen und auf Mord und Raub ausgehen; diese Räuberbanden werden aber schwierig auszurotten sein, so lange Passuma Redjang und der Sultan von Djambi nicht zum Gehorsam gebracht sein werden und man diese Gegenden nicht durch Besetzungen im Zaume halten kann.

Am 16. August verliess ich Palembang, sehr zufrieden mit dem was ich gesehen, gefunden und gelernt hatte und mit Dank erfüllt über die genossene Gastfreundschaft und Beihilfe; ich kam innerhalb 24 Stunden mit

einem Postboote zu Muntok an, wurde auf Rudern an's Land getragen und schiffte mich am 18. auf dem Mailboote von Singapore nach Batavia ein, wo ich am 20. August 1857 glücklich anlangte.

Buitenzorg, September 1858.

J. T. Teysmann.

Aroideenskizzen.

Caladium Vellozianum. Petioli elongati, subhippedales, immaculati? Lamina fol. sagittato-ovata, concolor, lobo antico arcuatim-acuminato, posticis obtusatis, antico parvo breviribis, ad tertiam partem connatis. Pseudonervum internum a margine parvum distans. Pedunculus petiolo brevior. Spatha ultra triplicaris, tubo ellipsoideo. Spadix basi e spatha sublateraliter exsertus, substipitatus, ad tertiam partem semineus, ad medium usque deinde synandrois 4-serialibus tectus, spica mascula utrinque leviter-attenuata. Stigmata majuscula, approximata. — Bahia (Herb. D. C.)

Synon. *Arum Vermoxiemum* Fl. Flum. IX.
1. 108.

Acontias Cubensis. Petiolus obsoletemaculatus? adultae stirpis crassus, elongatus (sesquipedalis et ultra), glaber. Lamina fol. ampla, juniorum specimina tripartita, partitionibus lateralibus subauriculatis; vénisiorum expedita sub 5-partita, partitione media late-ovata (6 pollies lata), basi versus rotundata - angustata, apice cuspidato-acuminata, lateralibus ex inaequilatero oblongo-ovatis, acuminatis; extimus auriculae ad instar plus minus exsertis apice rotundatis; omnibus contignis, glabris, latissima diachymatis portione confluentibus. Venae partitionum utrinque sub-5. Pseudonervum internum partitionis mediae e venis infinitis quasi interlobariis exortum a margine distans. Spatha acuminata, glabra. Spadix ad quintam circiter partem ovaris, deinde ad medium usque synandrois obsitus. — Havana (Ramon de la Sagra in Herb. D. C.)

Syngonium neglectum. Vagina petiolaris medium petiolum ohvestiens. Lamina fol. 5-1. cum auriculis 7-secta. Segmentum intermedium oblongum, basi arcuato-cuneatum, apice acuminatum, venis costalibus 4-5, inferioribus

manifestis, patentibus. Segmenta lateralia angustissima diachymatis portione cum intermedio connexa, distantiuscula, forma et venis intermedio majori fere conformia, magisque vero ex lanceolato acutata. Anriculae obverse-lanceolatae apice rotundatae. — Mexico, ppe Mirador (Herb. Liebm.)

Synon. *Syngonium auritum* Hrb. Liebm.
*Philodendron (Glossophyllum) Blanchetianum.*⁴ Petiolus 5-pollicaris, vagina (florigera?) ultra-sesquipollieari instructus. Folii lamina obverse-oblonga l. oblonga, 3½—4 pollices lata, 10—12 pollices longa, basi rotundata, apice plus minusve repente et arcuatim angustata, cuspide brevi aucta. Venae utrinque 6—7, aperte-patentes, vix venulis densissime exsertis multo crassioribus. Spatha sub-5-pollicaris, brevissime cnspidato-apiculata. Spadix spathae longitudine ad medium circiter ovariis obsitus. — Brasilia (Bahia, Blanchet in Herb. D. C.)

Philodendron (Pteromischum) Segninae. Vagina petiolaris fere ad apicem petioli producta, apice libere-pronimula, ibi rotundata l. truncato-rotundata et retusa. Lamina fol. oblongo-elliptica, basi rotundata l. vix acne vix cuneata, apice abrupte cuspidata, cuspide anguste lanceolata, modica. Venae costales sub-7, patentes, apice arcuatae, remotae, venulis paulo crassiores. Spatha 4-pollicaris, apice brevissime-cuspidulata. Spadix spatham fere superans. — Mexico, Oaxaca (Liebm.)

Synon. *Diellenbachia Segnina* Herb. Liebm.

Philodendron (Pteromischum) placidum. Petioli proportione breves (2—2½-pollicares), ad apicem fere usque vaginati, vagina exitu trimeato-rotundata, vix retusa, laminae incumbeute. Lamina fol. inaequilatera oblique l. subobliqua-ovala l. ovato-oblonga, 4—5 pollices longa, 2 pollices et ultra lata, basi breviter-cuneata, apice abrupte cuspidulata, venis costalibus sub-7 utrinque, aperte-patentibus. Spatha breviter-cuspidata, ultra-tripollicaris. Spadix ad tertiam partem ovariis onustus. — Cayenna (Hrb. D. C.)

Philodendron (Oiocardium?) Krebsii. Petiolus vagina petiolaris carens, elongatus. Lamina fol. ovato-elliptica l. oblongo-elliptica, basi leviter-cordata, auriculis l. lobulis rotundatis, leviter arcuata linea cum lobo antico principaliter confluentibus, sini subaperto distan-

tibus, apice arcuatim-angustata, subcnspidato-acutata. Costa crassecinsula. Venae primariae vix distinctae. Venulae costales patentissimae, densissimae, rectiusculae, in margine laminae abrupte sursum curvatae, confluentes. — St. Thomas. H. Krebs (in Herb. Hafniense).

*Philodendron (Polytomum) polytomum.*⁴ Scandens. Lamina fol. ex cordato sagittata, pinnati-partita sinu petiolaris profundo, partitionibus angustis approximatis, anticis (sub-6 utrinque) inferne plerumque integerrimis, raro dente obsoleto instructis, supra medium lacinula dentiformi fere utrinque auctis; posticis lacinulis duabus praeditis, quarum insima lanceolata, longula, suprema dentiformis. Partitionis terminalis ultra vicinas producta, oblongo-lanceolata. — Mexico, Colipa (Liebm.)

Synon. *Philod. lacerum* Hrb. Liebm.

Observ. Lamina fol. ab exitu lobi postici ad apicem 30—32 pollices metiens, costa 20—21-pollicari, lobis posticis 12—13-pollicaribus. Proxime accedit ad Ph. radiatum, tamen differt.

*Homalomena Zollingeri.*⁴ Lamina fol. cordato-rotundata, apice abrupte cnspidulata, lobis posticis productis, obtusissimis, incumbentibus l. sinu parabolico angusto sejunctis. Spatha albida. Spadix crassus; spica feminea tertiam partem occupans; mascula sensim leviterque incrassata, apicem versus attenuata. — Java, Zolling.

Synon. *Homalomena cordata* Zollinger.

Observ. Valde differt ab iconе Houttuyni, quae, laminam fol. cordato-ovatam, longe-cuspidatam, lobos posticos sinu lato remotos repraesentat.

Spathanthemum Spatha persistens.⁴ Spadix spathae longiori ex toto accretus, inferne floribus femineis, apice masculis tantum onustus, medio longitudine serielim androgynus, seriebus duabus extinis femineis, intimis masculis. Flores masculi sive synandria stipitata, loculis circum apicem connectivi communis, vertice convexo ex peltato 5—7-lobato-sulcato, contiguis, linearibus, tota longitudine verticaliter-accretis rimaque longitudinali aperientibus. Flores feminei distantes organis neutris 5—8, ex tereti clavatis brevibus cincti, subabrupte ex ovario in stylum elongatum producti, stigmate peltato 6—8-partito, partitionibus linearibus, obtusis, coriaceis. Ovaria 5—8-locularia, loculae unis ovulatis, ovulo ex axeos ima parte exerto

longule-funiculato, erecto, micropyle tholospectante. Semen ellipsoideum, mycropylen versus leviter-attenuatum.

Spathanthemum Orbignyanum. Folia ignota. Pedunculus erectus, firmulus, sub-5-pollicaris. Spatha oblongo-lanceolata, acuminata, tripollicaris longitudine, pollicaris et ultra latitudine (expansa). Spadix medianus spatham haud multo superans, flocculis copiosis $1\frac{1}{2}$ -2 lineas longis obsitus. — (Herb. D. C.) ~~versa~~

Anthurium (Leptophyllum) macilentum. Petiolus tenuis, 15-pollicaris, geniculato brevissimo. Lamina fol. obverse-lanceolata, cuspidato-acuminata, basin versus, jam ab ultima supra parte, sensim sensimque angustata. Venae costales plures, patentes, in pseudoneurum in media lamina a margine distantiusculum anastomosantes. Pedunculus tenuis, sub-18-pollicaris. Spatha proportione parva, brevis, linearilanceolata, basi vix decurrentis, apice longiuscula subulato-cuspidata. Spadix juliformis, vix stipitatus, tripollicaris. — *Neogramata Canina* (Holton, in Herb. D. C.)

Anthurium (Cardiophyllum) Liebmansi. Geniculum $\frac{3}{4}$ -pollicare. Lamina fol. coriacea, cordiformis, impunctata, 15-16 pollices lata, lobis posticis semiovatis, subparallelis, sinn profundo (5-pollicari), inferne rotundato distantibus, lobo antico apice sensim acutato ultrapedali (15-16-pollicari). Venae loborum posticorum sub-7, inferne rectiusculae, haud multo a margine distantes, fere repentina et rectangulari in marginem excurrentes; interlobares inferne rectae, angulo recto a se invicem distantes, apicem versus arcuatae et in pseudoneurum continuum lobi antici margini approximatim procurrentes; costales 4-5 ntrinque, inferiores patentissimae, reliquae patentes, arcuatae. Spatha lanceolata oblonga, basi parum decurrentis, apice in cuspidem elongatum sensim angustata, 6-7 pollices longa, $\frac{5}{4}$ pollicis lata. Spadix vix stipitatus, 7-8-pollices longus. — Mexico, Oaxaca (Liebm.).

Synonym. *Anthurium umbrosum* Herb.
Liebm. pro parte!

Anthurium (Cardiophyllum) cordato-sagittatum. Petiolus longus, firmus. Lamina fol. cordato-sagittata, fere a lobis ad apicem sensim angustata, lobo antico acentato, posticis subsemiellipticis exitu rotundatis, sinu lato rotundato sat profundo distantibus. Costa principalis modice crassula, posticæ arcuatae re-

trocurvae, fere crassiores, in sinu longe denuodatae. Venae interlobares angulo valde acuto exsertae, longe procurrentes a medio lobo antico circiter pseudoneurum subinterruptum internum, a margine distantiusculum constrictores; reliquæ venæ hujus lobi arrecto-patentes. Venulae areolas majusculas formantes. Pedunculus haud longus, firmus. Spatha lineari-lanceolata, cuspidata, basi subamplexa. Spadix juliformis, spatha paulo longior, stipite brevi suffultus. — *Guiana Gallica* (Poiteau in Herb. D. C.)

Anthurium (Dactylophyllum) aemulum. Scandens. Petioles longi teretes. Segmenta 5-7-l. phira? exceptis extimis oblique et inaequilatero-lanceolatis obverse-oblonga l. obverse-lanceolata, basi sensim cuneata in ansae verticem usque, apice subsensim longe-acuminata, omnia petiolo multo breviora; intermedium 6 pollices longum, $1\frac{1}{2}$ -2 pollices latum. Pseudoneurum a margine remotum. Spadix sessilis. — Mexico, Colipa (Liebm.)

Synon. *Anthr. undatum* (Herb. Liebm.)
— *Pothos decipiens* Internodia $1\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{4}$ -pollicaria. Petioles late-cuneati, internodio triplo quadruplove longiores, apice auriculis prominentibus triangularibus. Lamina fol. ovato-lanceolata, raro lanceolata, basi rotundata, apice sensim acuminata, petiolum longitudine et latitudine superans. Pedunculus brevis e vaginula bracteante elongata suprema parum procedens. Spatha ultra- $1\frac{1}{4}$ -pollicaris, surrecta, oblonga, sensim acuminata, spadicis ellipsoidei, transverse sesquilinearis stipellum refractum duplo fere superans, valde ultra medium spadicem prodnetibilis, pedunculo paululo brevior. — India orient. (Vogt in Herb. Hafu.).

Sehott.

Neue Bücher.

Das Pflanzreich. Anleitung zur Kenntnis des selben nach dem natürlichen System, unter Hinweisung auf das Klinne'sche System. Von Dr. E. Wimmer, Director des K. Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau. Neue Bearbeitung. Mit 560 Abbildungen. Breslau. F. Hirt. 1858. 8v. 224 p.

Dieser „Ergänzungsband“ zu Samuel Schilling's Grundriss der Naturgeschichte gereicht dem Verfasser der geschätzten Flora von Schle-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bonplandia - Zeitschrift für die gesammte Botanik](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Schott H. (M.) G.

Artikel/Article: [Aroideenskizzen. 163-165](#)