

Arundinellearum, Graminum tribus, conspectus
auctore MARGARETHA JANOWSKI (Koenigsberg Pr.).

Arundinelleae Mez in Fedde, Repert. XVII (1821) 84. - TRIESTEGI-
NEAE Nees in Beech. Voy. Bot. V (1836) 230 et in Nov. Act. Leopold. XIX (1843)
Suppl. I, 177.

Inflorescentiae panniculatae; spiculae hermaphrodites, normâ geminatae vel rari-
us solitariae, secus panniculae ramulos inarticulatos cum pedicello articulatae.
Glumae 3, membranaceae, muticae vel ex apice aristatae. Gluma II. saepissime spicu-
lae longitudine. Gluma III. sueto florem imperfectum fovens. Palea inferior acuta
vel acuminata vel saepius aristâ geniculatâ vel rectâ terminata, cum palea superio-
re hyalina et tenuior membranacea. Flos perfectus hermaphroditus.

Conspectus generum.

A Spiculae a latere compressae.

I Semen maturum inter glumas inclusum.

a Flos inferior adest cum palea nunc vacua nunc raro fertili: I. Arundinella.

b Flos inferior cum palea omnino deesi: II. Thysanolaena.

II. Semen maturum inter glumas liberum: III. Phaenosperma.

B Spiculae a dorso compressae: IV. Beckera.

I. ARUNDINELLA Raddi.

Arundinella Raddi, Agrost. Brasil. (1823) 37. - Goldbachia Trin. in Sprg. Neue Entd.
II (1821) 81. - Thysanachne Presl, Thys. nov. pl. gen. (1830) et in Symb. Bot. I
(1830) 11, tab. 6. - Brandtia Kth. Gram. (1830) 511, tab. 170.

Spiculae acutae vel acuminatae, secus ramulos panniculae normâ geminatae vel rari-
us solitariae, pedicellis inaequilongis; flore terminali hermaphrodito unico inter-
dum addito inferiore masculo vel rarius foemineo vel abortivo, vel rarissime floribus
hermaphroditis duobus. Glumae 3, membranaceo-chartaceae, carinatae, infima lon-
gitudine sequentem haud aequans, mutica. Gluma II. acuminata, spiculae longitudine,
pariter vacua; III. quam praecedens semper brevior, mutica, paleam breviorem hyalini-
nam interdumque florem saepissime masculum fovens. Palea inferior maturitate paullo
indurascens, quam glumae brevior et satis tenuior, apice integra vel ad latera aris-
tae utrinque in setas breviores producta, arista terminali tenui, basi saepe genicu-
lata instructa vel mutica, basi saepissime pilosa, paleam superiorem hyalinam et
florem hermaphreditum in axilla fovens. Lodiculae 2; stamina 3, antheris oblongis.
Styli a basi distincti stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga, inter glumas libera.

Conspectus specierum.

A Gluma I. apice late rotundata, sequente plus quam duplo brevior.

I. Spiculae longe pilosae: A. stipoides.

II. Spiculae glabrae: A. Hildebrandtii.

B Gluma I. apice acuta vel anguste rotundata, plus quam $\frac{1}{2}$ se-
cundae longitudine.

II. Palea inferior haud vel brevissime tantum aristata. A. Lawsoni.

a Foliis ligula deest:

b Foliis ligula adest.

1. Laminæ dorso dense pilosae: A. decempedalis.

2. Laminæ dorso haud vel rarissime laxissime pilosae.

A. leptochloa.

+ Palea inferior apice late rotundata vel truncata:

++ Palea inferior apice acuta.

* Palea inferior basi pilis plus minus longis insidens.

A. mutica.

§ Gluma I. trinervia:

A. anomala.

§§ Gluma I. quinquenervia:

** Palea inferior basi pilis haud insidens.

A. gigantea.

§ Spiculae geminatae vel ternatae:

§§ Spiculae solitariae.

: Ramuli ad insertiones glabri:	A. Thwaitesii.
:: Ramuli ad inseriones longe pilosi:	A. blephariphylla.
II. Palea inferior bene aristata.	
a Palea inferior apice in setam centralem longiorem et setas 2 laterales breviores producta.	
1. Glumae I. et II. haud pilosae.	
+ Gluma I quinquenervia:	A. avenacea.
++ Gluma I. trinervia.	
* Foliorum laminas dorso glabrae.	
§ Gluma III. trinervia:	A. sinensis.
§§ Gluma III. quinquenervia.	
: Palea inferior pilis haud insidens:	A. lasiostoma.
:: Palea inferior basi pilis insidens:	A. setosa.
** Lamniae dorso pilosae:	A. nervosa.
2 Glumae I. et II. tuberculose pilosae.	
+ Palea inferior dorso basi et utrinque medio penicillis pilorum alborum aucta:	A. elegantula.
++ Pales inferior dorso glabra.	
* Ramuli breves, spiculis dense confertis; panícula ad 0,7 m longa:	A. mesophylla.
** Ramuli longiores, spiculis laxius obsiti.	
§ Gluma I. trinervia.	
: Planta perennis:	A. hirsuta.
:: Planta annua:	A. tuberculata.
§§ Gluma I. quinquenervia:	A. khaseana.
b Palea inferior in aristam unicam producta.	
1. Glumae I. et II. pilosae.	
+ Ramuli breves, spiculis densissime confertis; gluma I. trinervia:	A. villosa.
++ Ramuli plus minus elongati, spiculis sublaxis vel si densioribus tunc ramuli stricte erecti unde panícula dense cylindrica.	
* Gluma I. septemnervia:	A. pilosa.
** Gluma I. tri- vel quinquenervia.	
§ Pannicula coarctata, anguste cylindrica.	
: Laminæ semper glabrae:	A. glabra.
:: Laminæ normâ pilosae:	A. ciliata.
§§ Pannicula laxa.	
: Culmus e nodis sueto radicans:	A. procumbens.
:: Culmus e nodis haud radicans:	A. decomposita.
2. Glumae I. et II. glabrae.	
+ Spiculae minutæ, usque ad 2 mm longae.	
* Folia 25 - 50 mm longa:	A. pygmaea.
** Folia usque ad 0,25, sueto ad 0,07 m longa†	A. tenella.
++ Spiculae constanter plus quam 2 mm longae.	
* Ramuli breves, spiculis dense confertis, stricte erecti unde inflorescentia cylindrica:	A. stricta.
** Ramuli plus minus elongati, spiculis laxius obsiti.	
§ Paleae inferioris arista haud gesciculata.	
: Paleae inferioris arista recta:	A. virgata.
:: Paleae inferioris arista flexuosa.	
(Laminæ dorso glabrae:	
((Laminæ dorso pilosae.	A. robusta.
/ Palea floris inferioris apice 2-partita haud pilosa:	
// Palea floris inferioris apice acuta vel angustissime rotundata et breviter pilosa.	A. convoluta.
? Vaginae dorso prope basin laminæ longe densissimeque pilosae, nitide pellitae:	
!! Vaginae dorso glabrae vel laxe pilosae.	A. aulestica.

. Tota planta glauca:	A. glauca.
.. Tota plants flavo-virens:	A. Berteroniana.
§§ Paleae inferioris arista geniculata.	
: Gluma I. quinquenervia.	
(Spiculae 7 mm longae:	A. grandiflora.
((Spiculae usque ad 4,5 mm longae.	
/ Laminæ planæ:	A. Goeringii.
// Laminæ filiformes:	A. filiformis.
:: Gluma I. trinervia.	
(Palea inferior emarginata juxta aristam lobulis parvis subrotundatis terminata.	
/ Palea inferior nervis lateralibus aristae basin nunquam attingentibus:	A. Metzii.
// Palea inferior nervis lateralibus aristae ad basin convergentibus:	A. fuscata.
((Palea inferior apice acuta in aristam simplicem producta.	
/ Spiculae normâ solitariae:	A. capillaris.
// Spiculae normâ geminatae.	
! Palea inferior basi pilis haud insidens.	
. Ramuli ad insertiones glabri:	A. rigida.
!! Ramuli ad insertiones barbati:	A. purpurea.
!! Palea inferior basi pilis insidens.	
. Spiculae basi pilis insidentes:	A. Ecklonii.
.. Spiculae basi glabrae.	
(Plantæ annuae.	
/ Culmorum nodi glabri:	A. nervosa.
// Culmorum nodi pilosi:	A. saespitosa.
((Plantæ perennes.	
/ Planta haud infra 2 m alta:	A. elata.
// Plantæ satis minores.	
% E culmi nodis haud radicantes.	
o Pannicula subpauci- usque ad multiflora:	A. hispida.
oo Pannicula myriantha.	
& Palea inferior trinervia:	A. Palmeri.
&& Palea inferior quinquenervia:	A. phragmitoides.
%% Culmi e nodis inferioribus radicans:	A. pubescens.

1. Arundinella stipoides Hackel in Sitzungsber. Akad. Wien LXXXIX (1884) 123.
Madagascar: Hildebrandt nr. 3999.
2. Arundinella Hildebrandtii Mez in Fedde, Repert. XVII (1921) 84.
Madagascar: Hildebrandt nr. 4077.
3. Arundinella Lawsoni Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 76.
India, Nilghiri-Berge (Lawson).
4. Arundinella decempedalis (O. Ktze.) Janowski in Fedde, Repert. XVII (1921) 84.-
Panicum decempedale O. Ktze. Revis. (1891) 783. - Arundinella Clarkei Hook. fil.
Flor. Brit. Ind. VII (1897) 75.
India, Sikkim (Clarke, O. Kuntze).
5. Arundinella leptochloa (Nees) Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 76. - Panicum leptochloa Nees ap. Steud. Syn. Glumac. I (1854) 62. - Leptochloa panicoides Herb. Wight ex Steud. l. c. - Panicum zeylanicum Nees et Arn. ex Hook. fil. l.c.
Ceylon (Thwites nr. 918, Wight); India, Concan (Mebold. nr. 1051, Wight herb.
propr. nr. 125).
6. Arundinella mutica Nees ap. Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 116. - Acratherum muticum Nees in herb., nunc Berol. ined.
India: Heyne ap. Wallich nr. 8665.
7. Arundinella anomala Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 116. - Agrostis ciliaris Herb. Lugd.-Bat. ex Steud. l. c. - Panicum mandschuricum Maxim. Frim. Flor. Amur.
(1859) 328. - Panicum Williamsii Hance in Ann. Soc. Nat. 5. ser. V (1866) 250.

Ostasiatisches Florengebiet: Mandschurei (Bonhof nr. 75, Komarow nr. 130); Ost-Mongolei (David nr. 1901); China (du Bois-Reymond nr. 138, Hass nr. 10, Henry nr. 1059, 4284, 4290, Krug nr. 10a, Prahl nr. 8, Krug nr. 117, 118, Schindler nr. 220, 313a, Schottmüller nr. 363, Warburg nr. 5552, Zimmermann nr. 514); Korea (Faurie nr. 1241, Gottsche; Taquet nr. 6, 1764, 1767, 1769, 1836, 1927, 1928, 1955, Warburg); Japan (Maximowicz, Naumann, Rein nr. 312, Saida, Tokubuchi, Warburg, Wicheru nr. 759).

8. Arundinella gigantea Dalz. in Dalz. et Gibbs. *Bombay Fl.* (1861) 293.

India, Concan (Stocks), Kineschwur (Dalzell et Gibson).

9. Arundinella Thwaitesii Hook. fil. *Flor. Brit. Ind. VII* (1897) 77. - Arundinella nervosa var.: Thwaites ex Hook. fil. l.c. Ceylon (Thwaites, Walker).

Obs. - Species fortasse ad *Panicum referadda* mihi haud visa; *Panico tryphero* Schult. fil. nimis affinis videtur.

10. Arundinella blephariphylla (Trim.) Hook. fil. *Flor. Brit. Ind. VII* (1897) 77. -

Panicum blephariphyllum Trimen in *Lond. Journ. Bot. XXIII* (1885) 222.

Ceylon (Ferguson, Trimen).

11. Arundinella avenacea Munro ap. Thwaites, *Enum. Pl. Ceyl.* (1864) 362. - Arundinella Campbelliana Lisb. in *Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. V* (1891) 346. - *Avens malabarica* Heyne ex Hook. fil. *Flor. Brit. Ind. VII* (1897) 69.

Ceylon (Thwaites nr. 3471); India (Clarke nr. 45086E, Griffith nr. 6784, 6785, Meebold nr. 10572, 12179, Perrottet nr. 1240, Schlagintweit nr. II. 125, Wallich nr. 8670, Warburg nr. 3471).

12. Arundinella sinensis Rendle in *Journ. Linn. Soc. XXXVI* (1903-05) 342.

China, Kwang-Tung (Ford nr. 201, 212), Lofau-Schan (Ford nr. 125).

13. Arundinella lasiostoma Schum. et Lauterb. *Flor. Deutsch. Südsee* (1901) 174.

Neu-Guinea (F. H. Brown nr. 188, Lauterborn nr. 2744, Schlechter nr. 18492).

14. Arundinella setosa Trin. Gram. *Panic.* (1826) 65. - Arundinella stricta Nees in Hook. *Kew Journ. II* (1850) 102. - Arundinella Zollingeri Steud. *Syn. pl. Glumac. I* (1854) 114. - Arundinella cimicinoides Roxb. ex Hook. fil. *Flor. Brit. Ind. VII* (1897) 70.

Mensungebiet: Indien (Griffith nr. 6786, Hooker fil. et Thomson, Meebold nr. 10456) Java (Ernst, Teysman, Warburg nr. 2596, 3566, Zollinger nr. 2834); Philippinen (Bur. Gvt. Lab. herb. nr. 5762, Bur. Sci. herb. nr. 427, 16209, Bur. Agr. herb. nr. 129, Elmer nr. 12575, Merrill nr. 138); Formosa (Faurie nr. 716); Tonkin (Balansa nr. 360); Formosa (Faurie nr. 751), Amoy (Warburg nr. 5552); Yun-Nan (Henry nr. 10518A)

15. Arundinella nervosa Nees ex Hook. et Arn. *Bot. Beech. Voy.* (1841) 237. - Holcus nervosus Roxb. ex Steud. *Syn. pl. Glumac. I* (1854) 115. - Agrostis biseta Sprg. ex Steud. *Nomencl. 2. ed. I* (1841) 143. - Arundinella indica Trin. ex Steud., *Nomencl. l.c.* - Anemargostis Neesiana Wight et Arn. ex Steud. *Syn. pl. Glumac. l.c.* - Ischaemum melicoides Koen. ex Hook. fil. *Flor. Brit. Ind. VII* (1897) 70. - Andropogon hirsutum Heyne ex Hook. fil. l.c. (nec! Andropogon hirsutum Heyne ex Steud. *Syn. pl. glumac. l.c.*). - Agrostis scoparia Koen. ex Steud. *Syn. pl. glumac. l.c.* Indien (Hooker fil. et Thomson, Roxburgh nr. 74, Wallich nr. 8662, Wight herb. prop. nr. 2387).

16. Arundinella elegantula Hook. fil. in *Journ. Linn. Soc. V* (1863) 233.

Westafrika: Kamerun (Mann).

17. Arundinella mesophylla Nees et Arn. ap. Steud. *Syn. pl. Glumac. I* (1854) 115.

Indien (Meebold nr. 12859, Stocks et Law, Wallich nr. 8663B, Wight herb. prop. nr. 1100, 1018, 2347).

18. Arundinella hirsuta Heckst. ap. Steud. *Syn. pl. Glumac. I* (1854) 116. - Arundinella setifera Steud. l.c.

Indien (Clarke nr. 44767B, Griffith nr. 6786, Hooker fil. et Thomson, Duthie nr. 6138, Meebold nr. 1682, 7496, Metz nr. 920, Royle nr. 298).

19. Arundinella khaseana Nees ap. Steud. *Syn. pl. Glumac. I* (1854) 115.

Indien (Brandis, Clarke nr. 44726C, Griffith nr. 6741, Masters nr. 490, Hooker fil. et Thomson, Wallich nr. 8672).

20. Arundinella tuberculata Munro ap. Lisboa in *Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. V* (1891) 455.

Indien (Kimg, Stocks).

21. Arundinella villosa W. et Arn. ap. Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 115. - Arundinella Hookeri Munro ex Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 73.
Ceylon (Thwaites nr. 960, Wight herb. propr. nr. 2037); Indien (Dungbeo in herb. hert. Calcutt., Hooker fil. et Thomson, Meboldt nr. 10455).
22. Arundinella pilosa Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. 4. (1851) 36.
Indien (Hohenacker nr. 647, Metz nr. 935).
23. Arundinella ciliata (Roxb.) Nees ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. 4. (1851) 30. - Holcus ciliatus Roxb. Flor. Ind. (1820) 318. - Arundinella agrostoides Trin. Ic. XXIII (1828 - 36) tab. 265. - Arundinella agrostoides var. ciliata Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 71. - Brandtia helcoides Kth. Rév. Gram. II (1835) 127, tab. 170. - Perotis polystachya Heyne ex Eock. fil. l.c.
Monsungebiet: Indien (Hooker fil. et Thomson, Griffith nr. 6790, Meboldt nr. 1222, 10570, Reymaud, Wallich nr. 8664, 8671, Wight herb. propr. nr. 182, 1666); Philippinen (Chamisso, Loher nr. 7217, Bongard, Philipp. bur. sci. herb. nr. 4328).
24. Arundinella procumbens Janow. in Fedde, Repert. XVII (1921) 84.
Celebes (Warburg nr. 1648).
25. Arundinella decomposita Janow. in Fedde, Repert. XVII (1921) 84.
Indien, Mysore (Meboldt nr. 10760, 10448).
26. Arundinella pygmaea Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 72.
Indien, Nord-Canara (Lisboa).
27. Arundinella tenella Nees ex Steud. Nomencl. 2. ed. II (1841) 143 et sp. Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 115. - Anemagrostis tenella Wight ex Steud. Syn. pl. Glum l.c. - Arundinella pumila Steud. Syn. pl. Glumac. l.c. - Acratherum pumilum Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. II (1851) 414.
Abyssinien (Dillon et Petit); Vorderindien (Clarke nr. 21068, Meboldt nr. 1683, 1684 10452, Royle herb. propr. nr. 268, Warburg nr. 861, 924, Wight herb. propr. nr. 76).
28. Arundinella stricta (Roxb.) Janow. in Fedde, Repert. XVII (1921) 84. - Panicum strictum Roxb. Flor. Ind. I (1820) 303. - Panicum bengalense Sprg. Syst. I (1825) 311. - Arundinella Wallichii Nees ap. Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 114. - Panicum pyramidale B herb. Hamilt. (non alior.) ex Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 75.
Monsungebiet, Indien (Clarke nr. 36698A, Griffith nr. 6789, 8791, Hooker fil. et Thomson, Jenkins nr. 219, Meboldt nr. 6337, Wallich nr. 8669A, 8669B, 8700); Cochinchina (Pierre).
29. Arundinella virgata Janow. in Fedde, Repert. XVII (1921) 84.
Monsungebiet: Indien (Hooker fbl. et Thomson); Süd-China (herb. Hillebrandt).
30. Arundinella robusta Feurte. Mex. Pl. Gram. (1888) 54.
Mexico (Liebmamn nr. 632).
31. Arundinella convoluta Pilger in Engl. Jahrb. XXVII (1892) 25.
Columbia (Triana).
32. Arundinella auletica Rupr. in Bull. Acad. Brux. IX, 2. (1842) 242.
Mexico (Liebmamn nr. 630).
33. Arundinella glauca Janow. in Fedde, Repert. XVII (1921) 84.
Mexico (Kerber nr. 318 e.p.).
34. Arundinella Berteroniana (Schult.) Mez in Fedde, Repert. XVII (1921) 85. - Trichochloa Berteroniana Schult. Mant. II (1824) 209. - Mühlenbergia Berteroniana Kth. Révis. I (1829) 64. - Thysanachne scaparia Presl, Thysan. Nov. pl. Gen. (1829) et in Rel. Haenck. (1830) 253. - Arundinella scoparia Feurte. Mex. Pl. Gram. (1888) 55. - Pedaseum vires Balb. ex Kth. Enum. (1833) 202. - Ischaemum peruvianum Kth. l.c. 515. - Thysanachne peruviana Presl, Rel. Haenck. l.c. - Arundinella peruviana Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 115. - Arundinella crinita Trin. in Limnaea X (1836) 299. - Agrastis Berteriana Sprg. ex Steud. Nomencl. 2. ed. (1841) 39, 143. - Arundinella martinicensis Trin. Gram. Panic. II (1830) 62. - Arundinella Deppeana Nees in Beplandia III (1855) 84. - Arundinella cubensis Griseb. in Mem. Am. Acad. VIII (1863) 533.
Durch das tropische Amerika: Antillen, Sto. Domingo (Bertero, Eggers nr. 1826); Mexico (Bourgeau nr. 2223, Galeotti nr. 5873, Kerber nr. 318 e.p., Liebmamn nr. 634, 736 et coll. ad Nees nr. 559, 761, Pringle nr. 3133, Seler nr. 2281); Guatemala (Heyde et Lux nr. 4658); Costa Rica (Bielley nr. 7469, Cooper nr. 585, Hoffmann nr. 270, Pittier nr. 2407, Tonduz nr. 8725; Peru (Ule nr. 6513, Haenke); Brasilien,

- Sao Paulo (Löfgren et Edwal nr. 2800).
35. Arundinella grandiflora Hackel in Fedde, Repert. VIII (1910) 514.
China, prov. Yun-Nan (Delawy nr. 2176).
36. Arundinella Goeringii Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 116.
Java (Hallier nr. 2, Lörtzing nr. 119, 475, Mpusset nr. 19).
37. Arundinella filiformis Janew. in Fedde, Repert. XVII (1921) 85.
Philippines (Leher nr. 7228).
38. Arundinella Metzii Hochst. ap. Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. 4. (1851) 31. -
Agrestis fusca
Agrestis fusca Heyne ex Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 72. - Arundinella agrestoides var. tecella Hook. fil. et Thoms. ex Hook. fil. l.c.
Indien (Hooker fil. et Thomson, Mebold nr. 10759, 10761, Metz nr. 297).
39. Arundinella fuscata Nees ap. Buese, in Miq. Pl. Junghuhn. (1851 - 55) 359. - Acratherum fuscatum Nees ex Stev. Syn. pl. Glumac. I (1854) 114. -
Indien (Mebold nr. 10459, Wight herb. prpr. nr. 183); Java (Junghuhn, Koorders nr. 27770).
40. Arundinella capillaris Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 74.
Verderindien (Heyne, Wight herb. prpr. nr. 3538).
41. Arundinella rigida Nees, Flor. Afr. austral. (1841) 80.
Capgebiet (Buchanan nr. 275, Bachmann nr. 206), Ecklen et Zeyher nr. 35, Wood nr. 6003); Ostafrika, Nyassa-Hochland (Stölz nr. 1376).
42. Arundinella purpurea Hochst. ap. Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 115.
Verderindien (Metz nr. 928).
43. Arundinella Ecklonii Nees, Flor. Afr. austr. (1841) 80.
Capgebiet (Buchanan nr. 274, Disterlen nr. 207, Ecklon et Zeyher nr. 36, Drege nr. 6395, 9574, E. S. C. A. nr. 303, Schlechter nr. 6395, 9674); Ostafrika, Nyassa-Hochland (Stölz nr. 1333).
44. Arundinella nervosa Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. (1864) 362, syn. exclus. - Arundinella laxiflora Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 75.
Ceylon (Gardner nr. 1007, Thwaites nr. 919).
45. Arundinella caespites Janew. in Fedde, Repert. XVII (1821) 85. -
Philippines (Bur. Agric. herb. nr. 2262, Bur. Sci. herb. nr. 30, 8101); Formosa (Faurie nr. 756).
46. Arundinella elata Pilger in Engl. Jahrb. XXV (1890) 710.
Columbia (Stübel nr. 27).
47. Arundinella hispida (Willd.) O. Ktze. Rev. Gen. (1891) 761. - Andropogon hispidus Willd. Spec. Pl. IV (1805) 908. - Ischaemum hispidum H.B.K. Nov. Gen. et spec. I (1815) 194. - Arundinella brasiliensis Raddi, Agrest. Brasil. (1823) 37, tab. 1. - Arundinella pallida Nees, Agrest. Brasil. (1829) 465. - Acratherum miliaceum Lk. Hort. Berol. I (1821) 320. - Orthopogon agrostideus Trev. ex Steud. Nomencl. 2. ed. II (1841) 234. - Andropogon virens Sprg. Syst. I (1825) 287. - Arundinella Mikasii Nees l.c. 465. - Goldbachia Mikasii Trin. in Sprg. Neue Entd. II (1821) 81. - Riedelia Mikasii Trin. ex Kth. Enum. Pl. I (1833) 515. - Aira brasiliensis Sprg. Syst I (1825) 278. - Ischaemum pallidum Kth. Enum. Pl. I (1833) 515. - Arundinella Ritschiei Muñoz ex Lisbea in Journ. Bomb. Nat. Hist. Sec. V (1891) 343. - Holcus nervesus Rexb. Flor. Ind. I (1820) 318. - Andropogon epiphyllus Wall. ex Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 73. - Arundinella sepalensis Trin. Spec. Gram. (1828) tab. 268. - Ueber die Tropen beider Hemisphaeren verbreitet. Philippines (Cuming nr. 667, Leher nr. 7234, Merrill nr. 161); Celebes (Warburg nr. 16483); Siam (Kerr nr. 2228); Indien (Clarke nr. 16419, 24881E, Duthie nr. 6131, Griffith nr. 6791, Hooker fil. et Thomson, Mebold nr. 10450, 10757, 10762, Reyle nr. 25, Wallich nr. 8666, 8666B); Tecking (Balassa nr. 1694, 4912); Süd-China (Henry nr. 9139). -- Brasilien (Glazieu nr. 11362, 11673, 15699, 17433, 17921, 18608, 22502, 22503, Pilger nr. 573, Sellow nr. 3636, Ule nr. 1962, 8024); Paraguay (Endlich nr. 71, 77, Fiebrig nr. 4658, Hassler nr. 2833); Peru (Weberbauer nr. 3521); Venezolanisches Guyana (Passarge et Selwyn nr. 159); Argentina (Rojas nr. 178); Costa Rica (Bielley nr. 1737); Mexico (Liebmam nr. 624, 635, Palmer nr. 434, Pringle nr. 3133); Cuba (Otte nr. 268, 269); St. Domingo (Eggers nr. 605); Martinique (Sieber nr. 264). -- Australien, Queensland (Warburg nr. 19598).
48. Arundinella Palmeri Vas. in Beal, Grasses N. Am. II (1896) 76.
Mexico (Palmer nr. 12, 434, 525, Pringle nr. 11213); Venezuela (Gollmer, Pittier nr. 5885

49. Arundinella phragmitoides Griseb. Cat. pl. Cub. (1866) 234.
Mexico (Bourgeau nr. 1660, Kerber nr. 363, Langlassé nr. 608, Liebmamn nr. 670,
Schiede, Seler nr. 626, 4966).
50. Arundinella pubescens Hackel et Merr. ined.
Philippinen (Philip. Bur. Sci. herb. nr. 856).

Species incertae sedis.

51. Arundinella Lawii Hook. fil. ap. Trimen, Flor. Ceyl. V (1900) 180.
Ceylon (Woodrow).
52. Arundinella birmanica Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII (1897) 73.
Birma (M' Lelland, Kurz, Scott).
53. Arundinella tricuspidata Buese in Miq. Pl. Junghuhn. (1851-55) 360.
Sumatra (Horner).
54. Arundinella spicata Dalz. in Dalz. et Gibson, Bomb. Flor. (1861) 293.
Indien, Concan. - Hookero quoque ignota.
55. Arundinella japonica Duthie, Grasses NW. Ind. 13, nomen tantum.

II. Thysanolaena Nees.

Thysanolaena Nees in Edinb. N. Philos. Journ. XVIII, 180. - Myriochaeta Moritzi Syst. Verz. (1846) 101.

Spiculae 1-florae, basi pilis haud insidentes, geminatae vel solitariae, minimae secus ramulos filiformes panniculae fasciculatae, cum pedicello articulatae, flore hermaphroditico. Glumae 3, prima et secunda 1-nerviae, tenues, quam sequens breviores, latae, muticae; gluma tertia vacua, fere spiculae longitudine, membranacea, acuminata. Palea inferior spiculae longitudine, glumam III. subaequans, nunquam aristata, tenuis lataque, obtusa, dorso cum nervis lateralibus longe patent-pilosa, paleam superiorem angustam brevissimamque, plicatam et florem hermaphroditum fovens. Stamina 3, antheris oblongis. Styli a basi discreti, stigmatibus plumosis. Caryopsis minima, intra glumas maturitate tantum demum indurascens.

Conspectus specierum.

- I. Glumae I. et II. usque ad 0,75 mm longae, dorso laeves: Th. procera.
II. Glumae I., II. semper 1,5 - 2 mm longae, dorso scabrae: Th. Mezii.

1. Thysanolaena procera (Retz.) Mez. - Agrostis procera Retz. Obs. IV (1779) 19. - Melica latifolia Roxb. Beng. (1814) 8.- Agrostis latifolia Heyne ex Hook. fil. Flor. Brit. Ind. vii (1897) 61.- Agrostis maxima Roxb. Fl. Ind. I (1820) 319. - Thysanolaena maxima O. Ktze. Revis. Gen. II (1891) 794. - Panicum acariferum Trin. Spec. Gram. Ic. I (1828) 87. - Thysanolaena acarifera Nees et Arn. in Nov. Act. Leopold. XIX. Suppl. I (1843) 181. - Thysanolaena agrostis Nees in Edinb. N. Phil. Journ. XVIII (1835) 180. - Myriachaeta glauca Mor. ex Steud. Syn. pl. Glumac. I (1854) 404. - Myriachaeta arundinacea Zoll. et Mor. Syst. Verz. Zell. (1845-46) 101. - Panicum Amlisa Ham. ex Hook. fil. Flor. Brit. Ind. VII. (1897) 61. - Agrostis scoparia Koen. ex Hook. fil. l.c. - Arundo montana Ham. ex Hook. fil. l.c.

Durch das Monsungebiet verbreitet: Philippinen (Philip. pl. nr. 10037, Loher nr. 1679, 1682, 7199); China, Yun-Nan (Henry nr. 11689), Hong-Kong (Hance nr. 1056); Ton-King (Balansa nr. 1714); Siam (Kerr nr. 1640); Birma (Meobold nr. 1960); Indien (Calcutt. hort. herb. nr. 179, Clarke nr. 26322, Gamble nr. 13906, Hooker fil. et Thomson, Meobold nr. 3990, 7822, Reynaud, Schlegintweit II. nr. 11831, Griffith nr. 6772, Wallich nr. 88821, 8882 1, Wichura nr. 2894); Ceylon (Macrae); Andamanen (Herb. hort. Calcutt.); Java (Hillebrandt, Jager nr. 514, Koorders nr. 1577, 19905, 28553, Meusset nr. 918, Teysmas nr. 1278, Warburg nr. 3570, 3586); Celebes (Warburg nr. 15712, 16494); Amboina (Warburg nr. 17421); Neu-Guinea (Hellwig nr. 183, Lauterbach nr. 2783, Weinland nr. 366).

2. Thysanolaena Mezii Janow. in Fedde, Repert. XVII (1921) 86. -
Süd-China, ohne Standortsangabe (Meyen).

III. *Phaenosperma* Munro.

Phaenosperma Muaro ap. Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) 59.

Spiculae 1-florae, basi pilis haud insidentes, maturitatis statu ample hiscentes secus ramulos inarticulatos panniculae sparsae, cum pedicello articulatae, flore hermaphrodito. Glumae 2, membranaceae, acutiusculae, muticae, 3-nerviae, prima quam sequens brevior, sequens spiculae longitudine. Palea inferior paullo latior, glumam inferiorem subaequans, paleam superiorem hyalinam et florem hermaphroditum fovens. Stamina 3; styli 2 distincti stigmatibus plumosis. Caryopsis oblique obovoides, e gluma fructifera semierecta sed cum illis decidua.

Species unica:

Phaenosperma globosum Munro ap. Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) 59.

Korea (Taquet nr. 1971, 1953, 3444); China (Faber, Henry nr. 2073, 11299).

IV. *Beckera* Fresen.

Beckera Fresen. Mus. Seuckenberg. II (1837) 132.

Spiculae 1-florae, basi pilis haud insidentes, a dorso compressiusculae, secus rhachis simplicem inarticulatam spicae quaquaversae, in pedicello brevissimo articulatae, flore inferiore cum palea omnino abortivo unico superiore hermaphrodito. Glumae constanter 3, nullo modo carinatae: I. et II. constanter minutissime squamiformes aveniae; gluma III. spiculae longitudine, cum palea inferiore dorso pilosula, 5-nervia, raro mutica sueto apice in aristam tenuem, rectam, haud tortam desinens. Palea inferior glumae praecedentis (aristâ neglectâ) perfecte vel fere longitudines tenuis hyalinaque, apice dentata et nonnunquam medio breviter mucronata, 3-nervia; palea superior constanter valdeque reducta et quam praecedens permulto brevior, squamiformis, tenuissime hyalina, avenia, apice denticulata. Lodiculae 0; stamina 3; styli 2 basis usque discreti, stigmatibus simpliciter cylindrico-plumosis. Caryopsis oblonga, recta, haud compressa, glumis tenuibus inclusa, libera, hilo magno, elliptico.

Conspectus specierum.

A. Gluma III. exaristata:

B. mutica.

BB Gluma III. in aristam desinens.

I Palea superior ex ovato acuminata.

a Palea inferior apice vix mucronata; spiculae (aristâ neglectâ)

4,5 mm longae:

B. gracilis.

b Palea inferior apice longiuscule mucronata; spiculae (Aristâ neglectâ) 2,75 mm longae:

B. Petitiiana.

II Palea superior minutissime squamiformis, apice irregulatiter dentata nec acuminata:

B. polystachya.

1. *Beckera mutica* Hochst. in Flora XVII (1844) 514.

Abyssinien (Schimper II. nr. 1275).

2. *Beckera gracilis* Hochst. in Flora XXXVII (1855) 199.

Abyssinien (Schimper herb. propr. nr. 467 et coll. Paris. nr. 1332).

3. *Beckera Petitiiana* A. Rich. Tent. Flor. Abyss. II (1851) 358.

Abyssinien (Dillon et Petit, Schimper herb. propr. nr. 166).

4. *Beckera polystachya* Fresen. in Mus. Senkenb. II (1837) 132. - *Beckera valida* Gay ex Hochst, in Flora XVII (1844) 512. - *Beckera Schimperiana* Hochst. l.c. 513.

Abyssinien (Dillon et Petit, Pappi nr. 129 = 2126, Ruppelli, Schimper I. nr. 91 et herb. propr. nr. 34, 479, 1028 et coll. Poris. nr. 903 et ed. Hohenacker nr. 2411).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Archiv. Zeitschrift für die gesamte Botanik](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Janowski Margaretha

Artikel/Article: [Arundinellearum Graminum tribus, conspectus 21-28](#)