

Eine neue Icacinacee von Neu-Guinea.

Von

A. Engler.

Polyporandra Beccari in Malesia I. 425.

P. Hansemanni Engl. n. sp.; arbuscula scandens, dioica ramulis divaricatis, novellis breviter et dense pilosis, subquadrangulis, adultis teretiusculis et glabrescentibus, internodiis longis, nodis leviter incrassatis; foliis oppositis, petiolis quam lamina 8—10-plo brevioribus, supra sulcatis, basi curvatis, lamina subcoriacea, glabra, supra nitida, basi obtusa, apice cuspidata, nervis lateralibus utrinque 7—8 adscendentibus, in margine exeuntibus, nervis secundariis inter primarios transversis atque venis reticulatis subtus distincta prominentibus; cirrhis longis apice bifurcis hinc inde inter ramulos duos laterales interpositis; inflorescentiis dense et breviter pilosis paniculatis axillaribus, petiolos aequantibus vel paullo superantibus deflexis; bracteis parvis oblongis; pedicellis alabastris globosis aequilongis; calyce cupuliformi breviter 5-dentato, petalisque late lanceolatis dense pilosis; antheris florum ♂ sessilibus subovoideis tota superficie multiporosis.

Ramulorum novellorum internodia 4—5 cm, adultorum 1 dm et ultra longa. Foliorum petiolus 1,5 mm crassus, 1,5 cm longus, tortus, lamina 1—1,5 dm longa, 6—8 cm lata, acumine 0,8—1 cm longo instructa, nervis lateralibus 14—2 cm inter se distantibus. Cirrhi quorum naturam morphologicam in speciminibus siccis certe extricare non potui, quos autem ramulorum sympodium efformantium fines esse existimo) ultra 1 dm longi, 2—3 mm crassi. Paniculae axillares 1—2 cm longae, pauciflorae, bracteis 2—3 mm longis deciduis, pedicellis 3 mm longis. Alabastra globosa fere 3 mm diametientia. Calyx cupuliformis vix 4 mm longus. Petala fere 3 mm longa, 4 mm lata, apicibus inflexa. Stamina sessilia 1,5 mm longa, 4 mm crassa.

Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland (M. HOLLRUNG n. 703. — Blühend im Sept. 1887).

Es ist dies die zweite Art der mit *Jodes* Bl. verwandten Gattung *Polyporandra* Becc. Von der bereits bekannten *P. scandens* Becc. durch die größere Zahl der Seitennerven an den Blättern, durch die nach unten gebogenen Inflorescenzen und durch die interpetiolaren Ranken verschieden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Engler Adolf

Artikel/Article: [Eine neue Icacinacee von Neu-Guinea. 4013](#)