

Trichomanes orbiculare n. sp.

Von

Dr. H. Christ (1894).

E grege **Hemiphlebia** V. D. B., nervo centrali destituti.

Tr. rhizomate ramoso repente, tenui, tomentoso, frondibus subdianaphinis membranaceis solitariis sed approximatis et contiguis, subsessilibus sive breviter (longit. 2 mm) petiolatis, orbiculari-reniformibus petiolo lateraliter i. e. in sinu profundo inserto, frondis lamina 4 cm diametro metiens, sinu clauso marginibus imbricatis, idcirco lamina fere infundibuliformi, ambitu irregulariter usque ad quartam et tertiam partem laciniato, laciniis rotundatis, nervis ex insertione petioli flabellatim versus marginem radian-tibus, furcatis, prominulis, venulis spuriiis interruptis inter nervos hic illie conspicuus, margine parce fimbriato-ciliato, ob sterilitatem speciminum sori ignoti.

Ab omnibus speciebus americanis hucusque notis fronde orbiculari nervisque penitus radiato-flabellatis discrepans, *Tr. peltato* Hook. insulis Oceani Ind. proprio comparandum, sed ab eo insertione laterali nec centrali petioli lobisque profundioribus diversum.

Hab. Blumenau Brasil. merid. subtrop.

I. MOELLER 1893; jam prius a C. MÜLLER repertum, sed semper sine fructificatione.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik,
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Christ Hermann Konrad Heinrich

Artikel/Article: [Trichomanes orbiculare n.sp. 2026](#)