

# Scirpodendron Engl., eine baumartige afrikanische Cyperacee.

Von

A. Engler.

---

Flores dioeci? Flores masculi adhuc ignoti. Flores feminei perigonati; perigonium 3—5-tepalum; tepala minima lanceolata, pilis duplo longioribus ciliata. Pistillum valde elongatum conoideum superne curvatum, stigmatibus 3 filiformibus instructum. Fructus elongato-conoideus superne curvatus, semen elongatum cylindricum includens. — Arbuscula, ramis plerumque pseudodichotomis, interdum trifidis, fere a basi ad apicem usque foliorum partibus basalibus obtectis. Folia dense spiraliter ordinata angusta lineari-lanceolata, e basi ad apicem usque angustata. Inflorescentiae paniculatae folia superantes; bracteae I et II basi longe tubulose vaginantes atque in subulam acutissimam exeuntes, ramulos 2—4 tetragulos includentes, ramulis extimis spicas plurifloras gerentibus; bracteae III lanceolatae acutae quam prophylla 2 lanceolata triplo breviores.

**Sc. Bücheri** Engl. n. sp.; arbuscula circ. 6 dm alta, radicibus tenuibus numerosissimis horizontaliter radiantibus. Truncus usque 42 cm longus, inferne foliorum vestigiis destitutus circ. 5 cm crassus, ramis adscendentibus, gradatim minoribus, extimis cum foliorum vestigiis 1,5 cm, sine foliis 1 cm crassis, fere omnibus supra bifurcationes pedunculi vestigio 3—6 cm longo, 2—3 cm crasso persistente instructis. Folia erecta, rigida, lineari-lanceolata usque 5 cm longa, vestigia vetusta circ. 4—4,5 cm longa, ramis adpressa, apice patente vel recurvo. Paniculae usque 4 dm longae, ramis I 2 cm crassis; bracteae I vagina tubulosa 4,5 cm longa instructa in acumen aequilongum subuliforme exeuntia; ramuli II 3—5 cm longi, bracteas superantes; spicae circ. 8 mm longae; bracteae earum circ. 2—3 mm longae; prophylla usque 6 mm longa. Pistillum cum stilo usque 4 mm longum; stigmata filiformia 4 mm longa. Fructus 6 mm longus, inferne 0,5 mm crassus.

Kamerun: auf einer Gneiskuppe in der Nähe von Jaunde am Rande des Regenwaldes, um 780—820 m ü. M. (Dr. BÜCHER — ♀ blühend und fruchtend im Juni 1909).

Von dieser höchst interessanten Pflanze waren schon früher Stücke an das Botanische Museum in Dahlem gelangt. Zwei vollständige Exemplare, welche Herr Dr. BÜCHER einsendete, veranlassen mich, nicht länger über diese Gattung zu schweigen, welche als baumartig wachsende Cyperacee besondere Beachtung verdient. Später werde ich Ausführlicheres über die Pflanze veröffentlichen und dabei auch ihre anatomischen Verhältnisse behandeln.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Engler Adolf

Artikel/Article: [Scirpodendron Engl., eine baumartige afrikanische Cyperacee. 2034](#)