

Burmanniaceae africanae. III.

Von

A. Engler.

(Vergl. Englers Bot. Jahrb. XXXVIII [1905] 89—94, [1906] 137—143.)

Burmannia.

B. liberica Engl. n. sp. — Herba tenuis caule simplici parce et remote foliato. Folia basalia linearia longe acuminata, acutissima, caulina breviora angustissima. Flores solitarii vel 2—5 apice ramulorum congesti subcorymbosi, breviter pedicellati; bracteae lanceolatae acutae; perigonii tubus angustus quam tepala exteriora vix 4-plo longior alis 3 semiobovatis longitudinis $\frac{2}{3}$ aequantibus instructus; tepala exteriora oblongo-triangularia margine leviter involuto, tepala interiora (vel petala) quam exteriora breviora elongato-triangularia. Antherae subsessiles connectivo quam thecae paulum latiore usque breviorae.

Die Pflanze ist 4—4,5 dm lang. Die Grundblätter sind 5—6 mm lang und nur 0,75 mm breit; die 4—3 cm von einander entfernten Stengelblätter sind etwa 2—3 mm lang. Das Perigon ist etwa 7 mm lang mit 4,5 mm langen und 4 mm breiten äußeren Perigonabschnitten; die Flügel sind etwa 2,5 mm breit.

Liberia: Urwaldreste (DINKLAGE n. 2028).

B. inaequalialata Engl. in Wissensch. Ergebn. d. deutsch. Zentralafrikan. Exped. 1907/08. II.

Gabun: Libreville, auf Strandwiesen (MILDBRAED n. 3329. — Blühend Juni 1908).

Kamerun: Garua, in der Niederungssteppe am Benue (LEDERMANN n. 3427, 3552, 4524, 4770 a); zwischen Tapare und Tukuru, um 1340 m (LEDERMANN n. 5587 a).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Engler Adolf

Artikel/Article: [Burmanniaceae africanae. III. 505](#)