

## 31. Die Linaceen Papuasiens.

Von

**C. Lauterbach.**

Mit 4 Figur im Text.

Die Linaceen sind nur mit der Gattung *Durandea* in etwa 3 endemischen Arten vertreten. Von diesen ist *D. pentagyna* K. Schum. die wichtigste und häufigste, bisher von West- und Nordost-Neu-Guinea sowie Neu-Mecklenburg nachgewiesen, eine Liane mit ansehnlichen, etwas flach gedrückten, halbkreisförmig gebogenen Haken und dunkelgelben Blütentrauben. Die Art findet sich am Meeresufer, jedoch am häufigsten im primären Hochwald und steigt bis zu 700 m Seehöhe empor. Durch die Abgrenzung der Gattung *Durandea* von Stapf hat das Gebiet derselben sehr an Einheitlichkeit gewonnen. Dasselbe erstreckt sich von Neu-Caledonien mit 6 Arten einerseits nach den Fidji-Inseln (4 Art), andererseits nach Nordost-Australien (4 Art) und über die Salomonen (4 Art), Neu-Mecklenburg nach Neu-Guinea (2 Arten). Von der Gattung *Durandea* hat neuerdings HALLIER<sup>1)</sup> noch die Gattung *Philbornea* abgeschieden (mit 3 Griffeln und nur 4 zur Entwicklung kommendem Samen), welche mit je 4 Art auf Borneo und den Philippinen vorkommt.

*Durandea* Planch. in Hook. Lond. Journ. IV. 594 et VII. 527; Stapf emend. in Hook. Icon. Tab. 2822, p. 4.

Sträucher, meist mit rückwärts gebogenen Haken kletternd. Blätter abwechselnd, schwach kerbig-gezähnt. Blüten in achsel- oder endständigen Dolden oder Trauben, 5zählig, Kelch bleibend, Blumenblätter mehr oder weniger genagelt. Staubblätter 10, am Grunde verwachsen, Griffel 5, fadenförmig. Fruchtknoten 5—3fächerig, Frucht beerenartig mit 5—3 Steinkernen.

### Übersicht der Arten Papuasiens.

#### A. Junge Triebe glatt.

1. Frucht etwas fleischig, trocken 40 kantig; Blätter beim Trocknen dunkel werdend . . . . . *D. pentagyna*

2. Frucht trocken, 45 kantig; Blätter beim Trocknen hellbraun werdend . . . . . *D. pallida*

#### B. Junge Triebe flaumhaarig.

Blütenblätter 5 mm lang . . . . . *D. parviflora*

1) In Archiv. Néerland. des Sc. exact. et Natur. Sér. III. B. Tom. I. p. 404.



Fig. 4. *Durandea pentagyna* (Warb.) K. Schum. A Blühender Zweig, B Knospe, C Blüte, D Blütenblatt, E Staubblatt, F Androeceum und Gynaeceum, G Ovarium im Griffeln, H Ovarium, Längsschnitt, J Querschnitt, K Fruchtzweig, L Frucht, M Querschnitt, N Samen, O Hakenstacheln.

*D. pentagyna* (Warb.) K. Schum. in Schum. u. Lauterb. Fl. Süds., Nachträge 278; Pule in Nova Guinea VIII. 391; Stapf l. c. 3. — *Ancistrocladus pentagynus* Warb. in Engl. Bot. Jahrb. 13, S. 383. — *Hugonia pentagyna* K. Schum. l. c. Fl. Süds. 373. — Fig. 4.

West-Neu-Guinea: Noord Fluß (VERSTEEG n. 1049! — In hb. Leiden). — Sigar (WARBURG n. 20039!, 20040!).

Nordost-Neu-Guinea: In den Wäldern des Kani-Gebirges, 700 m (SCHLECHTER n. 17891! — Blühend 1. Juli 1908). — In den Wäldern am Mayen, ca. 100 m (SCHLECHTER n. 18048! — Blühend 20. Juli 1908). — In den Wäldern am Djemur, 50 m (SCHLECHTER n. 20010! — Blühend 2. Sept. 1909). — Finschhafen (WARBURG n. 20038! — Original von *Ancistrocladus pentagynus* Warb.). — Am mittleren Bumi (WEINLAND n. 176!). — Butaueng (HELLWIG n. 460!).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg; Namatanai, Halis, Liane (PEEKEL n. 421! — Blühend 28. April 1910). — Baleklek, Seeufer (PEEKEL n. 473! — Blühend 24. Juni 1910).

Var. *rotundata* (Warb.) Lauterb. — *D. rotundata* Warb. in Schum. u. Lauterb. Nachträge Fl. Südsee 278; Stapf l. c. 3.

Nordost-Neu-Guinea: Bussum (HELLWIG n. 671! — Original von *D. rotundata* Warb.!).

Das Exemplar HELLWIG n. 671 weicht nur durch die etwas kürzeren, am Grunde gerundeten Blätter ab; derartige Blätter finden sich, wenn auch etwas weniger ausgeprägt, am Grunde der Zweige auch bei PEEKEL n. 424, während wiederum bei der vorliegenden Pflanze an den oberen Blättern der Blattgrund spitzer wird. Die Blüten sind noch völlig unentwickelt, so daß ich die Aufstellung einer besonderen Art für zu weit gehend erachte.

*D. pallida* K. Schum. in Fl. Kais. Wilhelmsl. 56; Schum. u. Lauterb., Fl. Südsee 373; Stapf l. c. 3.

Nordost-Neu-Guinea: II Augusta Station, Lagerberg (HOLLRUNG n. 760! — Fruchtend Sept. 1887. — Original der Art!).

*D. parviflora* Stapf in Hook. Icon. Tab. 2822, p. 3.

Salomon-Inseln: Wahrscheinlich New Georgia (Offiziere des »Pinguin«), non vidi.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Lauterbach Carl (Karl)

Artikel/Article: [Die Linaceen Papuasians. 115-117](#)