

Hieracia Domingensis.

Von

K. H. Zahn.

Subgenus **Stenotheca** (Monn.) Fr., Epicr. p. 140.

Sectio **Pulmonareiformia** Fr. l. c. p. 150.

Involucra cylindrica gracilia pauciflora, squamis eximie biserialibus, extimis brevissimis. Achaenia elongata gracilia fusiformia sursum manifeste attenuata (2,5—)3—4 mm longa.

Subsectio I. **Floccosa** n., foliis subtus sub- v. dense v. interdum leviter cano-floccosis, haud raro etiam in parte superiore parce v. subfloccosis.

Huc pertinent 1. *H. venosum* L., 2. *H. carolinianum* Fr., 3. *H. Rugelii* A.-T., 4. *H. domingense* n., 5. *H. Gronovii* (L.) Torr. et Gray, 6. *H. pennsilvanicum* Fr.

Clavis specierum Domingensium.

- | | |
|--|--|
| 1a. Caulis phyllopodus ad 40 cm altus corymboso- | |
| 7—20-cephalus, 2—5-foliatus | <i>H. Gronovii</i> ssp. <i>domingense</i> n. |
| 1b. Caulis 60—100 cm altus phyllopodus v. hypo- | |
| phyllopodus longe racemoso-corymboso-polycy-
phalus, 3—6(—12)-foliatus. | <i>H. Gronovii</i> ssp. <i>Gronovii</i> n. |
| 2. Caulis ad 100 cm altus aphyllopodus longissime
et coarctate thyrsoideus polyccephalus, polyphyllus | <i>H. pennsilvanicum</i> Fr. |

1. *H. Gronovii* (L.) Froel. in DC., Prodr. VII. p. 217.

a. Ssp. *domingense* n.; *H. Carolinianum*, *venosum macrocephalum* et *Marianum oblongifolium* Peter in sched.! *H. Rugelii* Peter in sched., nec A.-T. — Caulis phyllopodus 17—40 cm altus tenuis, inferne sub-, basi dense pilosus, pilis dilutis tenuiter setosis 2—5 mm longis, usque ad basin floccosus, sursum disperse v. sparsim pilosus densius floccosus eglandulosus v. raro in summo apice tantum sparsim glandulosus. Folia viridia sublutescentia v. subcanescentia eglandulosa supra parce v. modice, subtus ± dense v. canofloccosa, supra et in margine modice v. densiuscule molliterque setosa (3—5 mm), in

nervo dorsali praesertim basin versus et in petiolis densissime molliterque pilosa v. sericeo- et subvilloso-pellita (3—6 mm), integerrima, rarius sparsim denticulata; radicalia subnumerosa (ad 6) obelliptica v. oblonga v. lanceolato-oblonga (lamina ad 25 mm lata), apice rotundato-obtusa breviter mucronata v. breviter acuta, distincte v. ima sublonge petiolata, in petiolum longe sensim attenuata v. ± breviter alato-subpetiolata, integerrima v. rarius sparsim denticulata; caulinis 2—3(—5), imum ad basin insertum oblongum v. oblongo- v. late lanceolatum basin versus longe v. breviter attenuatum, saepe elongatum obtusiusculum, basi attenuata ipsa subamplexicaule, secundum minus attenuatum saepe anguste linguiforme, tertium plerumque pariter ac reliqua parvum v. superiora 2—3 reducta lanceolata v. linearia subtus densius floccosa. Anthela laxe corymbosa ± indeterminata subsquarrosa, ramis 3—6, imis 2—3 valde remotis usque ad medium caulis raro profundius descendantibus 3—5(—6) cm longis 1—2-pliciter rāmulosis 4—5-cephalis, acladio et pedunculis ad 20 mm longis. Rami oblique patentes cum pedunculis tenuissimis dense floccosi et ± dense tenuiterque glandulosi pilosi. Involucra 7—9 mm longa cylindrica subatra v. viridi-atra ± dense glandulosa pilosa, squamis latiusculis sursum attenuatis obtusiusculis v. ± acutis, dorso viridi-atris v. obscure viridibus, margine pallidis, exterioribus brevissimis angustioribus obtusiusculis interdum parce floccosis. Ligulae breves dilute flavae. Styli fusci. Achaenia fusiformia sursum distincte attenuata, atra. Pappus sordide albido-subflavescens. — Flor. Majo, Junio (Octobr.).

Variat: 1. normale, foliis densiuscule sublonge pilosis. — Valle de Constanza ad Arroyo Pantujo 1170 m (EGGERS, Fl. Ind. occid. exs. 2293!); Prov. de la Vega (MIGUEL FUERTES!).

2. pinetorum, foliis (saepe elongatis, ad 14 : 2,5 cm longis) supra margineque dense longe subsetoso-pilosis (4—7 mm), caulinis 2—3 inferioribus bene evolutis, omnibus in costa dorsali (juniora ubique) longe sericeo-villosulis; caule inferne dense, basi densissime piloso; glandulis in ramis pedunculisque saepe densioribus sed floccis saepe minus evolutis. — In valle de Constanza in pinetis 1170 m (EGGERS l. c. 2293!), ibidem 1200 m (H. v. TÜRKHEIM, Pl. Doming. 3271!).
3. glabrescens; *H. venosum* Peter in sched.!, foliis disperse breviterque tantum pilosis. — Valle de Constanza: in arenosis ad 1170 m (EGGERS l. c. 2293 b!).
4. virescens, caule tenuissimo (ad 40 m alto) cum anthela involucrisque virescenti. — In summis montium 1200 m (M. FUERTES, Pl. Doming. 646!), in pinetis ad 800 m provinciae de la Vega (id. no. 1746 pp!). — Flor. mense Octobris, ergo verosimiliter forma florendi tempore mutata.

5. *alpestre*, *gracilius*, *foliis minoribus v. parvis*, *radicalibus caulinisque subtus canescenti-floccosis*, *capitulis minus numerosis obscurioribus*, *caule 17—25 cm alto*. — Julio, Augusto. — Valle Nueyo supra Constanza inter rupes 2270 m (EGGERS, Fl. Ind. occid. 2211!), ibidum 2200 m in pratis montanis (H. v. TÜRKHEIM, Pl. Doming. 3548!), in summo monte Pico del Valle in rupibus 2630 m (H. v. TÜRKHEIM 3455!).
6. *subvenosum*, *anthela valde squarrosa*, *ramis magis elongatis glandulis in peduncularum apicibus involucrisque tantum dispersis v. modice numerosis*, *foliis caulinis parvis angustis, involucris subcrassioribus*. — Valle de Constanza: Arroyo Pantujo 1170 m (EGGERS l. c. 2293 c!).

Anmerkungen. Die Unterart *domingense* stellt sich zwischen *H. venosum* und *H. Gronovii* (L.) Torr. et Gr. und ist in ihren Eigenschaften dem *H. carolinianum* Fr. und dem *H. Rugelii* A.-T., Spicil. p. 11, sehr ähnlich. Vielleicht ist unser *domingense* nur eine lokale Rasse der Mittelformen, welche die Lücke zwischen *venosum* und *Gronovii* ausfüllen.

Das *H. Rugelii* A.-T. hat aber häufig »caules a basi ramosos« oder »ramos elongatos suberectos, caulem aemulantes et passim fere a basi incipientes«, was bei unserer Pflanze niemals vorkommt. Auch hat *H. domingense* fast stets reichflockige bis graue Kopfstiele, während ARV.-T. in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève (1897) p. 94 von seinem *H. Rugelii* sagt: ses pédoncules et son péricline ne sont pas ou à peine étoilés-farinneux. Das *H. Rugelii* besitzt die Tracht und die Verzweigung des *H. venosum*, während unsere Pflanze dem *H. Gronovii* in Tracht und Verzweigung weit näher steht. Auch mit *H. carolinianum* Fr., das sich an *venosum* anschließt und durch sehr reiche und lange Drusenbekleidung, aber sehr stark verminderte Flockenbekleidung sowie durch viel kräftigeren Wuchs ausgezeichnet ist, kann *H. domingense* nicht identifiziert werden. Auffallend ist die Form 6. *subvenosum*, von der nur ein schwaches Stück vorliegt, das tatsächlich an *H. venosum* erinnert, aber wegen stärker zugespitzter Hüllschuppen und nach oben sehr stark verjüngter Früchte an *domingense* angeschlossen werden muß. Auf alle Fälle existieren zwischen *H. venosum* am einen Ende der Reihe und *H. pennsilvanicum* am anderen Ende alle möglichen Übergänge, die oft schwer zu trennen sind, ähnlich wie es bei den Zwischenformen von *H. murorum* und *H. prenanthoides* bei den europäischen Hieracien der Fall ist. Merkwürdig ist, daß auch das echte *H. Gronovii* sowie das *H. pennsilvanicum* Fr. mit *H. domingense* gemeinsam, wenn auch anscheinend viel seltener vorkommen, während das echte *H. venosum* zu fehlen scheint. Man könnte daraus auf eine Entwicklung des *H. domingense* aus *H. Gronovii* mit größter Wahrscheinlichkeit schließen.

Nicht auffallen dürfte, daß im heißen, trockenen Föhrenwald die

Pflanze eine reichere Entwicklung der Haare zeigt (f. 2. *pinetorum*), oder daß sie im alpinen Gebiet niedriger und weniger verzweigt wird, sowie eine viel reichere Flockenbekleidung annimmt, wie wir es auch an *H. Pilosella* in den europäischen Alpen wahrnehmen, das in den Alpen die Form *velutinum* (mit viel reicher und auch oberseits flockigen Blättern) ausgebildet hat.

Die Form 3. *glabrescens*, die nur in einem Stück vorliegt, dürfte nur ein Standortsprodukt sein, wie die Form 4. *virescens* wohl nur einen Saisondimorphismus zum Ausdruck zu bringen scheint.

b. Ssp. *Gronovii* (L., Sp. pl. 2, p. 4427) Torr. et Gray, Fl. Bor. Am. II. p. 447; *Stenotheeca Mariana* Monn., Essai p. 72, t. 2, f. A; *H. Marianum* Willd., Sp. pl. III. p. 4572 et herb. p. p.; *H. Marianum* Fr., Symb. p. 447; Epicr. p. 452; Nuttall, Am. phil. soc. VII. p. 446. — *Phyllopodum* v. saepe *hypophyllopodum*. Caulis gracilis v. crassus 60—100 cm altus, inferne foliis submagnis appropinquatis sursum cito v. abrupte decrescentibus interdum parvis et remotis obsitus, ± floccosus, inferne pilis albis longis densis saepe deflexis praeditus, sursum valde minus pilosus, superne epilosus et fere semper eglandulosus. Folia subintegerrima saturate viridia utrimque longe subpilosa, radicalia pauca ± magna saepe emarcida ob-ovata elliptica v. oblonga, rotundato-obtusa v. acutiuscula, breviter alato-(ima saepe anguste) petiolata v. basin versus attenuata subsessilia, tenuiter v. interdum crasse longe et curvato-setosa (2—5 mm), apice saepe plicata, subtus ± dense (supra vix v. sub-)floccosa molliterque pilosa, in petiolo hirsutissima; caulina (4—)3—6(—12), inferiora 4—5(—9) magna sensim minora late ovata elliptica v. oblonga sessilia saepe subamplexicaulia breviter pilosa v. supra glabrescentia, margine vix sparsim microglandulosa, basi hirsuta, reliqua parva v. reducta subtus densissime floccosa, v. saepe fere omnia caulina abrupte decrescentia parva (*H. subnudum* Froel. l. c. p. 248; *Stenotheeca subnuda* Monn. l. c.; f. *nudum* Fr., Symb. p. 447). Anthela determinata saepe longa racemoso-corymbosa, aclado 8—20(—35) mm longo, ramis 2—15 subbrevisbus tenuibus remotis patentibus saepe arcuatis, oligo- v. pleiocephalis floccosis vix vel subglandulosis. Capitula (4—)20—40(—70). Pedunculi tenuissimi parum v. canofloccosi dense tenuiter glandulosi epilosi. Involucra parva 6—8(—9) mm longa cylindrica pauciflora disperse v. dense glandulosa vix v. basi subfloccosa. Squamae atro- v. dilute virides latiusculae late dilute marginatae plerumque epilosae acuminatae ± acutae. Ligulae brevissimae flavae. Styli obscuri. Achaenia sursum attenuata 3,5 mm longa. Pappus sordide flavescens. — Valle Nuevo pr. Constanza, in pinetis ad 2200 m (H. v. TÜRKHEIM, Pl. Doming. 3549!); in graminosis ad Monte Barrero 1100 m (EGGERS, Fl. Ind. occid. 2036!; *H. Marianum oblongifolium* Peter in sched.!); in pinetis provinciae de la Vega 800 m (M. FUERTES, Fl. Doming. 1746 pp.!). — Junio.

4. *alpestre*, caule c. 30 cm alto gracili, sed ad 7-foliato, foliis parvis cinerascentibus supra dense subtus subcano-floccosis, anthela minus elongata, sed ramis patentibus pleiocephalis. — Valle nuevo pr. Constanza: in summi saxi fissuris montis Pico del Valle 2630 m (H. v. TÜRKHEIM n. 3455b. — Junio).

Die Ssp. *Gronovii* (*H. Gronovii* typicum!) unterscheidet sich von *domingense* durch zahlreichere Stengelblätter und viel längere Traubentrispe mit stärker abstehenden, oft reicher verzweigten Ästen. Sie ist in den westlichen Vereinigten Staaten von Kanada und Texas bis Florida verbreitet. Von Florida mag sie auf die Inseln¹⁾ gewandert sein.

Die Form *alpestre* ist die Parallelform zur Ssp. *domingense* f. *alpestre* und stimmt mit dieser ziemlich überein, unterscheidet sich jedoch durch zahlreichere Stengelblätter und andere Infloreszenz.

2. *H. pennsilvanicum* Fr., Symb. p. 150; Epicr. p. 156.

H. Gronovii et *scabrum* Auct. pp.; *H. Marianum* c. *Pennsylvanicum* A.-T., Spicil. p. 43; *H. scabrum pennsilvanicum* Hook., Fl. Bor. Americ. p. 298.

Ab *H. Gronovii* differt caule semper longe aphyllopodo robusto crasso ad 100 cm alto medio v. profundius dense folioso, foliis caulinis 15—35 (ovatis v. ellipticis v. ovato-oblongis saepe submagnis et ± elongatis obtusis v. obtusiusculis basi lata v. ± rotundata sessilibus, imis saepe alato-subpetiolatis, superioribus cito minoribus v. valde reductis ovato-acuminatis, omnibus supra vix v. sub-, subtus dense floccosis, utrimque densiuscule pilosis basi hirsutis, supra interdum calvescentibus), anthela longissima subaphylla thyrsoidea, ramis (ad 60) tenuissimis subremotis patentissimis subbrevibus subracemoso-2—10-cephalis, involucris subminoribus (5—8 mm longis). — Junio—Sept.

Constanza: in rupestribus ad torrentem Arroyo hondo 1200 m (H. v. TÜRKHEIM, Pl. Dom. 3378!).

Auch in den Vereinigten Staaten mit *H. Gronovii* vergesellschaftet.

1) Für Cuba noch nachzuweisen, wie auch alle übrigen für Sto. Domingo angegebenen Formen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik,
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Zahn Karl [Carl] Hermann

Artikel/Article: [Hieracia Domingensis. 272-276](#)