

Eine neue *Myrica*.

Von

A. Engler und **v. Brehmer**.

Myrica Holtzii Engl. et v. Brehmer n. sp. — Frutex? ramis juvenilibus cortice griseo tectis, longitudinaliter striatis, glabris. Folia alterna, longius petiolata, petiolis glabris, fuscescentibus cr. 8—10 mm longis, lamina \pm late ovali, basi apiceque aequaliter subacuta, margine evidenter crenata, cr. 4—5 cm longa, 2—2,5 cm lata, nervis lateralibus I utrinque 8—10, patentibus haud procul a margine arcuatim inter se conjunctis, utrinque subprominentibus, nervis lateralibus II et venis reticulatis non vel vix prominulis. Inflorescentiae juvenulae strobili tortiles, elongati cr. 10—13 mm longi, bracteis late ovatis, apice \pm obtusis, margine ciliatis.

Sansibarküstenzone: Kilwa (Holtz n. 905). — Einheim. Name: Usajani.

Diese Art, von der die vorliegenden Zweige sich noch in sehr jugendlichem Zustande befinden, ist gut charakterisiert durch die breit ovalen Blätter mit gekerbtem Rande und vor allem durch die jungen, stark gedrehten zapfenähnlichen Blütenstände. Da die Zäpfchen noch nicht aufgebrochen und die durch die Schuppen eingedeckten Knospen kaum entwickelt sind, können keine Größenangaben gegeben werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Engler Adolf, Brehmer W. von

Artikel/Article: [Eine neue Myrica. 290](#)