

Eine neue südafrikanische Crassula.

von

S. Schönland.

Crassula dubia Schönl. n. sp. — Herba perennis cauli brevi suffruticoso-carnoso. Folia decussata subrosularia suberecta connata cultrata oblique cuneato-obovata apice obtusa vel acutiuscula carnosa intus subplana vel concava extus convexa faciebus tenuiter griseo-puberulis marginibus ciliolatis. Inflorescentia terminalis longe pedunculata paniculaeformis, inflorescentiis partialibus cymoso-capitatis, pedunculo puberulo bracteis 4—6 vacuis oppositis oblongis connato-perfoliatis puberulis marginibus ciliolati instructo, bracteis floralibus iis similibus sed sursum minoribus; sepala crassa basi connata dorso puberula et subcarinata marginibus ciliolatis; petala albida saepius medio pallide viridula basi connata lobis subpanduriformibus basi contractis dorso infra apicem oblongo-mucronatis; stamna basi tubo corollae adnata filamentis subulatis antheris luteis oblongis; carpella quam stamna breviora margine ventrali minutissime ciliolata ovariis oblique ovatis stylis brevibus stigmatis subdorsalibus; squamae luteae circ. $\frac{1}{4}$ longitudinis ovariorum aequantes subquadratae apice rotundatae et leviter emarginatae.

Höhe der Pflanze mit der Infloreszenz etwa 40 cm, der Infloreszenz 30—37 cm, des Blütenstaftes 15—25 cm. Länge der Blätter etwa 5 cm, größte Breite derselben 2,5—3 cm. Länge des Kelches etwa 3 mm, der Blumenkrone 4 mm, der Blumenröhre 4 mm, der Staubblätter 3,5 mm, der Karpiden 2,25 mm. — Die Blütenköpfchen sind gewöhnlich deutlich gespalten.

Südöstliches Kapland: Gemein auf trockenen Hügeln bei Grahamstown. — Blüht im Januar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik,
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Schönland Selmar

Artikel/Article: [Eine neue südafrikanische Crassula. 358](#)