



pulmonarius, Lungen-Flechte.
furfuraceus, Klebenartige Flechte.
farinaceus, mehlichte Flechte.
subulatus, pfriemensförmige Flechte.
floridus, Sterntragende Flechte.

Tremella,

Juniperina, Wachholdergallerte. (Dunal)
Nostoch, Nostoch. (Funch)

Byffus,

velutina, seidenartige Staubpflanze.
antiquitatis, schwarze Staubpflanze.
saxatilis, Stein-Staubpflanze.
candelarius, Licht-Staubpflanze.
lactea, Kalkartige Staubpflanze. (Dunal)

XII.

Beiträge zu des Herrn Dr. Roth's Tentamen Florae germanicae.

Pentandria, Mononychia.

1. *Symphitum tuberosum*.
S. foliis semidecurrentibus: summis op-

§ 4



pulmonarius, Lungen-Flechte.
furfuraceus, Klebenartige Flechte.
farinaceus, mehlichte Flechte.
subulatus, pfriemensförmige Flechte.
floridus, Sterntragende Flechte.

Tremella,

Juniperina, Wachholdergallerte. (Dunal)
Nostoch, Nostoch. (Funch)

Byffus,

velutina, seidenartige Staubpflanze.
antiquitatis, schwarze Staubpflanze.
saxatilis, Stein-Staubpflanze.
candelarius, Licht-Staubpflanze.
lactea, Kalkartige Staubpflanze. (Dunal)

XII.

Beiträge zu des Herrn Dr. Roth's Tentamen Florae germanicae.

Pentandria, Mononychia.

1. *Symphitum tuberosum*.
S. foliis semidecurrentibus: summis op-

§ 4



positis. Linn. syst. veget. p. 187. Baiersche Flora Nr. 336. Ectyp. pl. ratisb. Tab. 37.

Hab. in nemoribus umbrosis subhumidis prope Ratisb. et in Palatinat. sup. 24

Digynia.

2. *Selinum Chabraei*.

S. vaginis foliorum caulinorum planis flaccidis pendulis. Linn. syst. veget. pag. 279. Baiersche Flora Nr. 464. Herb. viv. pl. select. Nr. 12.

Hab. in sylvaticis umbrosis prope Ratisbonam passim. 24.

Hexandria, Monogynia.

3. *Scilla bifolia*.

S. floribus erectiusculis paucioribus. Linn. syst. veg. p. 329. Baiersche Flor. Nr. 535.

Habit. in Insul. danubial. prope Ratisb. copiose. 24.

Octandria, Monogynia.

4. *Erica herbacea*.

E. antheris muticis exsertis, corollis oblongis, stylo exserto, foliis quaternis floribus secundis. Linn. syst. veg. p. 370.



Erica carnea Baiersche Flora Nr. 601.

Ect. pl. ratisb. Tab. 42.

Hab. in pinetis sabulosis prope Ratisbonam et in Palatinat. superior. copiose. h.

Didynamia, Gymnospermia.

5. *Melissa Nepeta*.

M. pedunculis axillaribus dichotomis foliis longioribus, caule adscendente hirsuto.

Linn. syst. veget. p. 542.

Ect. pl. ratisb. Tab. 397.

Habit. in montosis asperis prope Stauf. circa Ratisb. copiose. 4.

Diadelphia, Decandria.

6. *Cytisus capitatus*.

C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. Linn. syst. veg. p. 666. Ect. pl. ratisb. Tab. 399.

Habit. in nemoribus umbrosis circa Ratisbonam copiose. h.

7. *Cytisus supinus*.

C. floribus pedunculatis subbinatis, foliis villosis, caulibus decumbentibus frutescentibus. Linn. syst. veget. p. 667.

Ect. pl. ratisb. Tab. 46.



Habit. in asperis saxosis circa, Ratisbonam frequens. h.

Monoecia, Triandria.

8. Carex ericetorum.

C. spica mascula terminali obverse ovata, obtusa; foemineis sessilibus ovatis, capsulis pubescentibus. Poll. flor. palat. Nr. 886. Batersche Flora Nr. 147. Herb. viv. pl. select. Nr. 48.

Habit. in collibus apricis arenosis, circa Ratisbonam copiose. 4.

XIII.

Botanische Briefe.

Dritter Brief.

Ich wählte im Anfange des Brachmonaths die sogenannten Schwefelweissen Berge, zu meiner Excursion, welche sich vor einigen Jahren durch eine unterirdische Naturerscheinung bekannt gemacht haben, und an der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: [1790](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [XII. Einträge zu des Herrn Dr. Roths Tentamen Florae germanicae. 125-128](#)