

einen erhabenen Standort zu wichtigen Beobachtungen, und jeder Mensch findet hier Gelegenheit, in erhabenen, grotesken, nie gesehenen Scenen und Bildern der Allmacht, die Größe des Schöpfers zu verehren, und zu bewundern.

X.

Nachtrag zu dem Verzeichniß der um Regensburg wachsenden Pflanzen.
Vom Hrn. Professor Düval.

Der emsige Fleiß, mit welchem einige neue Mitglieder der botan. G. die hiesige Gegend durchsuchen, setzt mich in den Stand, abermals einen Nachtrag zu unserer Flora zu liefern; welches um so merkwürdiger ist, da die hiesige Gegend seit 10 Jahren so häufig durchsucht worden, und ich erst vor 2 Jahren einen ähnlichen Nachtrag geliefert habe.

Indessen verdanke ich einen großen Theil dieses Nachtrages dem Hrn. Grafen von

einen erhabenen Standort zu wichtigen Beobachtungen, und jeder Mensch findet hier Gelegenheit, in erhabenen, grotesken, nie gesehenen Scenen und Bildern der Allmacht, die Größe des Schöpfers zu verehren, und zu bewundern.

X.

Nachtrag zu dem Verzeichniß der um Regensburg wachsenden Pflanzen.
Vom Hrn. Professor Düval.

Der emsige Fleiß, mit welchem einige neue Mitglieder der botan. G. die hiesige Gegend durchsuchen, setzt mich in den Stand, abermals einen Nachtrag zu unserer Flora zu liefern; welches um so merkwürdiger ist, da die hiesige Gegend seit 10 Jahren so häufig durchsucht worden, und ich erst vor 2 Jahren einen ähnlichen Nachtrag geliefert habe.

Indessen verdanke ich einen großen Theil dieses Nachtrages dem Hrn. Grafen von

Sternberg, dessen glückliche Eigenschaften für die Wissenschaften überhaupt, und für Botanik insbesondere, schon in mehrern Schriften erwehnt sind. Der Hr. Graf haben mehrere, in hiesiger Gegend zuerst gefundene, Gewächse aus allen Classen, selbst bestimmt, und vorzüglich auch auf manche wichtige Abarten, Aufmerksamkeit gewendet. Da derselbe mit den letztern, durch die Cultur und Ausfäung in seinem Garten, die umständlichsten Versuche anstellt; so können wir dadurch ohne Zweifel in Rücksicht mancher dubiosen Pflanzen zur Gewisheit kommen. Allerdings muß ich hier dem Hrn. Grafen das Geständniß thun, daß ich seine großen Fortschritte in botanischen Kenntnissen bewundere, und ich bin überzeugt, daß ein jeder in dieses billige Lob einstimmen wird, der Gelegenheit hat, mit dem Hrn. Grafen näher bekannt zu werden.

Hr. von Boith zu Bodenwehr, verdient hier nicht minder eine ehrenvolle Erwähnung. Indem ich von seinen ausgebreiteten Kenntnissen, in vielen Fächern der Künste und Wissenschaften, schweige, erwehne ich nur seiner Kenntnisse in der Botanik, die er durch sich selbst erworben hat. Als ich im April das

Glück hatte seine Bekanntschaft zu machen, und seine gesammelten Pflanzen durchzusehen, fand ich darinn manche merkwürdige Stücke, die für unsere Gegend neu sind. Bodenwehr liegt zwar einige Meilen von dem Mittelpuncte unserer Flora; indessen nehme ich keinen Anstand diesen Ort in die Gränzen derselben einzuschließen, da man ganz gemächlich in einem Tage dahin excursioniren kann, und da die seltenen Pflanzen unserer Gegend, dort sehr häufig vorkommen. Zu diesem Vortheil kommt nun noch der glückliche Umstand, daß wir zu unsern gelehrten Zirkel, den Hrn. von Boith selbst, gleichsam als Oberpriestern dieses schönen Tempels der Flora, zu zählen haben, wodurch gewiß die Kräuterkunde in manchen Betracht gewinnen wird. Doch ich komme nun zu dem Verzeichnisse selbst.

Dritte Classe.

Eriophorum triquetrum *), auf Sumpfwiesen bei Untergebraching.

*) Dieses, und einige andere noch aufzuführende Gewächse, sind zwar schon als Bewohner der hiesigen

Eriophorum vaginatum, auf Sümpfen bei
Bodenwehr.

Nardus stricta, im Walde bei Gras.

Poa glauca, in den Schwabelweisbergen.

Bromus pratensis, auf Wiesen bei Stauf.

Vierte Klasse.

Trapa natans, bei Bodenwehr von Hrn. von
Boith gefunden.

Potamogeton pectinatum, ebendasselbst.

Fünfte Klasse.

Pulmonaria angustifolia, bei Bodenwehr, nach
Hrn. von Boith.

Chironia ramosissima, an feuchten Orten beim
Birkelgute.

Sium repens, an Wassergräben auf dem Bru-
derwörth, vom Hrn. Grafen v. Stern-
berg gefunden.

Flora, bei anderer Gelegenheit genannt worden;
dennoch halte ich es für nöthig, solche in das ordens-
liche Verzeichniß unserer Pflanzen, zur bequemen
Uebersicht, mit einzurücken.

Chaerophyllum hirsutum, auf nassen Waldwiesen bei Graß.

Pimpinella dissecta, auf Hügeln um Stauf.

Sechste Classe.

Ornithogalum minimum, auf Aeckern beim Birkelgute.

Hyacinthus botryoides, auf Aeckern bei Prüf-ling.

Juncus inflexus, an Wassergräben.

Siebente Classe.

Trientalis europaea, bei Bodenwehr, nach Hrn. v. Boith.

Achte Classe.

Elatine Hydropiper, bei Bodenwehr, vom Hrn. von Boith gesammelt.

Zehente Classe.

Andromeda polifolia, ebendasselbst.

Dianthus prolifer, in den Winzerbergen und bei Etrichhausen, vom Hrn. Chevalier de Bray gefunden.

Dianthus diminutus, bei Bodenwehr, nach
Hrn. v. Voith.

Stellaria palustris, auf Wiesen bei Stauf,
nach Hrn. Grafen v. Sternberg.

Zwölfte Classe.

Potentilla supina, bei Heising, Düval.

Dreizehnte Classe.

Papaver Argemone, auf Aeckern bei Stauf,
Düval.

Papaver dubium, auf Aeckern beim Schuß-
felsen, von Hrn. Grafen von Stern-
berg gesammelt.

Anemone vernalis, bei Bodenwehr häufig,
nach Hrn. von Voith.

Ranunculus hederaceus, am Rande eines
Bachs bei Stammsried, Düval.

Vierzehnte Classe.

Orobanche ramosa, auf Aeckern beim Hart-
hof, von Hrn. Grafen v. Sternberg
entdeckt.

Fünfzehnte Classe.

Iberis nudicaulis, beim Harthof selten, nach
Hrn. Grafen v. Sternberg, ich fand
sie häufig bei Bodenwehr.

Cardamine parviflora, an Waldbächen bei
Stauf.

Cardamine hirsuta, ebendasselbst.

Siebenzehnte Classe.

Genista pilosa, bei Bodenwehr, nach Hrn.
von Voith.

Neunzehnte Classe.

Apargia hastilis, auf Waldwiesen bei Graß,
Düval.

Cnicus dubius, auf dem Scheibelberge bei
Stauf.

Bidens minima, bei Nierergebrachin, Düval.

Tussilago hybrida, auf Wiesen bei der Mühle
zu Teuerling, Düval.

Aster salicifolius, bei Stauf an der Donau,
von Hrn. Grafen von Sternberg ge-
sammelt.

Zwanzigste Classe.

Orchis maculata, bei Stauf, im Wäldchen
am Scheibelberge.

Ein und zwanzigste Classe.

Zannichellia palustris, bei Bodenwehr.

Carex laevis, auf Sumpfwiesen.

Carex fusca, auf Wiesen beim Dirkelgute.

Zwei und zwanzigste Classe.

Najas minor, bei Bodenwehr.

Vier und zwanzigste Classe.

Equisetum hyemale, im Walde bei Zeideldorn.

Polypodium Thelypteris, war bisher ohne
Wohnort aufgeführt, ich fand es häufig
bei Schönach.

Polypodium cynapifolium, an Felsen der
Donau.

Lycopodium complanatum, bei Bodenwehr
häufig, nach Hrn. v. Voith.

Polytrichum Juniperifolium, häufig in der
Klammer. *)

*) Da hier das erstemal die Rede von der Klammer,
einer, für Regensburgs Flora, wichtigen Gegend

Bryum glaucum, mit Fructificationen aus der Klammer.

Bryum heterostichum, in der Klammer.

Bryum aciculare, ebendasselbst.

Mnium triquetrum, auf der Mooswiese bei Gebraching.

Mnium capillare, in der Klammer.

Hypnum pennatum, bei Bodenwehr in Waldungen, häufig mit Fructificationen, im May.

Hypnum uncinatum, auf hohen Felsen in der Klammer, ohne Fructificationen.

Hypnum curtipendulum, bei Donaustauf. Dieses *Hypnum* wächst an den Stämmen und auf den Aesten der Fichten, von welchen es im Alter, an langen seilartigen Fäden herabhängt.

ist; so muß ich dieselbe näher anzeigen. Hinter Donaustauf, auf dem halben Wege nach Lichtenwald, liegen, rechter Hand, einige Häuser, worunter auch eine Nagelschmiede befindlich, welche der ganzen Gegend den Namen, die Klammer gegeben haben mag. Die Granitfelsen dieses Bezirks liefern seltene Cryptogamen.

Hypnum dendroides, bei Bodentwehr häufig mit Fructificationen.

Hypnum strigosum, beim Schutzfelsen.

Hypnum rivulare, aus einer Wasserquelle an den Schwabelweisbergen.

Hypnum recognitum, im Walde bei Weinding. Dieses Moos wurde auch hier, wie an mehrern Orten, ehemals für *H. delicatulum* ausgegeben, das kaum in Deutschland zu Hause seyn wird.

Jungermannia emarginata, aus der Klammer ohne Fructificationen.

Jungermannia ciliaris, hinter Dechbetten an Baumrinden.

Jungermannia nemorosa, in Waldungen bei Stauf, ohne Fructificationen.

Jungermannia radicans, beim Schutzfelsen, ohne Fructificationen.

Jungermannia furcata, an Stämmen der Erlen bei Königswiesen.

Anthoceros laevis, auf nassen Stellen im Walde bei Weinding.

Collema ciliatum, auf dem Moos, unter den Kalchfelsen an der Donau, Einsing gegenüber.

- Collema fasciculare, an durren Nesten.
- Collema graniforme, an einem Bache bei
Dechbetten.
- Peltigera chlorophylla, an Baumwurzeln in
der Klammer, und bei Bodenwehr, aber
ohne Fructificationen.
- Cladonia squammosa, in der Klammer.
- Lobaria squarrosa, an Baumrinden.
- Lobaria dilacerata, mit der vorigen.
- Lobaria aculeata, an dem Anfange der Schwa-
belweißbergen.
- Lobaria verrucosa, auf dem waldigen Hügel
am linken Ufer der Laber. Unterscheidet
sich von der sehr ähnlichen Lobaria pul-
monaria dadurch, daß die Scutellen in
der Mitte stehen.
- Lobaria tiliacaea, an Baumrinden.
- Lobaria tegularis, ist bei uns sehr gemein.
- Pfora testacea, an Felsen bei Etrighausen.
- Pfora paradoxa, ebendasselbst. Hat mit Pf.
vesicularis viele Aehnlichkeit.
- Pfora mycrophylla, an der Erde. Die Blät-
ter sind ohne Microscop kaum wahrzu-
nehmen.

Verrucaria guttata, an Felsen.

Verrucaria olivacea, an Baumrinden.

Verrucaria varia, an alten Brettern.

Einige noch nicht hinlänglich beobachtete
Gewächse werde ich, nebst den Schwämmen,
ein andermal nachtragen.

XI.

Nachtrag zur salzburgischen Flora. Vom
Hrn. Mathias Mielihofer, hochfürst-
lich salzburgischen Berwessschreiber, zu
Hüttschlag in Großarl.

V o r e r i n n e r u n g.

Da ich bereits seit 3 Jahren mehrere berg-
männische Reisen auf viele, zum Theile noch
sehr wenig, zum Theile auch gar nicht un-
tersuchte salzburgische Alpengebirge gemacht

M

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1801

Band/Volume: [1801](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [X. Nachtrag zu dem Verzeichniß der um](#)

Regensburg wachsenden Pflanzen. Vom Hrn. Professor
Düval. 166-177