

chymzellen teils in Form von hellroten oft die ganze Zelle ausfüllenden krümelig-körnigen oder vollkommen homogenen Massen, teils in Form von feuerroten (-gelben) Tropfen. Er ist unlöslich in Alkohol, Aether, Natronlauge, Ammoniak und Säuren, bei wechselnder Behandlung mit Natronlauge und Salzsäure schien ein Teil in Lösung zu gehen.

G. Bredemann.

**Stoll, P.**, Ueber die Squarehead Form. (Deutsche landw. Presse. p. 1110 u. 1111. 1 Abb. 1910.)

Bei mehreren Bastardierungen von *Triticum sativum vulgare* mit *Tr. Spelta* und von *Tr. turgidum* mit *Tr. Spelta*, sowie von *Tr. sativum vulgare* mit *Tr. polonicum* wurden vom Verf. Formen erhalten, die *Tr. compactum* und Squarehead entsprechende Aehren zeigten. Gleiches war schon von Rimpau, v. Tschermak, dann in Hohenheim und Weihestephan bei den Bastardierungen mit *Tr. Spelta* beobachtet worden. Verf. fand aber keulige Blütenstände, wie sie der Squarehead-Aehre entsprechen, auch bei *Tr. Spelta* (Refer. gleichfalls) dann *Tr. repens*, *Brachypodium pinnatum*, *Lolium perenne* und *italicum* und glaubt, dass die Anlage zur Bildung solcher in vielen ährentragenden Graminaeen latent vorhanden ist.

C. Fruwirth.

**Wéber, D.**, Adatok néhány gyakorlatilag fontos szőlő-fajta gyökereinek anatómiai wegkülönböztetéséhez. [Angaben zur anatomischen Unterscheidung der Wurzeln einiger praktisch wichtigeren Weinrebensorten]. (Jahrb. d. kgl. ungar. ampelologischen Zentralanstalt. III. 1908. p. 17–22. Budapest 1909. magyarisch.)

Anleitungen zur schärferen Unterscheidung von einzelnen Sorten und Bastarden von einander. Bei 2–3jährigen Wurzeln ist dies verhältnismässig leicht, nicht so aber bei noch jungen.

Matouschek (Wien).

## Personalnachricht.

### Centralstelle für Pilzkulturen.

Roemer Visscherstraat 1, Amsterdam.

Unter Hinweis auf die publizierten Bestimmungen teilen wir mit, dass der Betrag pro Kultur fl. 1.50 für Mitglieder und fl. 3 für Nichtmitglieder ist. Grössere Mengen, speziell mehrere Kulturen von einer Art, können für botanische Praktika gegen ermässigte Preise geliefert werden.

Seit der letzten Publikation sind folgende Arten als Neu-Erwerbungen zu erwähnen:

* <i>Fusarium metachroum</i> Appel.	<i>Polyporus vaporarius</i> Fries.
<i>Torula Wiesneri</i> Zikes.	<i>Merulius silvester</i> Falck.
„ <i>glutinis</i> (Cohn) Pringsh. u. Bilersky.	<i>Contiophora cerebella</i> Alb. et Schwein.
<i>Polyporus destructor</i> Fries.	<i>Collybia velutipes</i> fruktifizierend!

Ausgegeben: 30 Mai 1911.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.  
Buchdruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [116](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion des Botanischen Centralblatts

Artikel/Article: [Personalnachrichten. 592](#)