

rupicola, *C. rungweensis*; *Habernaria* § *Platycorne*: *H. Ipyanae*, *ukingensis*, *ochrantha*, *H.* § *Chlorina*: *H. xanthochlora*, *H.* § *Pentaceras*; *H. pulla*, *silvatica*, *hymenophylla*, *papyracea*, *lurida*, *H.* § *Taenianthera*: *H. Aenophora*, *rhombocorys*, *H.* § *Geophyllum*; *H. odorata*, *platymera*, *Adolphi*, *lithophila*, *quadrifida*, *aberrans*, *pilosa*, *leucotricha*, *nephrophylla*, *H.* § *Bonatea*: *H. polychlamys*, *H.* § *Ceratopetalum*: *H. dactylostigma*, *subcornuta*, *Harmsiana*, *Hermingiana*, *megistosolen*, *H.* § *Bilabrella*: *H. diselloides*, *inaequiloba*, *furcipelata*, *lutaria*, *Kyimbilae*, *Weberiana*, *Marxiana*, *isoantha leucoceras*, *orihocaulis*: *Roeperocharis ukingensis*, *R. elata*; *Centrostigma nyassanum* n. g. n. sp. [zu diesem Genus gehören auch *C. occultans* (Welw.) und *C. Schlechteri* (Kränzl.)]; *Satyrium leucanthemum*, *unifolium*, *monadenum*, *sceptrum*, *colliferum*, *brachyrhynchum*, *rhynchantoides*, *robustum*, *sphaeranthum*, *fallax*, *microcorys*, *amblyosaccos*; *Disa Stolzii*, *ornithantha*, *nyassana*, *ukingensis*, *amblyopetala*, *rungweensis*; *Brownleea gracilis*; *Pterygodium ukingense*; *Disperis parvifolia*, *Stolzii*, *leuconeura*, *centrocorys*; *Cheirostylis sarcopus*; *Microstylis Stolzii*; *Liparis mulindana*, *nyassana*, *neglecta*, *rungweensis*, *Stolzii*, *rupicola*, *Stolzia nyassana* n. g. n. sp.; *Polystachya oligophylla*, *malilaensis*; *Calanthe Stolzii*, *neglecta*; *Bulbophyllum Stolzii*, *nyassanum*; *Cirrhopetalum africanum*; *Pteroglossaspis stricta*; *Eulophia epiphanoides*, *bletilloides*, *subsaprophytica*, *Stolzii*, *encyclioides*, *sabulosa*, *triceras*, *nana*, *ukingensis*, *massakoensis*, *exilis*, *concinua*, *rara*, *monticola*, *ochracea*, *brunneo-rubra*, *Kyimbilae*, *elegans*, *euantha*, *sylvatica*; *Lissochilus euanthus*, *eleogenus*, *sceptrum*, *roseolabius*, *ukingensis*, *amblyosepalus*, *pulcher*; *Eiophidium nyassanum*; *Acampe nyassana*; *Calyptrochilum orientale*; *Gussonea Stolzii*; *Chamaeangis sarcophylla*; *Aerangis mystacidioides*, *falcifolia*, *oligantha*; *Cyrtorchis bracteata*; *Diaphananthe Stolzii*; *Tridactyle nyassana*, *pulchella*; *Angraecum Stolzii*, *parcum*, *chamaeanthus*. — Die vielen Abarten von schon bekannten Arten werden hier übergangen, ebenso die unbestimmbaren Arten.

Matouschek (Wien).

Schinzinger. Holzmehl und Volksernährung. (Allg. Forst- und Jagdzeitung. XCI. p. 190—192. 1915.)

Der Artikel enthält nichts neues. Er behandelt die Frage in wie weit Holzmehl, Strohmehl, Reisig, Laubheu, verdorrtes Gras u. dergl. für Nahrungs- bzw. Futterungszwecke verwendet werden können, unter Hinweis auf die Untersuchungen von Haberlandt, Kindlei, Zuntz u. a.

Neger.

Personalnachrichten.

Verstorben: Geheimrat Prof. Dr. **L. Kny** in Berlin am 26. Juni. — Dr. **W. Heering** in Hamburg, Custos und Assistent am Institut für Allgemeine Botanik, im Kriege gefallen am 26. Mai. — Dr. **T. Ciesielski**, Prof. und Direkt. des bot. Gart. der Univ. Lemberg.

Ausgegeben: 15 August 1916.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Buchdruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [132](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Personalnachrichten 192](#)