

dine 0,006—7 mm. Paraphyses filiformes, ascos superantes, septatae, ca. 0,002 mm crassae. Pili peritheciï dilute viridi-lutescentes, obtusi, simplices, scabri, ca. 0,006 mm crassi.

Secundum Rehm l. c.

Wien, am 1. Juli 1887.

Botanische Gärten und Institute.

Caruel, T., L'orto e il museo botanico di Firenze nell'anno scolastico 1885—1886. (Nuovo Giornale Botanico Italiano. XIX. 1887. p. 255.)

Instrumente, Präparationsmethoden

etc. etc.

Wilfarth, H., Ueber eine Modification der bacteriologischen Plattenculturen. (Deutsche medicinische Wochenschrift. 1887. No. 28. p. 618—619.)

Originalberichte gelehrter Gesellschaften.

Botanischer Verein in Lund.

III. Sitzung am 18. April 1887.

1. Dr. O. Nordstedt sprach:

Ueber die von Prof. S. Berggren auf Neu-Seeland gesammelten Süßwasseralggen.

Unsere Kenntniss von den Süßwasseralggen Neu-Seelands ist äusserst gering, obwohl in letzterer Zeit einige Mittheilungen in dieser Beziehung von Grunow, Maskell und Spencer publicirt worden sind. Deshalb dürften alle Beiträge, die unsere Kenntniss erweitern, willkommen sein. Dr. Berggren hatte 1874—75 seine Sammlungen zu Stande gebracht, sowohl in „the Hot Lake District“ der nördlichen Insel, als in den Alpen der südlichen Insel auf einer Höhe von 2—5000'. Auch im Tieflande wurde von ihm gesammelt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Botanische Gärten und Institute; Instrumente, Präparationsmethoden etc. etc. 321](#)