© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

namentlich in den nördlicheren torfmoorigen Gegenden, noch anderswo aufgefunden werden.

Beide, die ungarischen wie der angebliche mährische Standort, fallen ungefähr in die Mitte des bisher bekannten Verbreitungsbezirks von A. cristatum, durch welche zwei Punkte (falls nämlich die kritische Feststellung des Troppauer Exemplars mit meiner Voraussetzung übereinstimmt) die bisher bestandene Lücke in der geographischen Länge zwischen Schlesien und Galizien als ausgefüllt betrachtet werden kann. Der mährische Standort verdient hier umsomehr der Erwähnung, da in der Rabenhorst'schen Kryptogamen-Flora (Filices-Band) Luerssen denselben nicht erwähnt.

Sammlungen.

Hauck, Ferdinand und **Richter, Paul,** Phycotheca universalis, Sammlung getrockneter Algen sämmtlicher Ordnungen und aller Gebiete. Leipzig (Commission von Ed. Kummer) 1885—1887.

(Fortsetzung.)

Fascikel II. No. 51—100.

51. Bornetia secundiflora (J. Ag.) Thur., bei Algier, von Prof. Dr. F. Debray. December. — 52. Gloiosiphonia capillaris (Huds.) Carm., bei Hampton, New Hampshire, von F. S. Collins. August. — 53. Polysiphonia violacea (Roth) Grev. α. genuina, bei Triest, von Hauck. Febr. — 54. P. violacea (Roth) Grev., Mittelform zwischen α. genuina und γ. tenuissima, bei Muggia-Triest, von Hauck. März. — 55. P. fruticulosa (Wulf.) Spreng., kleine Form, bei Triest, von Hauck. Juli. — 56. Phyllophora rubens (Good. et Woodw.) Grev. β. nervosa, bei Albisola, Liguria, von Dr. A. Piccone. Septbr. — 57. Peyssonnelia Squamaria (Gmel.) Decne., bei Albisola, Liguria, von Dr. A. Piccone. Septbr. — 58. Rissoella verruculosa (Bert.) J. Ag., bei Spezia, von Dr. A. Piccone. Juli. — 59. Chantransia Daviesii (Dillw.) Thur. auf Rhodymenia palmata. (Syn. Callithamnion Daviesii Harv.), bei Fecamp, Seine inférieure, Frankreich, von F. Debray. August. — 60. Galaxaura adriatica Zanard., bei Parenzo, Istrien, von A. Zaratin. — 61. Phyllitis Fascia (H. Dan.) Kütz., β. caespitosa, von Muggia bei Triest, von Hauck. März und April. — 62. Udotea Desfontainii (Lamour.) Decne., bei Rovigno, Istrien, von Hauck, und bei Albisola Liguria von A. Piccone. August und Septbr. — 63. Codium Bursa (L.) Ag., bei Albisola marina, Liguria, von A. Piccone. März. — 64. Monostroma Blyttii (Aresch.) Wittr., Revere Beach, Massachus., von F. S. Collins. November. — 65. Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jolis. α. siliculosus, Muggia bei Triest, von Hauck. März. — 66. E. confervoides (Roth) Le Jolis β. subulatus in Uebergängen zu α. siliculosus, bei Capo d'Istria, von Hauck. Mai. — 67. Chaetomorpha Picquotiana (Mont.) Kütz., Revere Beach, Massachus., von F. S. Collins. November. — 68. Cladophora fracta (H. Dan.) Kütz. f. marina, in den Salinen bei Capo d'Istria, von Hauck. Mai. — 69. Conferva bombycina Ag., in den Gräben der Salinen bei Capo d'Istria, von Hauck. Septbr. — 70. Oedogonium rivulare (Le Clerc) Al. Braun, bei Berlin gesammelt von P. Hennings. April. — 71. Spirogyra orthospira (Naeg.) Kütz., bei Berlin gesammelt von P. Hennings. Juli. — 72. Ulothrix implexa (Kütz.), im Meere bei Muggia nächst Triest, von Dr. F. Hauck. März. — 73. Hyalotheka mucosa (Merti) Ehrenb., in einem Torfgraben bei Colditz in Sachsen, von P. Richter. April. — 74. Chroolepus Julithus (Linn.) Ag. f. bovinum Rbh., bei St. Blasien im Schwarzwald, ges. von J. Kühn. — 75. C. lageniferum

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hildebr., auf Palmen, Pandaneen, Cycadeen etc. im Berliner botan. Garten, ges. von P. Hennings. August. — 76. Chlamydococcus pluvialis (Fw.) A. Braun, bei Kötzschenbroda (Dresden), von R. Wollny. Septbr. — 77. Scenedesmus acutus Meyen, bei Kötzschenbroda (Dresden), von R. Wollny. Juni. — 78. Hydrodictyon utriculatum (Linn.) Roth, in verschiedenen Stadien gesammelt von 2 verschiedenen Standorten: a) aus dem Wasserpflanzen-Behälter des Berliner botan. Gartens, von P. Hennings, August; b) aus den Canalisations-Armen des Gravellone und des Tessin bei Pavia, von R. Solla und P. Beccarini. Novbr. — 79. Pediastrum simplex Meyen β echinulatum Wittr., bei Rentilly (Seine et Marne), von G. Thuret, comm. Dr. E. Bornet. — 80. P. Boryanum (Turp.) Menegh. var. subuliferum Ktz., bei Kötzschenbroda (Dresden), von R. Wollny. Juli. — 81. a) Gloecystis quaternata (Kützg.) Richter (Syn. Gloeocapsa quat. Kütz.), b) Gloeocystis confluens (Kütz.) Richter (Syn. Gloeocapsa confluens Kütz.), beide im Uttewalder Grunde bei Dresden auf Jungermannia, von P. Richter. Aug. — 82. Urococcus insignis Hassall., in 4 Auftragungen, verschiedene Entwicklungsstadien, vom Königstein, Sachsen, ges. von P. Richter, August, und W. Krieger, April. — 83. Gloeotrichia solida Richter nov. sp. in 2. Auftragungen, reif und unreif, auf Lemna trisulca, bei Leipzig, von P. Richter. Juli und September. — 84. Oscillaria princeps Vauch. α. maxima (Kütz.), Reizendorf bei Dresden, ges. von P. Richter. August. — 85. Nostoc muscorum Ag., bei Sumène (Gard) Frankreich, ges. von Ch. Flahault. Februar. — 86. N. commune Vauch., vom Monte Cesarino, Provinz Pavia, ges. von R. Solla. Februar. — 87. N. commune Vauch. f. flagelliformis Flahault, bei Montpellier, Frankreich, ges. von Ch. Flahault. März. — 88. N. verrucosum Vauch., in rasch fliessendem Wasser bei Montpellier, Frankreich, von Ch. Flahault. März. — 89. N. rupestre Kütz., an feuchten Felsen bei Ganges (Hérault), Frankreich, von Ch. Flahault. März. 90. N. carneum Ag., in zwei Auftragungen ges. in Schlesien von P. Richter, August, und bei Leipzig von H. Reichel, Septbr. — 91. Coccochloris stagnina Spreng. var. prasina (Al. Braun) Richter, ges. bei Wurzen unweit Leipzig von H. Reichel. Juni. — 92. Polycystis scripta Richter n. sp. (Diagnose beigedruckt), im salzigen Mansfelder See, ges. von P. Richter. Septbr. — 93. Navicula (Diadesmis) gallica (W. Sm.) Van Heurck, in einem Brunnen bei Triest, ges. von Hauck, det.: Van Heurck. — 94. N. acuminata (W. Sm.) Grun., bei Oporto, ges. von Isaac Newton. October. — 95. Rhizosolenia Shrubsolii Cleve, bei Triest, ges. von Hauck. Juni. — 96. Surirella biseriata Bréb. var. maxima forma plus minusve constricta Grun., bei Chemnitz in Sachsen, von E. Hempel. April. — 97. Synedra pulchella Kütz. var. lanceolata, bei Monfalcone, ges. von Hauck. März. — 98. Rhadonema adriaticum Kütz., vom verkäuflichen Helmintochorzon (Corsica) abgeschwemmt. leg. E. Debes. — 99. Nitzschia sigmoidea (Nitzsch.) W. Sm., bei Leipzig, ges. von H. Reichel. Juli. — 100. Melosira nummuloides (Bory) Ag., in 3 Auftragungen von Cuxhafen, Leipzig und Artern (Preussen), von H. Reichel und E. Debes. Juni und Juli.

(Schluss folgt.)

Originalberichte gelehrter Gesellschaften.

Botanischer Verein in Lund.

IV. Sitzung am 16. Mai 1887.

Docent **N. Hjalmar Nilsson** gab:

Eine Uebersicht über die skandinavischen Arten der Gattung Rumex und ihrer Hybriden.

(Fortsetzung.)

1. R. maritimus L. sp. pl. ed. I. p. 478. Pflanze bei der Fruchtreife strohgelb, mit reichblütigen, ährenartig zusammen-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Sammlungen 249-250