

Besonders anziehend sind die vom Herausgeber auf Kirchendächern gemachten Funde. Auf Holzschindeln solcher Dächer wurden gesammelt:

149. *Candelaria vitellina* (Ehrh.), 154. *Sarcogyne simplex* Dav., 158. *Lecanora albescens* (Hoffm.).

Auf Ziegeln von Kirchendächern hat Herausgeber gesammelt:

143. *Stereocaulon pileatum* Ach. c. ap. (! — Ref.), 162. *Aspidia calcarea* (L.) F. Hoffmanni Ach., 168. *Biatora coarctata* Ach. F. *ocrinaeta* Ach., 173. *Lecidea grisella* Fl. 184. *Buellia stellulata* (Tayl.), 188. *Diplotomma epipolium* Ach. F. *ambiguum* Ach., 194. *Lithoeccia glaucina* (Ach.), 196. *Verrucaria rupestris* (Schrad.).

Minks (Stettin).

Ausgeschriebene Preise.

Die Königlich dänische Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen hat zwei Preise von 400 und 600 Kronen ausgeschrieben, von denen der eine für Untersuchungen über die genaue Natur und Zusammensetzung der wichtigsten Kohlenwasserstoffe, die sich in den verschiedenen Reifestadien in den gebräuchlichsten Cerealien vorfinden, der andere für Untersuchungen über die in Dänemark vorkommenden *Phytoptus*-Gallen nebst einer Monographie über die dieselben hervorrufenden Insecten bestimmt ist. Die Preise gelangen im October 1893 zur Vertheilung.

Referate.

Palouzier, Emile, Essai d'une monographie des Fougères françaises. (Thèse de l'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier.) 4^o. 103 pp. Montpellier 1891.

Verf. veröffentlicht eine etwas von der gewöhnlichen Eintheilung abweichende Gruppierung der Gattungen.

- I. Fougères dont les sporanges n'ont pas d'anneau élastique.
 - a. Feuilles enroulées en crosse pendant la perfoliation.

1. sporanges libres disposés en paniculus.	<i>Ophioglosseae.</i>
2. " sondés " " épis.	<i>Botrychium.</i>
	<i>Ophioglossum.</i>
 - b. Feuilles non enroulées. *Osmundaceae.*

	<i>Osmunda.</i>
--	-----------------
 - II. Fougères dont les sporanges ont un anneau élastique.

A. <i>Polypodiaceae</i> nudae.	<i>Polypodiaceae.</i>				
<ol style="list-style-type: none"> a. Pétioles non articulés. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. spores marginales.</td> <td style="text-align: right;"><i>Nothochlaena.</i></td> </tr> <tr> <td>2. " éparses, sans ordre.</td> <td style="text-align: right;"><i>Grammitis.</i></td> </tr> </table> 	1. spores marginales.	<i>Nothochlaena.</i>	2. " éparses, sans ordre.	<i>Grammitis.</i>	
1. spores marginales.	<i>Nothochlaena.</i>				
2. " éparses, sans ordre.	<i>Grammitis.</i>				
B. <i>Polypodiaceae</i> indusiatae.					
<ol style="list-style-type: none"> a. Sores placés sur une anastomose de nervures et parallèlement à la nervure médiane. Indusium fixé par son bord externe, libre par son bord interne.	<i>Blechnum.</i>				
- |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Ausgeschriebene Preise. 205](#)