

grossen Basins im Freien zu ziehen, hingewiesen. *Victoria regia* und *Nelumbium speciosum* u. a. gedeihen so in Washington, ohne dass man zu künstlicher Erwärmung zu greifen braucht. Diese wird jedoch für *Victoria regia* und die empfindlicheren unter den tropischen Wasserlilien in Chicago notwendig. Die *Nelumbien* jedoch halten auch in den ungeheizten Teichen aus.

Stapf (Kew).

Diagnoses Africanæ. II. Convolvulaceæ. Auctore J. G. Baker. (Bulletin of Miscellaneous Information. 1894. February. No. 86. p. 67—74.)

Es werden die folgenden neuen Arten beschrieben:

Argyreia? macrocalyx, tropisch Ost-Afrika, 3—7° s. Br., Nesilala, Bischof Hannington. *A.? laxiflora*, Nyassa Land, Buchanan. *A.? Grantii*, tropisch Ost-Afrika, Chopch, 2° n. Br., Grant. *A.? Hanningtoni*, tropisch Ost-Afrika, 3—7° s. Br., Kisokwe, Bischof Hannington.

Convolvulus Angolensis, Angola, Cuenza, H. H. Johnston. *C. Thomsoni*, N. vom Nyassa, J. Thomson.

Breveria conglomerata, Angola, Welwitsch, 6160. *B. microcephala*, Angola, Welwitsch, 6159. *B. sessiliflora*, Thal des Zambesi zwischen Senna und Lupata, Kirk. *B. (Seddera) baccharoides*, Thal des Zambesi zwischen Tette und der Küste, Kirk. *B. (Prevostea) campanulata*, Gabun, Sibangefarn, Soyaux. *B. (Prevostea) Heudelotii*, Senegambien, Heudelot, 864. *B. buddleoides*, Ufer des Rovuma, Kirk.

Ipomoea (Orthipomoea) discolor, Tanganyika, Carson, 18. *I. (Orthipomoea) irphosepala*, Angola, Welwitsch, 6101. *I. (Orthipomoea) Elliottii*, Matabeleland, W. Elliott. *I. (Strophipomoea) phyllosepala*, Zambesi-Land, Kirk. *I. (Strophipomoea) cephalantha*, Kilimandjaro, 6000 Fuss, H. H. Johnston. *I. (Strophipomoea) Benguelensis*, Benguela, Welwitsch, 6127. *I. (Strophipomoea) Zambesiaca*, Shupanga- und Zambesi-Delta, Kirk, L. Scott. *I. (Strophipomoea) aspericaulis*, Angola, Welwitsch, 6120. *I. (Strophipomoea) Hanningtoni*, tropisch Ost-Afrika, 3—7° s. Br., Bischof Hannington, Tanganyika, Carson. *I. (Strophipomoea) Barteri*, Juba am Quorra, Barter. *I. (Strophipomoea) Huillensis*, Huilla, 3800—5500 Fuss, Welwitsch, 6131. *I. (Strophipomoea) vagans*, Nyassaland, Buchanan. *I. (Strophipomoea) diplocalyx*, Zambesi-Delta, L. Scott. *I. (Strophipomoea) Vogelii*, Kuka, am Tschadsee, Vogel. *I. (Strophipomoea) Carsoni*, Plateau am Tanganyika, Carson. *I. (Strophipomoea) Morsoni*, Sierra Leone, Morson. *I. (Strophipomoea) inconspicua*, Nyassa-Land, Buchanan. *I. (Strophipomoea) polytricha*, Loanga, Soyaux, 88. *I. (Strophipomoea) oxyphylla*, Angola, Welwitsch, 6229. *I. (Strophipomoea) Shirembensis*, Zambesi-Land, Shiramba, Kirk. *I. (Strophipomoea) acuminata*, Zambesi-Hochland, 2000 bis 4000 Fuss, Kirk, Blantyre, Buchanan. *I. (Strophipomoea) Tamberensis*, Tamberle am oberen Shiré, Kirk. *I. (Strophipomoea) megalochlamys*, Angola, Welwitsch, 6113. *I. (Strophipomoea) Holubii*, Zambesia, Thal des Leshumo, Dr. Holub. *I. (Strophipomoea) nuda*, Angola, Welwitsch, 6230. *I. (Strophipomoea) Shupangensis*, Zambesi-Thal, zwischen Tette und der Mündung, Kirk. *I. (Strophipomoea) Wakefieldii*, Nyika-Land, T. Wakefield. *I. (Strophipomoea) Buchananii*, Nyassa-Land, Buchanan, 319 der Sammlung von 1883. *I. (Strophipomoea) odontosepala*, tropisch Ost-Afrika, 2—7° s. Br., Bischof Hannington. *I. (Strophipomoea) stellaris*, am Rovuma, Kirk. *I. (Aniseia) Smithii*, Congo, Chr. Smith. *I. (Calonyction) Shirensis*, Shiré-Hochland, Kirk, Buchanan.

Stapf (Kew).

Sammlungen.

Britton, N. L., Note on the Herbarium of Stephen Elliott. (Bulletin of the Torrey Botanical Club. XXI. 1894. p. 80.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Sammlungen. 59](#)