

## Gelehrte Gesellschaften.

**Versammlung** der k. k. zoolog.-bot. Ges. in Wien am 2. März 1881:

Herr Prof. Dr. H. W. Reichardt legte vor und sprach: Genera et species Orchidearum novarum Brasiliae II., von J. Barbosa Rodrigues in Rio Janeiro. 194 neue Arten auf 43 Gattungen vertheilt; unter diesen neu: Reichenbachanthus, Cryptophoranthus, Nanorchis, Platyrrhiza, Dipteranthus, Centroglossa, Capanemia. Diese Arbeit, welche eine Fortsetzung einer von dem Verf. unter dem gleichen Titel 1877 zu Sebastianopolis herausgegebenen ist, wird als selbständige Publication erscheinen.

Herr Anton Heimerl gab eine Aufzählung von für die Flora Niederösterreichs neuen Funden und Standorten seltener Pflanzen.

Wien, den 4. März 1881.

Dr. Emil v. Marenzeller, Secr.

## Sammlungen.

Die Herren **F. Hunger** und **P. Sydow** in Berlin beabsichtigen im Juli und Anfang August d. J. das Banat in botanischer Hinsicht zu bereisen und sind gewillt, die Ausbeute dieser Reise, die wahrscheinlich über 400 Exemplare betragen wird, auch an Andere mitzutheilen, und eröffnen deshalb eine Subscription auf dieselbe, wonach ein Jeder, der vor Beginn der Reise an einen der Unterzeichneten 60 Mark einsendet, Anspruch auf je 1 gut aufgelegtes Exemplar der gesammten Ausbeute in Gefässpflanzen hat. Für die Zellpflanzen soll eine Specialsubscription eröffnet werden. Bei Abnahme nur eines Theiles wird ein entsprechend höherer Preis eintreten müssen. Zu weiterer Auskunft sind bereit

E. Hunger, Berlin NO., Heinelshof 5.

P. Sydow, Berlin W., Dennewitzstr. 34.

**Allen, T. F.**, Characeae Americanae exsiccatae. Pars I. Fol. Boston 1880.

Enthält folgende Arten:

1. *Nitella tenuissima* Desv. f. *brevifolia*. — 2. *N. intermedia* Nordst., diarthrodactyla, homocophylla, monoica, gloeocarpa; folia triplicato-divisa, verticilli conformes laxi; nucleus sporangii ater 360  $\mu$  longus; diameter antheridii 240  $\mu$ . — 3. *N. megacarpa* Allen, subspecies *N. polyglochis* A. Pr. sens. lat., robustior, verticilli sterilesque subconformes, verticilli fertiles congesti; folia quadruplicato-divisa; nucleus sporangii ater 400—530  $\mu$  longus, 400—450  $\mu$  lat.; diametr. antheridii 400  $\mu$ . — 4. *Chara intermedia* A. Br. f. *tenuior*, micrantha, microstephana, microteles, submicroptila, elongata. — 5. *Ch. intermedia* A. Br. var. *americana* A. B. f. *microptila*. — 6. *Ch. contraria* A. Br. f. *brachyphylla*, clausa, humilior. — 7. *Ch. sejuncta* A. Br. f. *elongata*. — 8. *Ch. coronata* A. Br. var. *Schweinitzii* A. Br. — 9. *Ch. gymnopus* A. Br. var. *Michauxii* A. Br. — 10. *Ch. Hydropitys* A. Br. var. *septentrionalis* Nordst. in litt. (*Ch. Robbinsii* Holst.).

Nordstedt (Lund).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Marenzeller Emil Edler von

Artikel/Article: [Gelehrte Gesellschaften 391](#)