- Tochtermann, A.**, Ein aus Blutserum gewonnener sterilisirbarer Nährboden, zugleich ein Beitrag zur Frühdiagnose der Diphtherie. (Centralblatt für innere Medicin. 1895. No. 40. p. 961—967.)
- Woods, Albert F.**, Recording apparatus for the study of transpiration of plants. (The Botanical Gazette. Vol. XX. 1895. p. 473—476. With 1 fig.)

Botanische Reisen.

Dr. P. Taubert in Berlin tritt Ende d. M. eine botanische Forschungsreise nach Nordbrasilien und die angrenzenden Gebiete an.

Ich beabsichtige im Laufe der nächsten 2 Jahre eine neue botanische Reise nach Süd- und Ostafrika zu unternehmen. Dieselbe soll sich ausschliesslich in Gegenden bewegen, welche meine erste Reise nicht berührt hat; Namaland, das Hautam-Gebirge, Coud-Boekeveld, Transvaal, Limpopo, Matabeleland bis zum Zambesi werden das hauptsächlichste Feld meiner Forschungen und Ausbeuten sein. Die Pflanzen werden hiermit der Subscription angeboten, die Centurie mit 35 Mark. Herr Prof. Schumann, an den ich in jeder Angelegenheit sich zu wenden bitte, wird die Güte haben, als mein Vertreter die Abonnements entgegen zu nehmen.

Rudolf Schlechter.

Referate.

Kaulfuss, J. S., Beiträge zur Kenntniss der Laubmoosflora des nördlichen fränkischen Jura und der anstossenden Keuperformation. (Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg. Band X. 1894. Heft 3. 32 pp.)

Vorliegende Arbeit enthält nur eine Aufzählung aller vom Verf. in dem betreffenden Gebiete beobachteten Torf- und Laubmoose nebst Standortsangaben derselben. An Sphagna werden 20 Arten aufgeführt, unter denen fünf bereits aus dem Gebiete bekannte Species: *S. imbricatum* (Hornsch.) Russ., *S. subnitens* Russ. et Warnst., *S. contortum* (Schultz.) Limpr., *S. platyphyllum* (Sulliv.) Warnst., *S. teres* Ångstr. fehlen. — Unter den 256 angegebenen Laubmoosen sind folgende Arten bemerkenswerth:

Archidium alternifolium Schpr., *Ephemerum serratum* Hpe., *Acaulon muticum* C. Müll., *Astomum crispum* Hpe., *Pleuridium nitidum* Rbh., *Hymenostomum tortile* Br. eur., *Gymnostomum rupestre* Schleich., *G. calcareum* Br. germ., *G. curvirostre* Hedw., *Dicranoweissia cirrata* Lindb., *Eucladium verticillatum* Br. eur., *Rhabdoweisia fugax* Br. eur., *Cynodontium polycarpum* Schpr., *Dichodontium pellucidum* Schpr., *Dicranella Schreberi* Schpr., *D. subulata* Schpr., *Dicranum spurium* Hedw., *D. Bonjeani* de Not., *D. Mühlenbeckii* Br. eur., *D. montanum* Hedw., *D. flagellare* Hedw., *D. fulvum* Hook., *D. longifolium* Ehrh., *Campylopus turfaceous* Br. eur., *C. flexuosus* Brid., *C. fragilis* Br. eur., *Dicranodontium longirostre* Schpr., *Trematodon ambiguus* Hornsch., *Fissidens pusillus* Wils., *F. crassipes* Wils., *Seligeria*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [64](#)

Autor(en)/Author(s): Schlechter Rudolf

Artikel/Article: [Botanische Reisen. 438](#)