

Prodromus einer Avifauna der Stauseen am "Unteren Inn"

Von JOSEF REICHHOLF, Aigen am Inn

Die faunistische Erfassung des Vorkommens der Vögel an den Stauseen am "Unteren Inn" im Gebiet zwischen Marktl (Alzmündung), Burghausen (Salzachmündung) und Schärding-Neuhaus (Rottmündung) ist nach nun fast 10 jähriger Tätigkeit praktisch abgeschlossen. Änderungen größeren Ausmaßes oder eine Fülle von Neunachweisen sind nicht mehr zu erwarten. So soll hiermit der Versuch gemacht werden, eine Liste aller nachgewiesenen Arten mit einem Minimum an Angaben über Häufigkeit, Brutnachweise und Status zusammenzustellen. Für die Überlassung wertvoller Angaben danke ich allen Mitarbeitern an der Erforschung der Vogelwelt vom "Unteren Inn", insbesondere meinen Freunden von der ZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BRAUNAU und der Außenstelle Braunau der Vogelschutzwarte Steyregg.

Um den Text so knapp wie möglich zu halten, wurden folgende Abkürzungen verwandt:

- Br. - Brutvogel,
- (Br.) - unregelmäßiger Brutvogel,
- (+) - ausgestorben;
- Dz. - Durchzügler,
- (Dz.) - unregelmäßiger Durchzügler,
- Wi. - Wintergast,
- (Wi.) - unregelmäßiger Wintergast;
- h. - häufig,
- s. - selten,
- ss. - sehr selten.

Die Beobachtungen an den Wasservögeln sind teilweise veröffentlicht, die übrigen Daten sind aus dem Archivmaterial der Station Braunau und des Verfassers ersichtlich. Angaben über ausgestorbene Arten, die noch vor dem 2. Weltkrieg im Gebiet brüteten, sind der Arbeit von F. UHL (1926): Die Vogelwelt um Burghausen; Arch. Naturg. 22 und (1933): Über die Brutvögel der Umgebung von Burghausen a.d.S. Verh. orn. Ges. Bayern 20, 3-52 entnommen. Beide Arbeiten liefern ausgezeichnetes Vergleichsmaterial zur Situation der Wasservögel vor und nach der Einstauung des Inns. Die Wasservögel behandeln zwei weitere faunistisch-ökologische Arbeiten in neuester Zeit: ERLINGER, G. (1965): Die Vogelwelt des Stauseegebietes Braunau-Hagenau. J. Oberöstr. Musealverein 110, 422-445 und REICHHOLF, J. (1966): Untersuchungen zur Ökologie der Wasservögel der Stauseen am unteren Inn. Anz. Orn. Ges. Bayern 7, 536-604. Hier ist auch die Literatur bis 1966 zusammengefaßt.

1. Prachtttaucher (*Gavia arctica*) - Dz.
2. Eistaucher (*Gavia immer*) - ss. Dz.
3. Sterntaucher (*Gavia stellata*) - s. Dz.
4. Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) - Br.
5. Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*) - Dz.

6. Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) - Dz. und Wi., s.
7. Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) - Dz.
8. Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*) - Br. und Wi.
9. Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) - Dz., max. 71 Ex.
10. Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*) - Irrgast.
11. Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*) - Irrgast.
12. Graureiher (*Ardea cinerea*) - s. Br. Dz.
13. Purpureiher (*Ardea purpurea*) - s. Br.
14. Silberreiher (*Casmerodius albus*) - s. Dz.
15. Seidenreiher (*Egretta garzetta*) - Dz.
16. Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) - Irrgast.
17. Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) - Br. in einer kleinen Kolonie.
18. Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*) - Br. lokal häufig.
19. Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) - ss. Dz. und Wi.
20. Weißstorch (*Ciconia ciconia*) - Dz., am Inn nicht mehr brütend.
21. Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) - (Dz.) in wenigen Ex.
22. Löffler (*Platalea leucorodia*) - s. Dz.
23. Sichler (*Plegadis falcinellus*) - Irrgast.
24. Flamingo (*Phoenicopterus ruber*) - Irrgast, Zooflüchtling?
25. Höckerschwan (*Cygnus olor*) - h. Br.
26. Singschwan (*Cygnus cygnus*) - ss. Wi.
27. Saatgans (*Anser fabalis*) - Dz. und Wi.
28. Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchos*) - s. Wi.
29. Bläßgans (*Anser albifrons*) - s. Wi.
30. Graugans (*Anser anser*) - Dz.
31. Brandente (*Tadorna tadorna*) - s. Dz.
32. Pfeifente (*Anas penelope*) - Dz. und Wi.
33. Schnatterente (*Anas strepera*) - h. Dz., s. Br.
34. Krickente (*Anas crecca*) - h. Dz. Br.
35. Stockente (*Anas platyrhynchos*) - h. Dz. und Wi., Br.
36. Spießente (*Anas acuta*) - Dz. und (Wi.), (Br.).
37. Knäkente (*Anas querquedula*) - Dz. (Br.).
38. Löffelente (*Anas clypeata*) - Br. (Br.).
39. Kolbenente (*Netta rufina*) - ss. Br., s. Dz.
40. Tafelente (*Aythya ferina*) - h. Dz., h. Br.
41. Reiherente (*Aythya fuligula*) - h. Dz., h. Br.
42. Moorente (*Aythya nyroca*) - s. Dz.
43. Bergente (*Aythya marila*) - Dz.

44. Eiderente (*Somateria mollissima*) - ss. Wi.
45. Eisente (*Clangula hyemalis*) - s. Wi.
46. Trauerente (*Melanitta nigra*) - ss. Wi.
47. Saemtente (*Melanitta fusca*) - s. Wi.
48. Schellente (*Bucephala clangula*) - h. Wi., max. 1.700 Ex.
49. Zwergsäger (*Mergus albellus*) - Wi.
50. Mittelsäger (*Mergus serrator*) - Wi.
51. Gänsesäger (*Mergus merganser*) - h. Wi.
52. Steinadler (*Aquila chrysaetos*) - Irrgast.
- × 53. Schelladler (*Aquila clanga*) - Irrgast.
- × 54. Schreiadler (*Aquila pomarina*) - s. Dz.
55. Zwergadler (*Hieraetus pennatus*) - Irrgast, 1 Nachweis.
56. Mäusebussard (*Buteo buteo*) - Br. und Dz./Wi.
57. Rauhußbussard (*Buteo lagopus*) - Wi.
- × 58. Adlerbussard (*Buteo rufinus*) - Irrgast, 1 Nachweis.
59. Sperber (*Accipiter nisus*) - s. Br., Dz. und Wi.
60. Habicht (*Accipiter gentilis*) - (Br.) und Gast.
61. Rotmilan (*Milvus milvus*) - (Dz.).
62. Schwarzmilan (*Milvus migrans*) - Dz.
63. Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) - Wd. alljährlich 1-3 Ex.
64. Wespenbussard (*Pernis apivorus*) - (Br.) und Dz.
65. Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) - Dz.
66. Kornweihe (*Circus cyaneus*) - (Dz.).
- × 67. Steppenweihe (*Circus macrourus*) - Irrgast, 1 Nachweis.
68. Wiesenweihe (*Circus pygargus*) - s. Dz.
- × 69. Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) - Irrgast, 1 Nachweis.
70. Fischadler (*Pandion haliaetus*) - Dz.
71. Baumfalke (*Falco subbuteo*) - Dz., (Br.?).
72. Wanderfalke (*Falco peregrinus*) - s. Gast.
- × 73. Würgfalke (*Falco cherrug*) - s. Dz. (1 Brutnachweis bei Simbach?).
74. Merlin (*Falco columbarius*) - s. Wi.
75. Rotfußfalke (*Falco vespertinus*) - (Dz.).
76. Turmfalke (*Falco tinnunculus*) - Br.
77. Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*) - gelegentlicher Gast. (+).
78. Auerhuhn (*Tetrao unogallus*) - (+).
79. Haselhuhn (*Tetrastes bonasio*) - (+).
80. Rebhuhn (*Perdix perdix*) - h. Br.
81. Wachtel (*Coturnix coturnix*) - (Br.).

82. Jagdfasan (*Phasianus colchicus*) - h. Br.
83. Kranich (*Grus grus*) - (Dz.).
84. Wasserralle (*Rallus aquaticus*) - h. Br.
85. Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) - Br. Dz.
86. Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*) - ss.
87. Kl. Sumpfhuhn (*Porzana parva*) + Brutvogel in den Auen?
88. Wachtelkönig (*Crex crex*) - Br.? (+)?, Dz.
89. Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) - Br.
90. Bläshuhn (*Fulica atra*) - h. Br., bis 20.000 Ex. im Herbst.
91. Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) - s. Dz.
92. Kiebitz (*Vanellus vanellus*) - h. Br., h. Dz. (8.000 Ex.).
93. Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) - Dz.
94. Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*) - (Br.), Dz.
95. Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*) - ss. Dz.
96. Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*) - Dz.
97. Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) - h. Dz.
98. Steinwälzer (*Arenaria interpres*) - (Dz.).
99. Bekassine (*Capella gallinago*) - Dz.
100. Doppelschnepfe (*Capella media*) - (Dz.).
101. Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) - s. Dz. Wi.
102. Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) - (Dz.).
103. Großer Brachvogel (*Numenius arquata*) - h. Dz. (Br.).
104. Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) - s. Dz.
105. Uferschnepfe (*Limosa limosa*) - Dz.
106. Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*) - s. Dz.
107. Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) - Dz.
108. Rotschenkel (*Tringa totanus*) - (Br. +) Dz.
109. Grünschenkel (*Tringa nebularia*) - Dz.
110. Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) - Dz.
111. Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) - Dz.
112. Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*) - (Dz.).
113. Flußuferläufer (*Tringa hypoleuca*) - Dz., (Br.?).
114. Knutt (*Calidris canutus*) - Dz.
115. Zwergstrandläufer (*Calidris minutus*) - Dz.
116. Temminckstrandläufer (*Calidris temmincki*) - Dz.
117. Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) - Irrgast.
118. Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) - h. Dz.
119. Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) - Dz.
120. Sanderling (*Calidris alba*) - s. Dz.

121. Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*) - (Dz.).
122. Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) - h. Dz.
123. Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) - (Dz.).
124. Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) - (Br.) Dz.
125. Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*) - ss. Dz.
126. Triel (*Burhinus oedicnemus*) - (+) Irrgast.
127. Brachschnalbe (*Glareola pratincola*) - ss. Dz.
- x 128. Schwarzflügel-Brachschnalbe (*Glareola nordmanni*) - Irrgast, 2 Nachweise.
129. Skua (*Stercorarius skua*) - Irrgast, 1 Nachweis.
130. Spatelraubmöwe (*Stercorarius pomarinus*) - s. Dz.
131. Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*) - Dz.
132. Mantelmöwe (*Larus marinus*) - s. Wi.
133. Heringsmöwe (*Larus fuscus*) - Dz.
134. Silbermöwe (*Larus argentatus*) - Dz.
- x 135. Eismöwe (*Larus hyperboreus*) - Irrgast, Nachweis im Museum Passau.
136. Sturmmöwe (*Larus canus*) - Dz., mglw. Brutversuch.
137. Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) - ss. Dz.
138. Lachmöwe (*Larus ridibundus*) - Br., sehr häufiger Dz. (30.000 Ex.).
- x 139. Dünnschnabelmöwe (*Larus genei*) - Irrgast, 1 Nachweis?
140. Zwergmöwe (*Larus minutus*) - Dz.
141. Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) - s. Wi.
142. Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) - h. Dz.
143. Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) - Dz.
144. Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) - ss. Dz.
145. Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*) - ss. Dz.
146. Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) - Dz., max. 12 Ex.
147. Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) - Br. Dz.
148. Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) - s. Dz.
149. Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) - Irrgast, 1 Nachweis.
150. Hohлтаube (*Columba oenas*) - (Br.) Dz.
151. Ringeltaube (*Columba palumbus*) - Br., h. Dz.
152. Turteltaube (*Streptopelia turtur*) - Br.
153. Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) - Br.
154. Kuckuck (*Cuculus canorus*) - h. Br.
155. Schleiereule (*Tyto alba*) - (Br.).
- x 156. Zwergohreule (*Otus scops*) - (+).

157. Uhu (*Bubo bubo*) - (+).
158. Steinkauz (*Athene noctua*) - s. Br.
159. Waldkauz (*Strix aluco*) - h. Br.
160. Waldohreule (*Asio otus*) - Br.
161. Sumpfohreule (*Asio flammeus*) - Dz. (+).
162. Rauhußkauz (*Aegolius funereus*) - (+) noch Br.?
163. Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) - ss.
164. Mauersegler (*Apus apus*) - h. Br.
165. Eisvogel (*Alcedo atthis*) - s. Br., Dz.
166. Blauracke (*Coracias garrulus*) - s. Dz.
167. Wiedehopf (*Upupa epops*) - Dz. (+).
168. Grünspecht (*Picus viridis*) - Br.
169. Grauspecht (*Picus canus*) - Br.
170. Schwarzspecht (*Dryocopus martius*) - Br.
171. Buntspecht (*Dendrocopus major*) - Br.
172. Mittelspecht (*Dendrocopus medius*) - ss. Br./Dz.
173. Zwergspecht (*Dendrocopus minor*) - Br.
174. Wendehals (*Jynx torquilla*) - Br. Dz.
175. Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) - s. Wi.
176. Feldlerche (*Alauda arvensis*) - h. Br.
177. Heidelerche (*Lullula arborea*) - s. Dz.
178. Haubenlerche (*Galerida cristata*) - Br.
179. Uferschwalbe (*Riparia riparia*) - Br. Dz.
180. Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) - h. Br.
181. Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) - h. Br.
182. Schafstelze (*Motacilla flava*) - Br. Dz.
183. Gebirgstelze (*Motacilla cinerea*) - s. Br.
184. Bachstelze (*Motacilla alba*) - h. Br., Dz.
185. Brachpieper (*Anthus campestris*) - ss. Dz.
186. Baumpieper (*Anthus trivialis*) - h. Br.
187. Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) - Dz.
188. Wasserpieper (*Anthus spinoletta*) - Wi.
189. Rotkehlpieper (*Anthus ervinus*) - s. Dz.
190. Neuntöter (*Lanius collurio*) - Br.
191. Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*) - Dz.
192. Rotkopfwürger (*Lanius senator*) - s. Br.
193. Raubwürger (*Lanius excubitor*) - Dz. und Wi. (+).
194. Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) - Invasionsvogel.
195. Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) - s. Br.

196. Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) - h. Br.
197. Heckenbraunelle (*Prunella modularis*) - s. Br.
198. Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) - s. Br., Dz.
199. Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) - h. Br.
200. Feläschwirl (*Locustella naevia*) - h. Br.
201. Mariskensänger (*Acrocephalus melanopogon*) - Irrgast.
202. Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) - s. Br., Dz.
203. Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*) - s. Dz.
204. Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) - h. Br.
205. Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) - h. Br.
206. Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) - Br.
207. Gelbspötter (*Hippolais icterina*) - Br.
208. Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) - h. Br.
209. Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) - h. Br.
210. Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) - h. Br.
211. Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) - Br. Dz.
212. Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) - ss. Dz.
213. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) - sehr h. Br.
214. Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) - sehr h. Br.
215. Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) - s. Dz.
216. Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) - Br.
217. Grüner Laubsänger (*Phylloscopus trochiloides*) - Irrgast,
1 Nachweis.
218. Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*) - Br.
219. Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*) - Br.
220. Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) - Br.
221. Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) - Dz.
222. Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*) - s. Dz.
223. Schwarzekehler (*Saxicola torquata*) - s. Dz.
224. Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) - Dz. (+).
225. Gartensrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) - Br.
226. Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) - h. Br.
227. Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) - s. Dz. (+).
228. Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) - h. Br. Dz.
229. Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) - sehr h. Br.
230. Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) - Dz.
231. Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) - Br.
232. Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) - h. Br. Dz.
233. Singdrossel (*Turdus philomelos*) - h. Br.

234. Rotdrossel (*Turdus iliacus*) - Dz.
 235. Amsel (*Turdus merula*) - sehr h. Br.
 × 236. Bartmeise (*Panurus biarmicus*) - ss. Dz.
 237. Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*) - Br.
 238. Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) - Br.
 239. Haubenmeise (*Parus cristatus*) - h. Br.
 240. Sumpfmeise (*Parus palustris*) - h. Br.
 241. Weidenmeise (*Parus montanus*) - Br.
 242. Blaumeise (*Parus caeruleus*) - sehr h. Br.
 243. Kohlmeise (*Parus major*) - sehr h. Br.
 244. Tannenmeise (*Parus ater*) - h. Br.
 245. Kleiber (*Sitta europaea*) - h. Br.
 246. Mauerläufer (*Tichodroma muraria*) - ss. Wi. (Burghausen).
 247. Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*) - h. Br.
 248. Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*) - h. Br.
 249. Grauammer (*Emberiza calandra*) - Br.
 250. Goldammer (*Emberiza citrinella*) - sehr h. Br.
 × 251. Ortolan (*Emberiza hortulana*) - s. Dz.
 252. Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) - sehr h. Br.
 × 253. Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*) - ss. Wi.
 254. Buchfink (*Fringilla coelebs*) - sehr h. Br.
 255. Bergfink (*Fringilla montifringilla*) - Dz. Wi.
 256. Girlitz (*Serinus serinus*) - Br.
 257. Grünfing (*Carduelis chloris*) - sehr h. Br.
 258. Stieglitz (*Carduelis carduelis*) - h. Br.
 259. Zeisig (*Carduelis spinus*) - Wi.
 260. Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) - s. Wi.
 261. Hänfling (*Carduelis cannabina*) - s. Br. Dz.
 262. Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*) - Invasionsvogel.
 263. Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*) - Br.
 264. Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*) - Dz. Wi. Br.
 265. Haussperling (*Passer domesticus*) - sehr h. Br.
 266. Feldsperling (*Passer montanus*) - sehr h. Br.
 × 267. Rosenstar (*Pastor roseus*) - Irrgast.
 268. Star (*Sturnus vulgaris*) - sehr h. Br., sehr h. Dz. Wi.
 269. Pirol (*Oriolus oriolus*) - h. Br.
 270. Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) - h. Br.
 271. Elster (*Pica pica*) - h. Br.
 272. Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) - (Dz.).

273. Dohle (*Coleus monedula*) - Br., sehr h. Wi.
 274. Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) - sehr h. Dz. und Wi.
 275. Rabenkrähe (*Corvus corone*) - h. Br.
 Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) - s. Wi. (auch Mischlinge).

Von diesen 275 nachgewiesenen Arten brüteten insgesamt 141 im Gebiet. Eine Einteilung in Häufigkeitsklassen ergibt folgendes Bild:

I	ausgestorbene Brutvögel:	14	Arten
II	sehr seltene	13	"
III	seltene	15	"
IV	regelmäßige	23	"
V	häufige	46	"
VI	sehr häufige	30	"

Summe : 141 Arten, davon 127 Arten
 ===== seit 1955.

(Abgeschlossen am 1. Juni 1969).

Der Frühjahrszug des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*) 1969

Von JOSEF REICHHOLF, Aigen am Inn

Der Rekord-Frühjahrszug des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*) im April 1968 (REICHHOLF 1968) überbot alles bisher im mitteleuropäischen Binnenland dagewesene. Mit einem Maximum von 9.000 Ex. am 5.4. und einer Mindestmenge von 13.400 Durchzüglern wurde das bisherige bayerische Maximum um rund das Zehnfache überboten. Offenbar fand eine Verlagerung des Zuges aus der Ungarischen Tiefebene an den "Unteren Inn" statt.

Wir waren deshalb sehr gespannt, wie der Durchzug in diesem Jahr ausfallen würde. Das schlechte Aprilwetter machte jedoch die Hoffnungen auf einen ähnlichen Rekorddurchzug zunichte. Trotzdem konnte aber für den langjährigen Schnitt ein ungewöhnlich starker Zug vermerkt werden und das bisherige bayerische Maximum von 1.060 Exemplaren am 13.5.1956 (Ismaninger Speichersee) wurde am 30.4.1969 mit 1.718 Ex. auf der Stauseesandbank des Egglfing-Obernberger Stausees wiederum beträchtlich überboten. Insgesamt verlief der Durchzug in ähnlicher Weise wie im Vorjahr, doch lag das Maximum fast 4 Wochen später. Die Ursache hierfür dürfte im kalten Wetter zu suchen sein.

Das Diagramm auf Seite 112 gibt einen Überblick über den Zugverlauf vom Frühjahr 1969. An 26 Tagen zwischen 22.2. und 1.6. wurden am Schlafplatz "Stauseesandbank" 8.973 Kampfläufer be-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Reichholf Josef

Artikel/Article: [Prodromus einer Avifauna der Stauseen am "Unteren Inn" 103-111](#)