© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

MITT.ZOOL.GES.BRAUNAU	Bd. 5 Nr. 13/16:261-262	Braunau a.I., 5.9.1991	ISSN 0250-3603

33 Sterntaucher (Gavia stellata) am Rottauensee bei Postmünster

Von RUDI TÄNDLER, Hebertsfelden

Am 13. Januar 1991 konnten am Rottauensee bei Postmünster, Landkreis Rottal-Inn (Niederbayern) 33 Sterntaucher beobachtet werden.

Bei naßkalter Witterung mit Temperaturen um 3 Grad Celsius und Regenschauern wollten wir (Rudi TÄNDLER, Christian FUCHS) den aktuellen Wasservogelbestand des Rottauensees zählen. Dazu begaben wir uns gegen 15.30 Uhr auf die befahrbare Dammkrone genau über dem Auslauf des Speichersees. Bei einem flüchtigen Blick über die ca. 60 ha große und bei 390 m NN liegende Wasserfläche fiel ein Trupp sehr eng beieinander liegender Taucher auf. Beim Blick durch das 30 x 80 Spektiv blieb kein Zweifel offen: es handelte sich um Sterntaucher.

Die Färbung war oberseits dunkel, an der Kehle, an den Wangen und am Hals hell. Deutlich konnte auch der "aufgeworfene Schnabel" erkannt werden. Nachträgliche Prüfung durch Literaturangaben bestätigten die Artbestimmung.

Bemerkenswert erschien mir das Jagdverhalten der Sterntaucher. Relativ eng beisammen schwimmend patroullierte der Pulk über den See. Eine gewisse Leitrolle übernahmen dabei die vorderen Vögel, die in einer Art Spitze aus dem birnenförmigen Trupp ragten. Auffallend war, daß Wegtauchende stets im Pulk bzw. nur knapp außerhalb wieder auftauchten.

Die Kopfhaltung vor dem Abtauchen war ähnlich wie beim Kormoran etwas nach oben ausgerichtet. Während der Jagdpausen bewegten sich die Sterntaucher gleichmäßig und zielgerichtet vorwärts. Während der "Ruhepausen" erschienen die Vögel mehr aus dem Wasser zu ragen, schwammen ansonsten ähnlich zügig. Immer wieder stellten sie den Körper auf und schlugen kurz mit den Flügeln. Die helle Unterseite wurde dabei sichtbar.

Während der einstündigen Beobachtungszeit konnte nie bemerkt werden, daß nach dem Auftauchen Fische verschluckt wurden. Die kürzeste Beobachtungsentfernung von der ca.

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

acht Meter über dem Wasserspiegel aufragenden Wehranlage betrug zwischen 100 und 150 m. Gegen 16.40 flogen 12 Exemplare auf und strichen wenige Meter hoch über die Dammkrone in südöstlicher Richtung ab. Zu dieser Zeit waren die Sichtverhältnisse bereits ziemlich schlecht.

Nach mehreren Zähldurchgängen konnte eine Gesamtzahl von 33 Sterntauchern festgehalten werden. Dies ist eine außergewöhnlich große Menge für bayerische Verhältnisse.

WÜST (1982: 51-53) schreibt von meist einzelnen Exemplaren bzw. kleinen Gruppen, die bisher in Bayern gesichtet worden seien. Auch BEZZEL (1985: 11-13) nennt nur geringe Zahlen für das Binnenland.

Weiter ist anzumerken, daß nach WÜST (1982) die Hauptaufenthaltszeit in die Monate November und Dezember fällt und die Dekadensumme der Exemplare aus 20jährigen Beobachtungen bei nur 26 Sterntauchern liegt. Im Januar stellten weniger als zehn Vögel die höchste Dekadensumme der 20jährigen Beobachtungsreihe dar.

Nach der o.g. Literatur handelt es sich bei dieser Beobachtung zeitlich wie auch von der Anzahl her um eine weit von den bisherigen Befunden abweichende Menge. Die neue Rekordzahl unterstreicht, daß mit dem Anfang der 70er Jahre als Hochwasserschutz für das mittlere Rottal errichteten Rottauenseen ein Gewässer geschaffen worden ist, das in Verbindung mit den Stauseen des unteren Inn einen ausgezeichneten Rastplatz für durchziehende und überwinternde Wasservögel darstellt. So stellt der Rottauensee gewissermaßen einen "Trittstein" zwischen den Überwinterungszentren am unteren Inn (Luftlinie Rottauensee - Ering am Inn: ca. 44 km) dar.

Bei einer weiteren Kontrolle am 14. Januar 1991 gegen 16.00 Uhr konnten die Sterntaucher nicht mehr gesichtet werden.

Literatur

BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas; Nonpasseriformes. - Aula Verlag, Wiesbaden.

WÜST, W. (1982): Avifauna Bavariae, Band I. 2. Auflage München.

Rudi Tändler, D-W-8333 Hebertsfelden, Sterfl 32 1/2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Tändler Rudi

Artikel/Article: 33 Sterntaucher (Gavia stellata) am Rottauensee bei Postmünster 261-262