© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

MITT. ZOOL. GES. BRAUNAU	Bd. 9, Nr.5: 351 - 357	Braunau a. I., Dezember 2009	ISSN 0250-3603

Exkursion der ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT BRAUNAU nach Ostthüringen vom 30. April bis 4. Mai 2008

Artenliste Vögel von FRANZ SEGIETH

Artenliste der festgestellten Mollusken von BIRGIT, PAUL und WALTRAUD SCHNELL

Ostthüringen gehört nicht zu den bekanntesten und bei Ornithologen bevorzugten Reisezielen. Die zahlreichen Teichgebiete eignen jedoch sich ausgezeichnet für Vogelbeobachtungen. Der Besuch eines der ältesten Naturschutzgebiete in Deutschland, das Leutratal, ist für botanische und geologische Beobachtungen ein Muss, wenn man in dieser Gegend ist.

30. April: Anreise nach Reichenbach im Vogtland. Am Nachmittag gab es mit unseren Führer Hartmut Lange bereits den ersten Ausflug zur größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Die Göltzschtal Brücke ist 574 m lang, 78 m hoch, die Spannweite des größten Bogens beträgt 30,90 m. Sie wurde mit 26 Millionen Ziegelsteinen errichtet. Am Abend zur Einstimmung für unsere Exkursionen in den nächsten Tagen hielt Herr Lange einen Lichtbildervortrag über die ornithologischen und botanischen Sehenswürdigkeiten Ostthüringens. Nach dem Abendessen sind wir noch gemütlich beisammen gesessen und Herr Lange gab uns viele interessante Informationen über die Tierwelt dieses Gebietes.

1. Mai: Exkursion in das Plothen - Drebaer Teichgebiet im Saale-Orla-Kreis, ein landschaftliches Kleinod in Ostthüringen. Zahlreiche Teiche mit bis zu 28 ha Größe prägen die Landschaft. Dabei handelt es sich um künstlich angelegte, ablassbare Teiche. Von den ursprünglich 2000 Teichen sind heute nur noch 500 vorhanden, die einen idealen Lebensraum für Wasser- und Greifvögel bilden. In der äußeren Abgrenzung nimmt diese Teichlandschaft eine Fläche von 80 km² ein.

2. Mai: Das größte Orchideenparadies von Mitteldeutschlands liegt in Thüringen im 118 Hektar großen NSG Leutratal. Bereits 1937 wurde das Gebiet, das sich auf einer Länge von fünf Kilometer entlang von Muschelkalkhängen erstreckt, unter Schutz gestellt. Von den 60 in Deutschland heimischen Orchideenarten wachsen hier auf dem Muschelkalk 27 Arten. Selbstverständlich wären noch andere Kostbarkeiten der Flora und Fauna zu erwarten gewesen, aber unser knappe Zeit ließ die suche danach nicht zu. Die Führung im Leutratal haben botanisch versierte Fachleute vom dort ansässigen NABU übernommen. Für dieses

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Gebiet war festes Schuhwerk von großem Vorteil.

3. Mai Exkursion in die Teichlandschaft im Kreis Altenburger Land zum Speicher Windischleuba und Speicher Schömberg. Bei unserer Ankunft waren diese Teiche abgelassen und große Schlickflächen lagen frei. Auf diesen Flächen waren seltene Limikolen zu beobachten, die hier nach Nahrung suchten.

4. Mai: Heimreise: Wir lagen gut in der Zeit. So besuchten wir das berühmte Benediktiner Kloster Weltenburg. Um 1050 gegründet; dürfte es die älteste Klosterbrauerei der Welt sein. Das Kloster liegt oberhalb des Donaudurchbruchs in einer Donauschlinge. Die Abtei gehört der Bayrischen Benediktiner Kongregation. Einen Ausflug zu den Steilhängen der Donau zu einem bekannten Wanderfalken Brutplatz erbrachte leider nicht die erwartete Beobachtung.

Beobachtete Vogelarten:

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)
Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)
Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)
Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
Seidenreiher (*Egretta garzetta*)
Silberreiher (*Egretta alba*)
Graureiher (*Ardea cinerea*)
Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
Höckerschwan (*Cygnus olor*)
Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)
Brautente (*Aix sponsa*)
Stockente (*Anas platyrhynchos*)
Schnatterente (*Anas strepera*)
Löffelente (*Anas clypeata*)
Pfeifente (*Anas penelope*)
Knäkente (*Anas querquedula*)
Tafelente (*Aythya ferina*)
Reiherente (*Aythya fuligula*)
Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
Fischadler (*Pandion haliaetus*)
Rotmilan (*Milvus milvus*)
Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
Mäusebussard (*Buteo buteo*)
Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
Sperber (*Accipiter nisus*)
Turmfalke (*Falco tinnunculus*)
Baumfalke (*Falco subbuteo*)
Fasan (*Phasianus colchicus*)
Wasserralle (*Rallus aquaticus*)
Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)
Bläßhuhn (*Fulica atra*)
Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)
Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)
Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)
Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)
Grünschenkel (*Tringa nebularia*)
Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*)
Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
Lachmöwe (*Larus ridibundus*)
Sturmmöwe (*Larus canus*)
Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)
Silbermöwe (*Larus argentatus*)
Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)
Zwergmöwe (*Larus minutus*)
Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
Hohltaube (*Columba oenas*)
Ringeltaube (*Columba palumbus*)
Straßentaube (*Columba livia f. domestica*)
Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)
Kuckuck (*Cuculus canorus*)
Waldkauz (*Strix aluco*)
Mauersegler (*Apus apus*)
Eisvogel (*Alcedo atthis*)
Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
Grünspecht (*Picus viridis*)
Grauspecht (*Picus canus*)
Buntspecht (*Dendrocopos major*)

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Wendehals (*Jynx torquilla*)
Feldlerche (*Alauda arvensis*)
Uferschwalbe (*Riparia riparia*)
Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)
Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)
Baumpieper (*Anthus trivialis*)
Bachstelze (*Motacilla alba*)
Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)
Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)
Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)
Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)
Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)
Rotkelchen (*Erithacus rubecula*)
Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)
Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)
Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)
Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
Singdrossel (*Turdus philomelos*)
Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)
Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)
Amsel (*Turdus merula*)
Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)
Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)
Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)
Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)
Feldschwirl (*Locustella naevia*)
Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)
Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)
Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
Fitis (*Phylloscopus trochilus*)
Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)
Zipzalp (*Phylloscopus collybita*)
Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)
Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)
Kohlmeise (*Parus major*)
Tannenmeise (*Parus ater*)
Blaumeise (*Parus caeruleus*)
Weidenmeise (*Parus montanus*)
Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)
Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
Kleiber (*Sitta europaea*)
Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)
Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*)
Elster (*Pica pica*)
Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)
Dohle (*Corvus monedula*)
Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)
Rabenkrähe (*Corvus (corone) corone*)
Kolkrabe (*Corvus corax*)
Star (*Sturnus vulgaris*)
Pirol (*Oriolus oriolus*)
Haussperling (*Passer domesticus*)
Feldsperling (*Passer montanus*)
Buchfink (*Fringilla coelebs*)
Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)
Stieglitz (*Carduelis carduelis*)
Grünfink (*Carduelis chloris*)
Girlitz (*Serinus serinus*)
Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)
Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*)
Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)
Goldammer (*Emberiza citrinella*)

Herzlichen Dank an die fleißigen Beobachter/innen, die während den Exkursionen die Daten gemeldet haben. Besonders möchte ich mich bei Frau Gerda Staszkiewicz bedanken, die die beobachteten Vogelarten aufgelistet und die Notizen zur Verfügung gestellt hat.

Verfasser:

Franz Segieth
D-94148 Kirchham, Obere Bachstraße 14a
Tel. 08533/7716 E-Mail Franz.Segieth@t-online.de

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Artenliste der festgestellten Mollusken

von BIRGIT, PAUL und WALTRAUD SCHNELL

Fundorte

A: Saale-Orla-Kreis, NSG Teichgebiet Dreba-Plothen, 1. 5. 2008
B: Leutra südlich Jena, NSG Leutratal, 2. 5. 2008
C: Leutra, Quelle im NSG Leutratal, 2. 5. 2008
D: Leutra, Hang zwischen Autobahn A4 und Friedhof der Wehrkirche St. Nikolaus sowie NABU-Garten, 2. 5. 2008
E: Leutra, Friedhofsmauer der Wehrkirche St.Nikolaus, unter Efeu, 2.5.2008
F: Leutra, linkes Leutraufer, unter Holz, 2. 5. 2008
G: NSG Frießnitzer See westlich Weida, 2. 5. 2008
H: Kreis Altenburger Land, Speicher Schömberg, 3. 5. 2008
I: Sachsen, Reichenbach im Vogtland, Gelände des Hotels Meister Bär, 3. 5. 2008

Für freundliche Hilfe bei der Mollusken-suche danken wir verschiedenen Exkursi-onsteilnehmern, insbesondere den Herren Agr.-Ing. KARL-ANDREAS NITSCHE, RUDI TÄNDLER und Dr. ALBERT ULBIG, sowie dem NABU-Team vor Ort. Es wurden insge-samt 53 Arten beobachtet, die meisten bei Leutra.

Artenliste

Klasse Gastropoda, Schnecken
Unterklasse Prosobranchia, Vorderkiemerschnecken

Familie Hydrobiidae, Zwergdeckelschnecken
Potamopyrgus antipodarum (J.E.GRAY), Neuseeländische Zwergdeckelschnecke: C, D
Familie Valvatidae, Federkiemenschnecken
Valvata cristata O.F.MÜLLER, Flache Federkiemenschnecke: G

Unterklasse Pulmonata, Lungenschnecken
Ordnung Basommatophora, Süßwasserlungenschnecken

Familie Lymnaeidae, Sumpf- und Schlammschnecken
Lymnaea stagnalis (LINNÉ), Spitzhornschnecke: A, I
Galba truncatula (O.F.MÜLLER), Leberegelschnecke: C
Radix balthica (LINNÉ), Eiförmige Schlammschnecke: D
Stagnicola palustris (O.F.MÜLLER)-Komplex, Gewöhnliche Sumpfschnecke: A

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Familie Planorbidae, Tellerschnecken
Planorbis planorbis (LINNÉ), Gewöhnliche Tellerschnecke: A
Planorbarius corneus (LINNÉ), Posthornschnecke: A, G
Segmentina nitida (O.F.MÜLLER), Glänzende Tellerschnecke: A
Familie Ellobiidae, Zwerghornschnecken
Carychium minimum O.F.MÜLLER, Bauchige Zwerghornschnecke: G

Ordnung Stylommatophora, Landlungenschnecken

Familie Succineidae, Bernsteinschnecken
Succinea putris (LINNÉ), Gewöhnliche Bernsteinschnecke, oder *Oxyloma* sp.iuv.: A, G
Familie Cochlicopidae, Glattschnecken
Cochlicopa lubrica (O.F.MÜLLER)-Komplex, Gewöhnliche Glattschnecke: D, G
Familie Valloniidae, Grasschnecken
Vallonia costata (O.F.MÜLLER), Gerippte Grasschnecke: D
Vallonia pulchella (O.F.MÜLLER), Glatte Grasschnecke: D
Acanthinula aculeata (O.F.MÜLLER), Stachelschnecke: B
Familie Pupillidae, Puppenschnecken
Pupilla muscorum (LINNÉ), Moospuppenschnecke: D
Familie Chondrinidae, Kornschnecken
Granaria frumentum (DRAPARNAUD), Wulstige Kornschnecke: B
Familie Vertiginidae, Windelschnecken
Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD), Sumpfwindelschnecke: G
Truncatellina cylindrica (A.FÉRUSSAC), Zylinderwindelschnecke: D
Familie Enidae, Turmschnecken
Merdigera obscura (O.F.MÜLLER), Kleine Turmschnecke: D
Zebrina detrita (O.F.MÜLLER), Weiße Turmschnecke [Märzenschnecke]: B
Familie Clausiliidae, Schließmundschnecken
Clausilia rugosa parvula (A.FÉRUSSAC), Kleine Schließmundschnecke: E
Balea (Alinda) biplicata (MONTAGU), Gewöhnliche Schließmundschnecke: F
Cochlodina laminata (MONTAGU), Glatte Schließmundschnecke: B, F
Macrogastra ventricosa (DRAPARNAUD), Bauchige Schließmundschnecke: F
Familie Ferussaciidae, Bodenschnecken
Cecilioides acicula (O.F.MÜLLER), Blindschnecke [Nadelschnecke]: D
Familie Discidae, Schüsselschnecken
Discus rotundatus (O.F.MÜLLER), Gefleckte Schüsselschnecke: A, D, G, I
Familie Euconulidae, Kegelchen
Euconulus fulvus (O.F.MÜLLER), Helles Kegelchen: B
Familie Gastrodontidae, Dolchschnecken
Zonitoides nitidus (O.F.MÜLLER), Glänzende Dolchschnecke: G
Familie Oxychilidae, Glanzschnecken
Oxychilus cellarius (O.F.MÜLLER), Kellerglanzschnecke: A
Oxychilus draparnaudi (H.BECK), Große Glanzschnecke: D
Aegopinella minor (STABILE), Wärmeliebende Glanzschnecke: B
Aegopinella nitens (MICHAUD), Weitmündige Glanzschnecke: D
Aegopinella nitidula (DRAPARNAUD), Rötliche Glanzschnecke: A
Familie Vitrinidae, Glasschnecken

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Vitrina pellucida (O.F.MÜLLER), Kugelige Glasschnecke: B
Familie Limacidae, Schnegel
Limax cinereoniger WOLF, Schwarzer Schnegel: B
Limax maximus LINNÉ, Großer Schnegel [Tigerschnegel]: G
Familie Agriolimacidae, Kleinschnegel
Deroceras laeve (O.F.MÜLLER), Wasserschnegel: G
Deroceras reticulatum (O.F.MÜLLER), Genetzte Ackerschnecke: A
Familie Arionidae, Wegschnecken
Arion (Arion) rufus (LINNÉ), Rote Wegschnecke: A
Arion (Arion) sp.iuv.: G, I
Arion (Kobeltia) distinctus J.MABILLE, Gewöhnliche Wegschnecke: A, I
Arion (Mesarion) fuscus (O.F.MÜLLER), Braune Wegschnecke: G
Familie Bradybaenidae, Strauchschnecken
Fruticicola fruticum (O.F.MÜLLER), Genabelte Strauchschnecke: B
Familie Helicodontidae, Riemenschnecken
Helicodonta obvoluta (O.F.MÜLLER), Riemenschnecke: B
Familie Hygromiidae, Laubschnecken
Euomphalia strigella (DRAPARNAUD), Große Laubschnecke: B
Helicella itala (LINNÉ), Gewöhnliche Heideschnecke: B
Monachoides incarnatus (O.F.MÜLLER), Rötlichgelippte Laubschnecke: B, D, F
Trochulus hispidus (LINNÉ), Gewöhnliche Haarschnecke: A, D, F, G
Familie Helicidae, Schnirkelschnecken
Helix pomatia LINNÉ, Weinbergschnecke: B, D, G, I
Arianta arbustorum (LINNÉ), Gefleckte Schnirkelschnecke: A, D, F
Cepaea hortensis (O.F.MÜLLER), Weißmündige Bänderschnecke: A, B, I
Cepaea nemoralis (LINNÉ), Schwarzmündige Bänderschnecke: A, B, D, G, I
Helicigona lapicida (LINNÉ), Steinpicker: E

Klasse Bivalvia, Muscheln
Unterklasse Eulamellibranchiata

Familie Unionidae, Fluß- und Teichmuscheln [Najaden]
Anodonta anatina (LINNÉ), Gewöhnliche Teichmuschel [Entenmuschel]: H

Literatur

FALKNER, G., BANK, R.A. & PROSCHWITZ, T. VON (2001): Check-list of the non-marine Molluscan Species-group taxa of the States of Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOMI) -- Heldia 4/1-2, S.1-76, München

FECHTER, R. & FALKNER, G. (1990): Weichtiere - Europäische Meeres- und Binnenmollusken. 287 S. -- Mosaik-Verlag, München

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

GLÖER, P.& MEIER-BROOK, C.(1994): Süßwassermollusken - Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland -- Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg,11.erweiterte Aufl., 136 S.

JUNGBLUTH, J.H.& KNORRE, D. von (2008): Trivialnamen der Land- und Süßwassermollusken Deutschlands (Gastropoda et Bivalvia) -- Mollusca 26 (1)

KERNEY, M.P., CAMERON, R.A.D.& JUNGBLUTH, J.H.(1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas - Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. 384 S. -- Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin

Verfasser:

Birgit, Paul und Waltraud Schnell
Leipziger Str.20
D-50170 Kerpen-Buir

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Segieth Franz, Schnell Waltraud, Schnell Paul

Artikel/Article: Exkursion der ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT BRAUNAU nach Ostthüringen vom 30. April bis 4. Mai 2008. 351-357