

# BURGENLÄNDISCHE HEIMATBLÄTTER

Herausgegeben vom Volkswbildungswerk für das Burgenland  
in Verbindung mit dem Landesarchiv und Landesmuseum

25. Jahrgang

Eisenstadt 1963

Heft Nr. 1

## Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee

6. Ergänzung zum gleichnamigen Buch von Karl Pill.

Von Gottfried Traxler, Eisenstadt

Wenn in der nachfolgenden Zusammenstellung unter anderen mehrere Pflanzen angeführt sind, die entweder für Burgenland überhaupt oder für Nord-Burgenland als neu zu bezeichnen sind, so mag dies wieder als Beweis gelten, einerseits daß die Pflanzenwelt der göttgesegneten Landschaft des nördlichen Burgenlandes einen außerordentlichen Artenreichtum aufweist, andererseits daß für eine intensive botanische Forschung im Burgenland angesichts offensichtlicher Unterlassungen der Vergangenheit noch manches lohnende Ziel vorhanden ist und noch manche Überraschung erwartet werden kann. Ich muß aber auch darauf hinweisen, daß das günstige Ergebnis des Jahres 1962 zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Helmut Melzer, Judenburg, zurückzuführen ist. Bei gemeinsam unternommenen Exkursionen kam seiner Führung und seiner Sachkunde das Hauptgewicht zu. Darüber hinaus haben mir seine wertvollen Mitteilungen und Anregungen weitere, hier verzeichnete Pflanzenfunde ermöglicht. Ich spreche ihm hiemit an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus.

Abkürzung: WF = Weitere(r) Fund(e).

### LITERATUR

Janchen Erwin, *Catalogus florae Austriae*, I. Teil, Ergänzungsheft, Wien 1963.

Melzer Helmut, *Camelina rumelica* Vel., der Rumelische Leindotter, — neu für das Burgenland, Burgenländische Heimatblätter. 24, 1962, 92—93.

### Angiospermae, Decksamer Dicotyledones, Zweikeimblättrler Apetalae, Fehlkroner

*Betulaceae. Birkengewächse.*

*Alnus, Erle.*

*A. viridis* (Chaix) DC., Grün-E. IV, V. Hang des Heuberges zum Gaisgraben bei Neustift a. d. R.

*A. incana* (L.) Moench, Grau-E. II, III. WF.: Auwald bei Zurndorf.

Oberösterreichisches  
Landesmuseum Linz/D.  
Bücherei

Inv. Nr. 396/1963

*Fagaceae, Buchengewächse.*

*Quercus rubra* L., Rot-Eiche. V. WF.: Im Ödenburgergebirge beim Herrentisch eingestreut, im Rosaliengebirge in der Wintergstetten bei Siegraben.

*Salicaceae, Weidengewächse.*

*Populus alba* L., Silber-Pappel, Weiß-P. III, IV. WF.: Bei den „Bründeln“ bei Purbach, Seegebiet bei Neusiedl, Auwald bei Zurndorf.

*Salix, Weide.*

*S. pentandra* L., Lorbeer-W., Leder-W. V, VI. Bei den „Bründeln“ bei Purbach.

*S. viminalis* L., Hanf-W., Korb-W. III, IV. WF.: Sandgrube zwischen Halbturn und Andau.

*S. repens* L., Kriech-W. IV. WF.: „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn, Wasen südlich Andau.

*Ulmaceae, Ulmengewächse.*

*Ulmus, Ulme, Rüster.*

*U. carpinifolia* Gleditsch, Feld-U. III, IV. Auwald bei Zurndorf.

*U. scabra* Mill., Berg-U. III, IV. Ebendort.

*Santalaceae, Sandelgewächse.*

*Thesium, Bergflachs, Vermeinkraut.*

*Th. bavarum* Schrank, Großer B. VI—VIII. WF.: Hangwiese am Fuße des Dachsriegels bei Siegraben.

*Th. Linophyllum* L., Gewöhnlicher B., Mittlerer B. V—VIII. WF.: Wiesen, Baumgarten.

*Th. ramosum* Hayne, Ästiger B. VI—VIII.: WF.: Rand der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Polygonaceae, Knöterichgewächse.*

*Rumex, Ampfer.*

*R. thyrsiflorus* Fingerhuth, Rispen-Sauerampfer. VII—IX. WF.: Wasen südlich Andau; Wiesen zwischen Winter- und Sommergstetten bei Siegraben.

*R. maritimus* L., Strand-A. VII, VIII. WF.: Andau.

*Reynoutria japonica* Houtt. (= *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.), Japanischer Flügelknöterich. VIII, IX. Auf Schutt verwildert bei Zagersdorf und Andau.

*Chenopodiaceae, Gänsefußgewächse.*

*Chenopodium, Gänsefuß.*

*Ch. glaucum* L., Grau-G., Graugrüner G. VII—IX. WF.: Andau.

*Ch. chenopodioides* (L.) Aellen (= *Ch. botryoides* Sm.), Dickblatt-G. VIII, IX. WF.: Tadtén.

*Salsola Kali* L., Kali-Salzkraut. VII—IX. WF.: Sandgrube bei Mönchhof.

*Polycnemum majus* A. Br., Großes Knorpelkraut. VII—X. Sandgrube bei Halbturn.

*Amarantaceae, Fuchsschwanzgewächse.*

*Amarantus, Fuchsschwanz.*

- A. albus* L., Weiß-F. VII—IX. WF.: Mönchhof.  
*A. chlorostachys* Willd., Grünähriger F. VII—X. Auf Schutt in Andau.  
*A. paniculatus* L., Rispen-F. VII—X. WF.: Verwildert bei Neusiedl.

*Portulacaceae, Portulakgewächse.*

- Portulaca oleracea* L., Gewöhnlicher Portulak. VII—X. WF.: Andau.

*Caryophyllaceae, Nelkengewächse.*

- Scleranthus collinus* Hornung, Hügel-Knäuelkraut. V—X. WF.: Hetscherlberg bei St. Georgen, Sandgrube bei Halbturn.

*Dianthus, Nelke.*

- D. deltoides* L., Heide-N. VI—VIII. WF. Trockene Wiesen zwischen Sommer- und Wintergsetten bei Siegraben.

- D. superbus* L., Pracht-N. VII—IX. Auch in Wäldern des Rosaliengebirges bei Siegraben.

*Dianthus-Bastard:*

- D. Armeria* x *D. Pontederac*. Waldrand oberhalb Zagersdorf. Vermutlich Erstlingsfund. Wenn ja, wird Beschreibung und Benennung an anderer Stelle veröffentlicht werden. Die Pflanze habe ich am 22. August 1959 gefunden und bereits in meiner 4. Ergänzung unter *Dianthus Carthusianorum* L. s. l. erwähnt, aber erst jetzt bestimmt.

- Cucubalus baccifer* L., Beeren-Hühnerbiß. VII, VIII. WF.: Auwald bei Zurndorf.

- Silene Otites* (L.) Wibel, Ohrlöffel-Leimkraut. V—VII. WF.: Nickelsdorf; Sauerbrunn.

*Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewächse.*

*Euphorbia, Wolfsmilch.*

- E. pannonica* Host, Sand-W Ungarische W. V—VII. WF.: „Alte Hölzer“ bei Nickelsdorf.

- E. salicifolia* Host, Weiden (blatt)-W. V, VI. WF.: Ebendort.

- E. marginata* Pursh, Weißrand-W., Garten-Edelweiß. VII—IX. Verwildert auf Schutt in Andau, in der Sandgrube bei Mönchhof (mehrfach).

**Dialypetalae, Freikroner**

*Aristolochiaceae, Osterluzeigewächse.*

- Asarum europaeum* L., Europäische Haselwurz. III—V WF.: Königsschüssel bei Siegendorf, Krippelberg bei Baumgarten.

*Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse.*

- Consolida Ajacis* (L.) Schur (= *C. ambigua* (L.) Ball et Heyw., = *Delphinium Ajacis* L.), Garten-Rittersporn. VI—VIII. Verwildert bei der Gänselacke in Andau.

*Thalictrum, Wiesenraute.*

*Th. flavum* L., Gelbe W. VI, VII. WF.: Wasen südlich Andau, Auwald bei Zurndorf.

*Th. lucidum* L., Schmalblatt-W. VI, VII. Auwald bei Zurndorf, „Alte Hölzer“ bei Nickelsdorf.

*Anemone silvestris* L., Steppen-Windröschen. V, VI. WF.: Sauerbrunn.

*Clematis recta* L., Aufrechte Waldrebe. VI, VII. WF.: Auf Holzschlägen bei Donnerskirchen häufig; Pötttschinger Wald.

*Batrachium Petiveri* (Koch) F. Schultz, Steifes Froschkraut. VI—VIII. WF.: Alte Sandgrube zwischen Halbtorn und Andau.

*Ranunculus illyricus* L., Illyrischer Hahnenfuß. V, VI. WF.: Trockenrasen bei Gattendorf und Nickelsdorf.

*Papaveraceae, Mohngewächse.*

*Papaver dubium* L., Schmalkopf-Mohn. V, VI. WF.: Auf der Böschung der Bundesstraße bei Großhöflein häufig, auch weißblühend, ferner bei Zurndorf.

*Cruciferae, Kreuzblütler.*

*Hesperis tristis* L., Trauer-Nachtviole, Trübe N. V, VI. WF.: Auf Trockenrasen zwischen Neudorf b. P. und Gattendorf.

*Barbarea vulgaris* R. Br., Gewöhnliches Barbarakraut. IV—VI. Zahlreiche Pflanzen mit Blüten ohne Kronblätter fand ich auf einem Holzschlag beim Gscheidkreuz bei Eisenstadt.

*Rorippa amphibia* (L.) Bess., Ufer-Sumpfkresse, Schlamm-S., Wasserkresse. V—IX. WF.: Am Leithakanal bei Deutsch-Jahrdorf, Golser Kanal bei Podersdorf.

*Dentaria enneaphyllos* L., Neunblatt-Zahnwurz. III, IV. WF.: Gaisgraben bei Neustift a. d. Ros.

*Arabis hirsuta* (L.) Scop., subsp. *planisiliqua* (Pers.) Thellung, Gerards Gänsekresse. V, VI. Auf Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

*Alyssum Alyssoides* (L.) Nath. (= *A. calycinum* L.), Kelch-Steinkraut. IV—VI. Auf Sandboden bei Neudorf, Gattendorf, Nickelsdorf, Deutsch-Jahrdorf.

*Hornungia petraea* (L.) Rchb., Gewöhnliche Felskresse. IV, V. WF.: Auf dem Zeilerberg sehr reichlich.

*Erucastrum nasturtiiifolium* (Poir.) O. E. Schulz, Stumpfkantige Hundsräuke. VI—Herbst. WF.: Neusiedl, Nickelsdorf.

*Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat, Graue Remppe. V—IX. Feldweg bei St. Georgen a. L.

*Raphanus sativus* L., subsp. *radicula* (Pers.) DC., var. *rotundus* DC., Rundes Radieschen. V, VI. Verwildert an der Kasernenmauer in Eisenstadt.

*Violaceae, Veilchengewächse.*

*Viola, Veilchen.*

*V. stagnina* Kit., Graben-V., Weiher-V. V, VI. WF.: Leithaauen bei Zurndorf, Moorwiesen im Wasen südlich Andau.

*V. elatior* Fr., Hohes V. V, VI. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

- V. pumila* Chaix, Zwerg-V. V, VI. Wiese zwischen Halbturn und Andau.  
*V. montana* L., Berg-V. V, VI. WF.: Oberseewald südlich St. Margarethen.  
*V. Riviniana* Rchb., Hain-V. IV, V. WF.: Siegggrabener Einschnitt.  
*V. Beraudii* Boreau, Hecken-V. III, IV. WF.: Zeilerberg.  
*V. Kitaibeliana* R. et Sch., Steppen-Stiefmütterchen. V—VIII. WF.: Breitenbrunn, Neudorf - Gattendorf, Nickelsdorf.

*Guttiferae, Hartheugewächse.*

*Hypericum, Johanniskraut, Hartheu.*

- H. perforatum* L., Gewöhnliches J. V—VIII. subsp. *veronense* (Schrank) A. Fröhlich. WF.: Wiesen.  
*H. tetrapterum* Fries (= *H. acutum* Moench), Flügel-J. VII, VIII. WF.: Moorwiesen südlich Andau.

*Saxifragaceae, Steinbrechgewächse.*

- Chrysosplenium alternifolium* L., Wechselblatt-Milzkraut. IV—VI. WF.: Loosbach bei Loipersbach, oberer Marzer Bach.  
*Parnassia palustris* L., Sumpf-Studentenröschen. VII—IX. WF.: Neusiedl.

*Rosaceae, Rosengewächse.*

- Filipendula vulgaris* Moench. (= *F. hexapetala* Gilib.), Knollen-Mädesüß. VI, VII. „Haidl“ bei Nickelsdorf.

*Alchemilla, Frauenmantel.*

- A. glabra* Neygenfind s. str., Voralpen-F. V—IX. WF.: Im Siegggrabener Einschnitt am Fuße des Brenntenriegles und Dachsriegels und auf Wiesen zwischen Sommer- und Wintergsetten bei Siegggraben.  
*A. reniformis* Buser (= *A. glaberrima* Opiz), Nierenblatt-F., V—IX. Am Bächlein zwischen Sommer- und Wintergsetten im Rosalien- (nicht Ödenburger-) gebirge.

*Sorbus, Eberesche usw.*

- S. aucuparia* L., Eberesche, Vogelbeerbaum. V, VI. WF.: Als Unterholz im Schwarzföhrenwald bei der Gloriette bei Eisenstadt.  
*S. domestica* L., Speierling, Arschitzenbaum. V WF.: Müllendorf, alter Steinbruch.  
*S. torminalis* (L.) Crantz, Elsbeerbaum, Adlersbeerbaum. V. WF.: Breitenbrunn, Oberseewald südlich St. Margarethen; Baumgarten.

*Papilionaceae, Schmetterlingsblütler.*

- Genista tinctoria* L., Färberginster. VI, VII. Erwähnenswert eine niedrige Form auf den Moorwiesen der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.  
*Lotus corniculatus* L., subsp. *tenuifolius* (L.) Hartm., Salz-Hornklee. V—IX. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.  
*Onobrychis arenaria* (Kit.) Ser., Sand-Esparsette. V—VII. WF.: Kalvarienberg bei Neusiedl.  
*Ononis foetens* All., Stink-Hauhechel. VII, VIII. WF.: Feuchte Wiese bei Sauerbrunn.

*Trifolium, Klee.*

*T. dubium* Sibth., Faden-K. VI—IX. WF.: Weiden.

*T. retusum* Höjer (= *T. parviflorum* Ehrh.), Steifer K., Kleinblütiger K., V, VI. WF.: Halbturn.

*T. striatum* L., Streifen-K. V—VIII. WF.: Halbturn.

*Vicia, Wicke.*

*V. tenuifolia* Roth, Feinblatt-W. VI, VII. WF.: „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn.

*V. grandiflora* Scop., Großblütige W. V—VII. subsp. *sordida* (WK.) Dostál. WF.: Marz - Siegraben.

*V. Lathyroides* L., Zwerg-W. IV—VI. WF.: Wiese beim Vorderen Waldriegel bei Breitenbrunn, Neudorf - Gattendorf; Oberer Dachsgraben.

*V. narbonensis* L., subsp. *serratifolia* (Jacq.) Arcang., Zahnblatt-W., Sägeblatt-W. V, VI. WF. Holzschlag beim Gscheidkreuz bei Eisenstadt, sehr reichlich.

*Lathyrus, Platterbse.*

*L. montanus* Bernh., Berg-P., Berg-Walderbse. IV—VI. WF.: Waldschneise auf dem Mitterriegel.

*L. paluster* L., Sumpf-P VI, VII. WF.: Wasen südlich Andau.

*L. Aphaca* L., Ranken-P. V—VII. WF.: Baumgarten.

*L. silvester* L., Wald-P VII, VIII. WF.: Waldrand neben der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn

*L. latifolius* L. (= *L. megalanthus* Steudel), Flügel-P., Breitblättrige P., Großblütige P. VI—VIII. WF.: Sauerbrunn, Waldrand zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Siegraben, Baumgarten, Schattendorf.

*L. hirsutus* L., Rauhaar-P., Behaarfrüchtige P. VI—VIII. WF.: Holzschlag beim Gscheidkreuz bei Eisenstadt.

*Thymelaeaceae, Seidelbastgewächse.*

*Daphne Mezereum* L., Gewöhnlicher Seidelbast, Kellerhals. III. WF.: Im Rosaliengebirge bei Sauerbrunn.

*Thymelaea Passerina* (L.) Cosson et Germain, Gewöhnlicher Vogelkopf, Sperlingskraut. VII, VIII. WF.: Weiden.

*Onagraceae, Nachtkerzengewächse.*

*Epilobium obscurum* Schreb., Dunkelgrünes Weidenröschen, Dunkel-W. VI—X. Am Bächlein zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Siegraben.

*Malvaceae, Malvengewächse.*

*Althaea officinalis* L., Echter Eibisch, Arznei-E., Gebräuchlicher E. VII, VIII. WF.: Auwald bei Zurndorf.

*Lavatera thuringiaca* L., Thüringer Strauchpappel. VII, VIII. Pöttsching - Sauerbrunn.

*Linaceae, Leingewächse.*

*Linum, Lein.*

*L. austriacum* L., Österreichischer L. V, VI. WF.: Trockenrasen bei Gattendorf, Zurndorf und Nickelsdorf.

*L. flavum* L., Gelber L. VI, VII. WF.: Waldrand neben der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Rutaceae, Rautengewächse.*

*Dictamnus albus* L., Gewöhnliche (Weiße) Spechtwurz, (Weißer) Diptam. V, VI. Waldrand neben der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Polygalaceae, Kreuzblumengewächse.*

*Polygala, Kreuzblume.*

*P. major* Jacq., Große K. V, VI. Rand der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*P. amarella* Crantz, Sumpf-K. V—VII. Wiesen bei Sauerbrunn.

*Aceraceae, Ahorngevächse.*

*Acer, Ahorn.*

*A. tataricum* L., Tatarischer A., Schwarzring-A. V, VI. Im Auwald bei Zurndorf häufig.

*A. campestre* L., Feld-A., Maßholder. V Auwälder bei Zurndorf und Nickelsdorf.

*A. Negundo* L., Eschen-A. IV Auwald bei Zurndorf.

*Umbelliferae, Doldengewächse.*

*Sium latifolium* L., Breitblättriger Merk. VII, VIII. WF. Leithaaunen bei Zurndorf, Wasen südlich Andau.

*Oenanthe fistulosa* L., Röhren-Rebendolde, Tropfwurz. VI—VIII. WF.: Wassergraben bei Schützen nächst der Straße gegen Donnerskirchen.

*Cnidium dubium* (Schkuhr) Thellung (= *C. venosum* Koch), Sumpf-Brenndolde. VII, VIII. Leithaauwald bei Zurndorf.

*Peucedanum, Haarstrang.*

*P. verticillare* (L.) Koch (= *P. altissimum* (Mill.) Thellung, *Angelica verticillaris* L.), Quirl-H., Riesen-H., Tommasinie. VI—VIII. Hänge westlich des Kaltwasserbaches bei Sauerbrunn. Ein ansehnliches, mehr geschlossenes Vorkommen am Wege nach Eichbühel, gleich beim Anstieg vom Kaltwasserbach, sonst zerstreut. Fruchtbare Exemplare sind nicht häufig.

*P. palustre* (L.) Moench, Sumpf-H., Sumpfsilge. VII, VIII. Moorigen südlich Andau.

*P. alsaticum* L., Elsässer-H. VII, VIII. Auwald bei Zurndorf.

*P. Carvifolia* Vill., Kümmel-H., Kümmelblatt-H. VII—IX. Trockene Wiesen und Waldränder im Graben zwischen Sommer- und Wintergsetten bei Siegraben. Im Burgenland wohl der nördlichste Standort dieser im südlichen Landesteil nicht seltenen Pflanze.

*Bifora radians* M. B., Strahlen-Hohlsame. VI, VII. WF.: Klingenbach, Baumgarten.

## Sympetalae, Vereintkroner

### *Plumbaginaceae, Bleiwurzwächse.*

*Limonium sinuatum* (L.) Mill. (= *Statice sinuata* L.), Gebuchtete Sandnelke. VII, VIII. Auf Schutt verwildert bei Neusiedl.

### *Primulaceae, Schlüsselblumengewächse.*

#### *Lysimachia, Felberich, Gilbweiderich.*

*L. punctata* L., Punkt-F. VI, VII. WF.: Zurndorfer Auwald; Baumgarten, Sommerstetten bei Sieggaben.

*L. nemorum* L., Wald-F. V—VIII. WF. Am Bächlein zwischen Sommer- und Winterstetten.

### *Pirolaceae, Wintergrüengewächse.*

#### *Pirola, Wintergrün.*

*P. rotundifolia* L., Großes W., Rundblatt-W. VII—X. Im Ödenburgergebirge beim Herrentisch.

*P. minor* L., Kleines W. VI, VII. WF.: Ebendorf.

*Monotropa Hypopitys* L., subsp. *Hypophegea* (Wallr.) Soó, Kahler Fichtenspargel, Buchenspargel. VI—VIII. Lahmenwald bei Sauerbrunn.

### *Ericaceae, Heidegewächse.*

*Calluna vulgaris* (L.) Hull, Gewöhnliche Besenheide, Herbst-Heidekraut, Gewöhnliches Heidekraut. VII—IX. WF.: Trockene Stellen der Wiese beim Vorderen Waldriegel bei Breitenbrunn.

### *Cuscutaceae, Teufelszwirngewächse.*

*Cuscuta campestris* Yuncker, Nordamerikanische (oder Ungarische) Grobseide des Klees, Große Kleeseide. VII—IX. WF.: St. Andrä.

### *Hydrophyllaceae, Wasserblattgewächse.*

*Phacelia tanacetifolia* Benth., Rainfarn-Büschelschön, Rainfarnblättriges Büschelkraut. V—X. Verwildert zwischen Wulkaprodersdorf und Siegendorf.

### *Boraginaceae, Rauhblattgewächse.*

#### *Lithospermum, Steinsame.*

*L. officinale* L., Echter St., Arznei-St. V, VI. Auwald bei Zurndorf.

*L. purpureo-coeruleum* L., Blauer St. V, VI. WF.: Potzneusiedler Wald, „Alte Hölzer“ bei Nickelsdorf; Pötttschinger Wald.



*Lappula deflexa* (Wahlbg.) Garcke, Wald-Igelsame. VI. Holzschlag beim Gscheidkreuz bei Eisenstadt.

*Pulmonaria angustifolia* L., Schmalblatt-Lungenkraut. IV, V. Waldrand am Fuße des Dachsriegels bei Siegraben.

*Symphytum officinale* L., subsp. *bohemicum* (F W Schmidt) O. Schwarz, Weiße Beinwell. V—VII. WF.: Auwald bei Zurndorf, Klingenbach; Dachgraben.

#### *Scrophulariaceae. Rachenblütler.*

##### *Verbascum, Königskerze.*

*V. phoeniceum* L., Purpur-K. V, VI. „Haidl“ bei Nickelsdorf.

*V. Blattaria* L., Trauben-K., Schaben-K. VI—VIII. Auwald bei Zurndorf.

*V. nigrum* L., Dunkle K. VII, VIII. WF. Andau.

*Antirrhinum Orontium* L., Kleines Löwenmaul, Acker-L. VI—IX. WF.: Baumgarten.

##### *Veronica, Ehrenpreis.*

*V. Teucrium* L., Großer E. VI, VII. WF. Donnerskirchen, Auwald bei Zurndorf, Baumgarten - Schattendorf (Krippelberg).

*V. scardica* Griseb., Balkan-E. VI, VII. Weiden - Podersdorf.

##### *Euphrasia, Augentrost.*

*E. Kernerii* Wettst., Großblütiger A. VII—X. WF.: Neusiedl.

*E. stricta* Wolf ex Lehmann, Heide-A. VII—IX. WF.: Sauerbrunn.

*E. tatarica* Fisch., Tatarischer A. V—IX. Kalvarienberg bei Neusiedl, Trockenwiese südlich Weiden.

*Melampyrum cristatum* L., Kamm-Wachtelweizen. VI, VII. „Alte Hölzer“ bei Nickelsdorf; Waldrand neben der „Kleinen Pusztá“ bei Sauerbrunn.

#### *Orobanchaceae, Sommerwurzgewächse.*

*Orobanche lutea* Baumg. (= *O. rubens* Wallr.), Luzerne-Sommerwurz, Gelbe S. V, VI. Pöttsching - Sauerbrunn.

#### *Labiatae. Lippenblütler.*

*Teucrium Scordium* L., Knoblauch-Gamander, Lauch-G., Lachenknoblauch. VII—IX. WF.: Auwald bei Zurndorf.

*Scutellaria hastifolia* L., Spieß-Helmkraut, Spießblatt-H. VII, VIII. „Söldnerwald“ bei Nickelsdorf, Auwald bei Zurndorf; Graben zwischen Sommer- und Wintergraben bei Siegraben.

*Stachys germanica* L., Deutscher Ziest, Filz-Z. VI—VIII. WF.: Holzschlag bei Loretto, Baumgarten.

##### *Salvia, Salbei.*

*S. glutinosa* L., Kleb-S. VII—IX. WF. Pöttschinger Wald.

*S. austriaca* Jacq., Österreichischer S. V, VI. WF. Zurndorf, Nickelsdorf.

##### Salvia-Bastard:

*S. pratensis* x *S. nemorosa* = *S. silvestris* L. WF.: Donnerskirchen.

*Hyssopus officinalis* L., Gewöhnlicher Ysop, Echter Y. (VII) VIII—X. WF.: Bei der Gänselacke von Andau.

*Origanum vulgare* L., subsp. *prismaticum* Gaudin, Winter-Majoran, Falscher Stauden-Majoran. VIII—X. WF.: An der Leitha bei Leithaprodersdorf; Rand der Wälder um die „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn, Waldrand bei Siegraben.

*Mentha verticillata* L. (= *M. aquatica* x *M. arvensis*), Quirl-Minze, Quirlblütige M. VII—X. „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Gentianaceae, Enziangewächse.*

*Gentiana, Enzian.*

*G. asclepiadea* L., Schwalbenwurz-E. VII—IX. WF.: Sommer- und Winterstetten bei Siegraben.

*G. Pneumonanthe* L., Lungen-E., Sumpf-E. VII—IX. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

*Blackstonia acuminata* (Koch et Ziz) Domin., Später Bitterling, Spätblühender B. VI—IX. Ebendort.

*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce, Kleines Tausendguldenkraut. VII—IX. WF.: Ebendort.

*Oleaceae, Ölbaumgewächse.*

*Fraxinus angustifolia* Vahl, Spitzblatt-Esche, Feld-E. IV, V Auwald bei Zurndorf.

*Rubiaceae, Krappgewächse.*

*Asperula tinctoria* L., Färber-Meier. VI, VII. Baumgarten.

*Galium, Labkraut.*

*G. rotundifolium* L., Rundblatt-L. VI—VIII. Lahmenwald zwischen Pöttsching und Sauerbrunn.

*G. uliginosum* L., Moor-L. V, VI. WF Wasen südlich Andau.

*G. austriacum* Jacq., Österreichisches L. VI—VIII. WF Baumgarten, am Brenntenriegel bei Siegraben, am Fuße des Dachsriegels, zwischen Sommer- und Winterstetten.

*G. pumilum* Murr., Niederes L. VI—VIII. WF Baumgarten, Wiesen, Lahmenwald zwischen Pöttsching und Sauerbrunn.

*Dipsacaceae, Kardengewächse.*

*Succisa pratensis* Moench, Gewöhnlicher Teufelsabbiß. VII—IX. WF Leithaauen bei Zurndorf, Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

*Succisella inflexa* (Kluk) Beck. Südlicher Sumpfabbiß. VII—IX. WF Leithaauen bei Zurndorf.

*Cucurbitaceae, Kürbisgewächse.*

*Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray (= *E. echinata* (Mühl.) Britton, Sterns et Poggenburg), Lappige Igelgurke. VII—IX. An der Wulka unterhalb der Straße Oggau Donnerskirchen.

*Campanulaceae, Glockenblumengewächse.*

*Phyteuma, Teufelskralle.*

*Ph. spicatum* L., Ähren-T. V, VI. WF.: Im Tal zwischen Sommer- und Winterstetten bei Siegraben.

*Ph. orbiculare* L., Rundkopf-T., Kugel-T., Kugel-Rapunzel. V—VIII. WF.: Wiese nordwestlich Stotzing; im Ödenburgergebirge zwischen Grubriegel und Hochkogel sowie am Fuße des Dachsriegels.

*Compositae, Korbbblätter.*

*Hieracium racemosum* WK., Trauben-Habichtskraut. VII, VIII. Im Rosaliengebirge in der Winterstetten bei Siegraben.

*Crepis, Pippau.*

*C. paludosa* (L.) Mönch, Sumpf-P V—VIII. WF.: An Bächen in der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn, im Siegrabener Einschnitt am oberen Marzer Bach.

*C. setosa* Hall. fil., Borsten-P. VI—IX. Halbturn - Andau.

*Sonchus paluster* L., Sumpf-Gänsedistel. VII—IX. Auwald bei Zurndorf.

*Chondrilla juncea* L., Ruten-Knorpellattich, Binsen-K. VII—IX. WF.: Mönchhof.

*Leontodon Leysseri* (Wallroth) Beck (= *Thrinchia hirta* Roth), Leysser's Milchkraut. VII—IX. Wasen südlich Andau unweit des Moorbirkenbestandes. Vereinzelt auch mit ganz hellgelben Blüten.

*Scorzonera purpurea* L., Blaßrote Schwarzwurz. V, VI. WF.: Rand der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Cirsium brachycephalum* Juratzka, Kurzkopf-Distel. VI—IX. WF.: Leithauen bei Zurndorf.

*Centaurea micranthos* Gmel., Kleinkopf-Flockenblume. VII—IX. Hetscherlberg bei St. Georgen.

*Gnaphalium luteo-album* L., Gelbliches Ruhrkraut. VII—Herbst. WF.: Sommer- und Winterstetten bei Siegraben.

*Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. et Hook., Gewöhnliche Perlblume, Perlkörbchen. VII—IX. In einer ansehnlichen Gruppe verwildert in der Winterstetten bei Siegraben. Vermutlich durch Ausflügler verschleppt.

*Bupthalmum salicifolium* L., Gewöhnliches Ochsenauge, Rindsauge. VII, VIII. WF.: Baumgarten.

*Inula ensifolia* L., Schwertblatt-Alant, Schwert-A. VII, VIII. Waldrand neben der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Doronicum Pardalianches* L., Kriech-Gemswurz, Schwindelwurz. V, VI. WF.: Stotzingberg.

*Arnica montana* L., Berg-Wolferlei, Arnika. VI, VII. Bei Siegraben am Fuße des Brenntenriegels und weiter nördlich am Fuße des Dachsriegels.

*Senecio, Greiskraut.*

*S. aurantiacus* (Hoppe) Lessing, Orange-G. VI—VIII. Wiese am Fuße des Dachsriegels.

*S. paludosus* L., Sumpf-G. VII, VIII. Auwald bei Zurndorf.

*Erechthites hieracifolia* (L.) Raf., Amerikanisches Feuerkraut. Aftergreiskraut. VII—IX. WF.: Neustift, Winter- und Sommerstetten bei Siegraben.

*Rudbeckia hirta* L., Rauher Sonnenhut, Rauhhaar-S. VIII—X. WF.: Böschung des Golser Kanals nördlich Podersdorf.

*Cosmos bipinnatus* Cavan., Fliederblatt-Schmuckblume. VII, VIII. WF.: Verwildert bei der Gänselacke in Andau.

*Ambrosia elatior* L., Hohes Traubenkraut, Ambrosie. VIII, IX. WF.: St. Adnrä.

*Solidago gigantea* Ait., Späte Goldrute. VIII, IX. WF.: Leithaprodersdorf, Wälder bei Zurndorf und Nickelsdorf, Sommer- und Winterstetten bei Siegraben.

*Aster, Sternblume, Aster, Staudenaster.*

*A. novi-belgii* L., Herbst-St. IX, X. WF.: Eingebürgert und sehr häufig im Zurndorfer Auwald, Neusiedl.

*A. salignus* Willd., Weiden(blatt)-St. VIII, IX. Eingebürgert im Zurndorfer Auwald.

*A. Amellus* L., Berg-St. VII—IX. Waldrand neben der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*A. canus* WK., Graue St. VIII, IX. Sehr reichliche Bestände dieser Pflanze stellte ich in dem an das Gemeindegebiet Weiden anschließenden Teil der Neusiedler Wiesen fest.

*Erigeron strigosus* Mühlenbg., Ästiges Berufkraut. VI—X. Auf Rasen, Wiesen, Ödland, Brachen, an Wegen, so bei Andau, Neustift, Sauerbrunn. Die in früheren Ergänzungen angeführten Standorte von *E. annuus* gelten teils für diese Pflanze teils für *E. strigosus*, da ich bisher beide Arten, die wohl eher den Rang von Unterarten verdienen, nicht unterschied. Häufig kommen beide Pflanzen nebeneinander vor.

*Achillea setacea* WK., Feinblatt-Schafgarbe, Feinblättrige Sch. V—VIII. „Haidl“ bei Nickelsdorf.

*Matricaria, Kamille.*

*M. Chamomilla* L., Echte K., Kleine K. V—IX. WF.: Klingenbach, Baumgarten, Sauerbrunn.

*M. matricarioides* (Less.) Porter, Knopf-K., Strahllose K. VI—VIII. WF. Klingenbach, Baumgarten.

*Chrysanthemum, Wucherblume.*

*Ch. Parthenium* (L.) Bernh., Mutterkraut, Jungfernkraut, Mutterkamille. VI—VIII. Verwildert bei Sauerbrunn.

*Ch. vulgare* (L.) Bernh. Rainfarn. VII—X. WF.: An der Leitha bei Zurndorf.

*Artemisia, Beifuß.*

*A. pontica* L., Pontischer B. VII—IX. WF.: Baumgarten Schattendorf (Kripelberg).

*A. austriaca* Jacq., Österreichischer B. VII—IX. WF. Mönchhof, Sandgrube.

*A. Absinthium* L., Wermut, Echter W. VII—IX. WF.: An der Leitha bei Leithaprodersdorf.

*Calendula officinalis* L., Garten-Ringelblume, Echte R. VI—IX. WF.: Verwildert bei Neusiedl.

## **Monocotyledones, Einkeimblättrler**

### *Alismataceae, Froschlöffelgewächse.*

*Alisma lanceolatum* With., Lanzett (blatt)-Froschlöffel, Lanzenblättriger F. VI—IX. WF.: Eisenstadt (-Kleinhöflein), Schützen, Auwald bei Zurndorf; im Ödenburgergebirge auf dem Weg von Rohrbach zum Herrentisch.

### *Juncaginaceae, Dreizackgewächse.*

*Triglochin palustris* L., Sumpf-Dreizack. VI, VII. Sumpfwiesen der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

### *Liliaceae, Liliengewächse.*

*Scilla bijolia* L., Gewöhnlicher Blaustern, Zweiblatt-B. III, IV WF.: Unter Gebüsch oberhalb der Sandgrube bei Großhöflein.

### *Allium, Lauch.*

*A. angulosum* L., Kanten-L. VI—VIII. Auwald bei Zurndorf, auch weißblühend.

*A. carinatum* L., Kiel-L. VI, VII. Auwald bei Zurndorf.

*Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf., Auen-Weißwurz, Breitblättrige W. V, VI. WF.: Hetscherlberg, Potzneusiedler Wald.

*Asparagus officinalis* L., Gewöhnlicher Spargel. VI, VII. WF.: Leithaprodersdorf, Zurndorf.

### *Amaryllidaceae, Narzissengewächse.*

*Leucojum aestivum* L., Sommer-Knotenblume. IV, V. Zurndorfer Auwald.

*Galanthus nivalis* L., Gewöhnliches Schneeglöckchen. II, III. WF.: Wald beim Meierhof zwischen Eisenstadt und Schützen (Gemeindegebiet Oslip), Leithaauen zwischen Wimpassing und Leithaprodersdorf.

### *Iridaceae, Schwertliliengewächse.*

*Iris germanica* L., Deutsche Schwertlilie. V, VI. WF.: Eingebürgert auf dem Hackelsberg.

### *Juncaceae, Simsen gewächse.*

#### *Juncus, Simse.*

*J. ranarius* Song. et Perr., Frosch-S. VI—IX. WF.: Südlich St. Margarethen.

*J. subnodulosus* Schrank, Knötchen-S. VII, VIII. WF.: Neusiedl.

*Luzela pallescens* (Wahlbg.) Swartz (= *L. sudetica* (Willd.) DC., var. *pallescens* (Wahlbg.) Aschers.), Blasse Hainsimse. III—V Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

*Cyperaceae, Zypergrasgewächse.*

*Eriophorum latifolium* Hoppe, Breitblatt-Wollgras. IV, V. WF.: Sumpfwiesen der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Carex, Segge.*

*C. elongata* L., Walzen-S. V, VI. Moorwiese unweit des Herrentisches.

*C. humilis* Leyss., Erd-S., Niedrige S. III, IV. Marzer Kogel.

*C. pilulifera* L., Pillen-S. IV, V. Im Ödenburgergebirge im oberen Dachgraben.

*C. montana* L., Berg-S. IV, V. Auf dem Ruster Höhenzug bei Oslip (Goli brig); Obersee Wald, Königsschüssel, Kehrweide, Marzer Kogel, Loipersbach, Sieggrabener Einschnitt, Wald bei Sigleß, Rand der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*C. Fritschii* Waisbecker, Fritsch-S. IV, V. Obersee Wald südlich St. Margarethen. Meine Angabe „Königsschüssel bei Siegendorf“ in der 5. Ergänzung ist irrig.

*C. ericetorum* Pollich, Heide-S. III—V. Kehrweide (Vratnik) bei Siegendorf und Obersee Wald.

*C. caryophylla* La Tourrette, Frühlings-S. III—V. Im Ödenburgergebirge bei Loipersbach, im Sieggrabener Einschnitt.

*C. fusca* All. (= *C. Goodenovii* Gay), Braun-S., Wiesen-S. V—VIII. Moorwiesen der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*C. Hostiana* DC. (= *C. Hornschuchiana* Hoppe), Saum-S. VI, VII. WF.: Weiden.

*C. lepidocarpa* Tausch, Mittlere Gelb-S. V, VI. WF.: Südlich St. Margarethen.

*C. secalina* Wahlenbg., Roggen-S. V, VI. WF.: Sandgrube bei Halbturn.

*Gramineae, Echte Gräser (Süßgräser)*

*Bromus ramosus* Huds., subsp. *Benekenii* (Lange) Schinz et Thellung, Rauhe Trespe. VI, VII. WF.: Loretto.

*Hordeum Hystrix* Roth, Salz-Gerste, Igel-G. VI, VII. WF.: Ostufer der Langen Lacke.

*Poa bulbosa* L., subsp. *pseudoconcinna* (Schur) A. et G., Ungarisches Rispengras. V, VI. Hackelsberg.

*Sesleria uliginosa* Opiz, Moor-Blaugras. III, IV. WF.: Leithaauen bei Zurndorf; Loipersbach.

*Koeleria pyramidata* (Lam.) PB., Wiesen-Kammschmiele, Gewöhnliche K. VI, VII. WF.: Wiesen.

*Calamagrostis canescens* (Web.) Roth (= *C. lanceolata* Roth), Moor-Reitgras, Sumpf-R., Lanzett-R. VI, VII. Leithaauen bei Zurndorf, Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

*Molinia, Pfeifengras.*

*M. coerulea* (L.) Moench, Blaues Pf., Sumpf-Pf. VII—IX. WF.: Neusiedl, Leithaauen bei Zurndorf.

*M. arundinacea* Schrank, Rohr-Pf., Rohrartiges Pf. VIII, IX. WF.: Auwald bei Zurndorf; im Rosaliengebirge bei Sauerbrunn.

*Hierochloë australis* (Schrad.) R. et Sch., Süd-Mariengras, Südliches M. IV, V WF Obersee Wald südlich St. Margarethen.

*Bothriochloa Ischaemum* (L.) Keng, Gewöhnliches Bartgras. VII, VIII. Rand der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Orchidaceae, Knabenkrautgewächse.*

*Epipactis, Waldstendel, Sumpfstendel.*

*E. microphylla* (Ehrh.) Sw., Kleinblatt-W., Kleinblättriger W. VI—VIII. Laubwald südlich Loreto.

*E. palustris* (L.) Crantz, Weißer S. VI, VII. WF.: Weiden.

*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch, Langblatt-Waldvöglein. V, VI. WF Lahmenwald zwischen Pötsching und Sauerbrunn.

*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., Langsporn-Händelwurz, Mücken-H. VI, VII. WF „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Orchis, Knabenkraut.*

*O. incarnata* L., Fleischrotes K. V, VI. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

*O. palustris* Jacq., Sumpf-K. V, VI. WF.: Weißensee südlich Apetlon.

*O. Morio* L., Wiesen-K., Kleines K., Gewöhnliches K. IV, V WF.: Siegraben.

*Araceae, Aronstabgewächse.*

*Arum maculatum* L., Gewöhnlicher Aronstab, Flecken-A. V WF.: Wald beim Meierhof zwischen Eisenstadt und Schützen (Gemeindegebiet Oslip), auch auf der Seite des Tiergartens; Krippelberg bei Baumgarten.

## **Die militärischen Operationen 1848-49 im burgenländischen Raum**

Von Adolf H a r m u t h

Der Sturmwind, der 1848 durch Europa peitschte, verschonte auch die Österreichische Monarchie nicht. Neben den sozialen Problemen, die auf eine zeitgerechte Lösung harrten, tauchten hier auch die Wünsche unterdrückter Nationen auf. Und wer fühlte sich nicht unterdrückt von dem Dutzend hier nebeneinander und durcheinander hausenden Völkerschaften? Während ein Teil der burgenländischen Heinen mit den von den Ungarn vertretenen demokratischen Ideen liebäugelte, waren die evangelischen Sachsen in Siebenbürgen mehr auf der Seite des Habsburger Erzhauses. Mit Genugtuung bringt „Der Siebenbürger Bote“ aus Her-