©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

BURGENLÄNDISCHE
HEIMATBLÄTTER

Herausgegeben vom Volksbildungswerk für das Burgenland
in Verbindung mit dem Landesarchiv und Landesmuseum

25. Jahrgang Eisenstadt 1963 Heft Nr. 1

Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee

6. Ergänzung zum gleichnamigen Buch von Karl Pill.

Von Gottfried Traxler, Eisenstadt

Wenn in der nachfolgenden Zusammenstellung unter anderen mehrere Pflanzen angeführt sind, die entweder für Burgenland überhaupt oder für Nord-Burgenland als neu zu bezeichnen sind, so mag dies wieder als Beweis gelten, einerseits daß die Pflanzenwelt der göttgesegneten Landschaft des nördlichen Burgenlandes einen außerordentlichen Artenreichtum aufweist, andrerseits daß für eine intensive botanische Forschung im Burgenland angesichts offensichtlicher Unterlassungen der Vergangenheit noch manches lohnende Ziel vorhanden ist und noch manche Überraschung erwartet werden kann. Ich muß aber auch darauf hinweisen, daß das günstige Ergebnis des Jahres 1962 zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Helmut Melzer, Judenburg, zurückzuführen ist. Bei gemeinsam unternommenen Exkursionen kam seiner Führung und seiner Sachkunde das Hauptgewicht zu. Darüber hinaus haben mir seine wertvollen Mitteilungen und Anregungen weitere, hier verzeichnete Pflanzenfunde ermöglicht. Ich spreche ihm hiemit an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus.

Abkürzung: WF = Weitere(r) Fund(e).

LITERATUR

Janchen Erwin, Catalogus florae Austriae, I. Teil, Ergänzungsheft, Wien 1963.
Melzer Helmut, *Camelina rumelica* Vel., der Rumelische Leindotter, — neu für das Burgenland, Burgenländische Heimatblätter, 24, 1962, 92—93.

Angiospermae, Decksamer
Dicotyledones, Zweikeimblättler
Apetalae, Fehlkroner

Betulaceae, Birkengewächse.
Alnus, Erle.

A. viridis (Chaix) DC., Grün-E. IV, V. Hang des Heuberges zum Gaisgraben bei Neustift a. d. R.

A. incana (L.) Moench, Grau-E. II, III. WF.: Auwald bei Zurndorf.

Oberöst[illegible]ches
Landesm[illegible] Linz/D.
B[illegible]k
Inv. Nr. 396/1963

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Fagaceae, Buchengewächse.

Quercus rubra L., Rot-Eiche. V. WF.: Im Ödenburgergebirge beim Herrentisch eingestreut, im Rosaliengebirge in der Wintergstetten bei Sieggraben.

Salicaceae, Weidengewächse.

Populus alba L., Silber-Pappel, Weiß-P. III, IV. WF.: Bei den „Bründeln" bei Purbach, Seegebiet bei Neusiedl, Auwald bei Zurndorf.

Salix, Weide.

S. pentandra L., Lorbeer-W., Leder-W. V, VI. Bei den „Bründeln" bei Purbach.

S. viminalis L., Hanf-W., Korb-W. III, IV. WF.: Sandgrube zwischen Halbturn und Andau.

S. repens L., Kriech-W. IV. WF.: „Kleine Puszta" bei Sauerbrunn, Wasen südlich Andau.

Ulmaceae, Ulmengewächse.

Ulmus, Ulme, Rüster.

U. carpinifolia Gleditsch, Feld-U. III, IV. Auwald bei Zurndorf.

U. scabra Mill., Berg-U. III, IV. Ebendort.

Santalaceae, Sandelgewächse.

Thesium, Bergflachs, Vermeinkraut.

Th. bavarum Schrank, Großer B. VI—VIII. WF.: Hangwiese am Fuße des Dachsriegels bei Sieggraben.

Th. Linophyllon L., Gewöhnlicher B., Mittlerer B. V—VIII. WF.: Wiesen, Baumgarten.

Th. ramosum Hayne, Ästiger B. VI—VIII.: WF.: Rand der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Polygonaceae, Knöterichgewächse.

Rumex, Ampfer.

R. thyrsiflorus Fingerhuth, Rispen-Sauerampfer. VII—IX. WF.: Wasen südlich Andau; Wiesen zwischen Winter- und Sommergstetten bei Sieggraben.

R. maritimus L., Strand-A. VII, VIII. WF.: Andau.

Reynoutria japonica Houtt. (= Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.), Japanischer Flügelknöterich. VIII, IX. Auf Schutt verwildert bei Zagersdorf und Andau.

Chenopodiaceae, Gänsefußgewächse.

Chenopodium, Gänsefuß.

Ch. glaucum L., Grau-G., Graugrüner G. VII—IX. WF.: Andau.

Ch. chenopodioides (L.) Aellen (= Ch. botryoides Sm.), Dickblatt-G. VIII, IX. WF.: Tadten.

Salsola Kali L., Kali-Salzkraut. VII—IX. WF.: Sandgrube bei Mönchhof.

Polycnemum majus A. Br., Großes Knorpelkraut. VII—X. Sandgrube bei Halbturn.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Amarantaceae, Fuchsschwanzgewächse.

Amarantus, Fuchsschwanz.

A. albus L., Weiß-F. VII—IX.. WF.: Mönchhof.

A. chlorostachys Willd., Grünähriger F. VII—X. Auf Schutt in Andau.

A. paniculatus L., Rispen-F. VII—X. WF.: Verwildert bei Neusiedl.

Portulacaceae, Portulakgewächse.

Portulaca oleracea L., Gewöhnlicher Portulak. VII—X. WF.: Andau.

Caryophyllaceae, Nelkengewächse.

Scleranthus collinus Hornung, Hügel-Knäuelkraut. V—X. WF.: Hetscherlberg bei St. Georgen, Sandgrube bei Halbturn.

Dianthus, Nelke.

D. deltoides L., Heide-N. VI—VIII. WF Trockene Wiesen zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

D. superbus L., Pracht-N. VII—IX. Auch in Wäldern des Rosaliengebirges bei Sieggraben.

Dianthus-Bastard:

D. Armeria x D. Pontederae. Waldrand oberhalb Zagersdorf. Vermutlich Erstlingsfund. Wenn ja, wird Beschreibung und Benennung an anderer Stelle veröffentlicht werden. Die Pflanze habe ich am 22. August 1959 gefunden und bereits in meiner 4. Ergänzung unter Dianthus Carthusianorum L. s. l. erwähnt, aber erst jetzt bestimmt.

Cucubalus baccifer L., Beeren-Hühnerbiß. VII, VIII. WF.: Auwald bei Zurndorf.

Silene Otites (L.) Wibel, Ohrlöffel-Leimkraut. V—VII. WF.: Nickelsdorf; Sauerbrunn.

Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewächse.

Euphorbia. Wolfsmilch.

E. pannonica Host, Sand-W Ungarische W. V—VII. WF.: „Alte Hölzer" bei Nickelsdorf.

E. salicifolia Host, Weiden(blatt)-W. V, VI. WF.: Ebendort.

E. marginata Pursh, Weißrand-W., Garten-Edelweiß. VII—IX. Verwildert auf Schutt in Andau, in der Sandgrube bei Mönchhof (mehrfach).

Dialypetalae, Freikroner

Aristolochiaceae, Osterluzeigewächse.

Asarum europaeum L., Europäische Haselwurz. III—V WF.: Königsschüssel bei Siegendorf, Krippelberg bei Baumgarten.

Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse.

Consolida Ajacis (L.) Schur (= C. ambigua (L.) Ball et Heyw., = Delphinium Ajacis L.), Garten-Rittersporn. VI—VIII. Verwildert bei der Gänselacke in Andau.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Thalictrum, Wiesenraute.

Th. flavum L., Gelbe W. VI, VII. WF.: Wasen südlich Andau, Auwald bei Zurndorf.

Th. lucidum L., Schmalblatt-W. VI, VII. Auwald bei Zurndorf, „Alte Hölzer" bei Nickelsdorf.

Anemone silvestris L., Steppen-Windröschen. V, VI. WF.: Sauerbrunn.

Clematis recta L., Aufrechte Waldrebe. VI, VII. WF.: Auf Holzschlägen bei Donnerskirchen häufig; Pöttschinger Wald.

Batrachium Petiveri (Koch) F Schultz, Steifes Froschkraut. VI—VIII. WF.: Alte Sandgrube zwischen Halbturn und Andau.

Ranunculus illyricus L., Illyrischer Hahnenfuß. V, VI. WF.: Trockenrasen bei Gattendorf und Nickelsdorf.

Papaveraceae, Mohngewächse.

Papaver dubium L., Schmalkopf-Mohn. V, VI. WF.: Auf der Böschung der Bundesstraße bei Großhöflein häufig, auch weißblühend, ferner bei Zurndorf.

Cruciferae, Kreuzblütler.

Hesperis tristis L., Trauer-Nachtviole, Trübe N. V, VI. WF.: Auf Trockenrasen zwischen Neudorf b. P. und Gattendorf.

Barbaraea vulgaris R. Br., Gewöhnliches Barbarakraut. IV—VI. Zahlreiche Pflanzen mit Blüten ohne Kronblätter fand ich auf einem Holzschlag beim Gscheitkreuz bei Eisenstadt.

Rorippa amphibia (L.) Bess., Ufer-Sumpfkresse, Schlamm-S., Wasserkresse. V—IX. WF.: Am Leithakanal bei Deutsch-Jahrndorf, Golser Kanal bei Podersdorf.

Dentaria enneaphyllos L.. Neunblatt-Zahnwurz. III, IV. WF.: Gaisgraben bei Neustift a. d. Ros.

Arabis hirsuta (L.) Scop., subsp. planisiliqua (Pers.) Thellung, Gerards Gänsekresse. V, VI. Auf Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

Alyssum Alyssoides (L.) Nath. (= A. calycinum L.), Kelch-Steinkraut. IV—VI. Auf Sandboden bei Neudorf, Gattendorf, Nickelsdorf, Deutsch-Jahrndorf.

Hornungia petraea (L.) Rchb., Gewöhnliche Felskresse. IV, V. WF.: Auf dem Zeilerberg sehr reichlich.

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz, Stumpfkantige Hundsrauke. VI—Herbst. WF.: Neusiedl, Nickelsdorf.

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat, Graue Rempe. V—IX. Feldweg bei St. Georgen a. L.

Raphanus sativus L., subsp. Radicula (Pers.) DC., var. rotundus DC., Rundes Radieschen. V, VI. Verwildert an der Kasernenmauer in Eisenstadt.

Violaceae, Veilchengewächse.

Viola, Veilchen.

V stagnina Kit., Graben-V., Weiher-V. V, VI. WF.: Leithaauen bei Zurndorf, Moorwiesen im Wasen südlich Andau.

V elatior Fr., Hohes V. V, VI. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

V pumila Chaix, Zwerg-V. V, VI. Wiese zwischen Halbturn und Andau.

V montana L., Berg-V. V, VI. WF.: Oberseewald südlich St. Margarethen.

V Riviniana Rchb., Hain-V. IV, V. WF.: Sieggrabener Einschnitt.

V Beraudii Boreau, Hecken-V. III, IV. WF.: Zeilerberg.

V Kitaibeliana R. et Sch., Steppen-Stiefmütterchen. V—VIII. WF.: Breitenbrunn, Neudorf - Gattendorf, Nickelsdorf.

Guttiferae, Hartheugewächse.

Hypericum, Johanniskraut, Hartheu.

H. perforatum L., Gewöhnliches J. V—VIII. subsp. veronense (Schrank) A. Fröhlich. WF.: Wiesen.

H. tetrapterum Fries (= H. acutum Moench), Flügel-J. VII, VIII. WF.: Moorwiesen südlich Andau.

Saxifragaceae, Steinbrechgewächse.

Chrysosplenium alternifolium L., Wechselblatt-Milzkraut. IV—VI. WF.: Loosbach bei Loipersbach, oberer Marzer Bach.

Parnassia palustris L., Sumpf-Studentenröschen. VII—IX. WF.: Neusiedl.

Rosaceae, Rosengewächse.

Filipendula vulgaris Moench. (= F hexapetala Gilib.), Knollen-Mädesüß. VI, VII. „Haidl" bei Nickelsdorf.

Alchemilla, Frauenmantel.

A. glabra Neygenfind s. str., Voralpen-F. V—IX. WF.: Im Sieggrabener Einschnitt am Fuße des Brenntenriegles und Dachsriegels und auf Wiesen zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

A. reniformis Buser (= A. glaberrima Opiz), Nierenblatt-F., V—IX. Am Bächlein zwischen Sommer- und Wintergstetten im Rosalien- (nicht Ödenburger-) gebirge.

Sorbus, Eberesche usw.

S. aucuparia L., Eberesche, Vogelbeerbaum. V, VI. WF.: Als Unterholz im Schwarzföhrenwald bei der Gloriette bei Eisenstadt.

S. domestica L., *Speierling*, Arschitzenbaum. V WF.: Müllendorf, alter Steinbruch.

S. torminalis (L.) Crantz, Elsbeerbaum, Adlersbeerbaum. V. WF.: Breitenbrunn, Oberseewald südlich St. Margarethen; Baumgarten.

Papilionaceae, Schmetterlingsblütler.

Genista tinctoria L., Färberginster. VI, VII. Erwähnenswert eine niedrige Form auf den Moorwiesen der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Lotus corniculatus L., subsp. tenuifolius (L.) Hartm., Salz-Hornklee. V—IX. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser., Sand-Esparsette. V—VII. WF.: Kalvarienberg bei Neusiedl.

Ononis foetens All., Stink-Hauhechel. VII, VIII. WF.: Feuchte Wiese bei Sauerbrunn.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Trifolium, Klee.

T. dubium Sibth., Faden-K. VI—IX. WF.: Weiden.

T. retusum Höjer (= T. parviflorum Ehrh.), Steifer K., Kleinblütiger K., V, VI. WF.: Halbturn.

T. striatum L., Streifen-K. V—VIII. WF.: Halbturn.

Vicia, Wicke.

V tenuifolia Roth, Feinblatt-W. VI, VII. WF.: „Kleine Puszta" bei Sauerbrunn.

V. grandiflora Scop., Großblütige W. V—VII. subsp. sordida (WK.) Dostál. WF.: Marz - Sieggraben.

V Lathyroides L., Zwerg-W. IV—VI. WF.: Wiese beim Vorderen Waldriegel bei Breitenbrunn, Neudorf - Gattendorf; Oberer Dachsgraben.

V narbonensis L., subsp. serratifolia (Jacq.) Arcang., Zahnblatt-W., Sägeblatt-W. V, VI. WF Holzschlag beim Gscheitkreuz bei Eisenstadt, sehr reichlich.

Lathyrus, Platterbse.

L. montanus Bernh., Berg-P., Berg-Walderbse. IV—VI. WF.: Waldschneise auf dem Mitterriegel.

L. paluster L., Sumpf-P VI, VII. WF.: Wasen südlich Andau.

L. Aphaca L., Ranken-P. V—VII. WF.: Baumgarten.

L. silvester L., Wald-P VII, VIII. WF.: Waldrand neben der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn

L. latifolius L. (= L. megalanthus Steudel), Flügel-P., Breitblättrige P., Großblütige P. VI—VIII. WF.: Sauerbrunn, Waldrand zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben, Baumgarten, Schattendorf.

L. hirsutus L., Rauhhaar-P., Behaartfrüchtige P. VI—VIII. WF.: Holzschlag beim Gscheitkreuz bei Eisenstadt.

Thymelaeaceae, Seidelbastgewächse.

Daphne Mezereum L., Gewöhnlicher Seidelbast, Kellerhals. III. WF.: Im Rosaliengebirge bei Sauerbrunn.

Thymelaea Passerina (L.) Cosson et Germain, Gewöhnlicher Vogelkopf, Sperlingskraut. VII, VIII. WF.: Weiden.

Onagraceae, Nachtkerzengewächse.

Epilobium obscurum Schreb., Dunkelgrünes Weidenröschen, Dunkel-W. VI—X. Am Bächlein zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

Malvaceae, Malvengewächse.

Althaea officinalis L., Echter Eibisch, Arznei-E., Gebräuchlicher E. VII, VIII. WF.: Auwald bei Zurndorf.

Lavatera thuringiaca L., Thüringer Strauchpappel. VII, VIII. Pöttsching - Sauerbrunn.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Linaceae, Leingewächse.

Linum, Lein.

L. austriacum L., Österreichischer L. V, VI. WF.: Trockenrasen bei Gattendorf, Zurndorf und Nickelsdorf.

L. flavum L., Gelber L. VI, VII. WF.: Waldrand neben der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Rutaceae, Rautengewächse.

Dictamnus albus L., Gewöhnliche (Weiße) Spechtwurz, (Weißer) Diptam. V, VI. Waldrand neben der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Polygalaceae, Kreuzblumengewächse.

Polygala, Kreuzblume.

P major Jacq., Große K. V, VI. Rand der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

P amarella Crantz, Sumpf-K. V—VII. Wiesen bei Sauerbrunn.

Aceraceae, Ahorngewächse.

Acer, Ahorn.

A. tataricum L., Tatarischer A., Schwarzring-A. V, VI. Im Auwald bei Zurndorf häufig.

A. campestre L., Feld-A., Maßholder. V Auwälder bei Zurndorf und Nickelsdorf.

A. Negundo L., Eschen-A. IV Auwald bei Zurndorf.

Umbelliferae, Doldengewächse.

Sium latifolium L., Breitblättriger Merk. VII, VIII. WF Leithaauen bei Zurndorf, Wasen südlich Andau.

Oenanthe fistulosa L., Röhren-Rebendolde, Tropfwurz. VI—VIII. WF.: Wassergraben bei Schützen nächst der Straße gegen Donnerskirchen.

Cnidium dubium (Schkuhr) Thellung (= C. venosum Koch), Sumpf-Brenndolde. VII, VIII. Leithaauwald bei Zurndorf.

Peucedanum, Haarstrang.

P verticillare (L.) Koch (= P altissimum (Mill.) Thellung, Angelica verticillaris L.), Quirl-H., Riesen-H., Tommasinie. VI—VIII. Hänge westlich des Kaltwasserbaches bei Sauerbrunn. Ein ansehnliches, mehr geschlossenes Vorkommen am Wege nach Eichbühel, gleich beim Anstieg vom Kaltwasserbach, sonst zerstreut. Fruchtbare Exemplar sind nicht häufig.

P. palustre (L.) Moench, Sumpf-H., Sumpfsilge. VII, VIII. Moorwiesen südlich Andau.

P alsaticum L., Elsässer-H. VII, VIII. Auwald bei Zurndorf.

P Carvifolia Vill., Kümmel-H., Kümmelblatt-H. VII—IX. Trockene Wiesen und Waldränder im Graben zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben. Im Burgenland wohl der nördlichste Standort dieser im südlichen Landesteil nicht seltenen Pflanze.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Bifora radians M. B.. Strahlen-Hohlsame. VI, VII. WF.: Klingenbach, Baumgarten.

Sympetalae, Vereintkroner

Plumbaginaceae, Bleiwurzgewächse.

Limonium sinuatum (L.) Mill. (= Statice sinuata L.), Gebuchtete Sandnelke. VII, VIII. Auf Schutt verwildert bei Neusiedl.

Primulaceae, Schlüsselblumengewächse.

Lysimachia, Felberich, Gilbweiderich.

L. punctata L., Punkt-F. VI, VII. WF.: Zurndorfer Auwald; Baumgarten, Sommergstetten bei Sieggraben.

L. nemorum L., Wald-F. V—VIII. WF Am Bächlein zwischen Sommer- und Wintergstetten.

Pirolaceae, Wintergrüngewächse.

Pirola, Wintergrün.

P rotundifolia L., Großes W., Rundblatt-W. VII—X. Im Ödenburgergebirge beim Herrentisch.

P. minor L., Kleines W VI, VII. WF.: Ebendort.

Monotropa Hypopitys L., subsp. Hypophegea (Wallr.) Soó, Kahler Fichtenspargel, Buchenspargel. VI—VIII. Lahmenwald bei Sauerbrunn.

Ericaceae, Heidegewächse.

Calluna vulgaris (L.) Hull, Gewöhnliche Besenheide, Herbst-Heidekraut, Gewöhnliches Heidekraut. VII—IX. WF.: Trockene Stellen der Wiese beim Vorderen Waldriegel bei Breitenbrunn.

Cuscutaceae, Teufelszwirngewächse.

Cuscuta campestris Yuncker, Nordamerikanische (oder Ungarische) Grobseide des Klees, Große Kleeseide. VII—IX. WF.: St. Andrä.

Hydrophyllaceae, Wasserblattgewächse.

Phacelia tanacetifolia Benth., Rainfarn-Büschelschön, Rainfarnblättriges Büschelkraut. V—X. Verwildert zwischen Wulkaprodersdorf und Siegendorf.

Boraginaceae, Rauhblattgewächse.

Lithospermum, Steinsame.

L. officinale L., Echter St., Arznei-St. V, VI. Auwald bei Zurndorf.

L. purpureo-coeruleum L., Blauer St. V, VI. WF.: Potzneusiedler Wald, „Alte Hölzer“ bei Nickelsdorf; Pöttschinger Wald.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Lappula deflexa (Wahlbg.) Garcke, Wald-Igelsame. VI. Holzschlag beim Gscheitkreuz bei Eisenstadt.

Pulmonaria angustifolia L., Schmalblatt-Lungenkraut. IV, V. Waldrand am Fuße des Dachsriegels bei Sieggraben.

Symphytum officinale L., subsp. bohemicum (F W Schmidt) O. Schwarz, Weiße Beinwell. V—VII. WF.: Auwald bei Zurndorf, Klingenbach; Dachsgraben.

Scrophulariaceae. Rachenblütler.

Verbascum, Königskerze.

V phoeniceum L., Purpur-K. V, VI. „Haidl" bei Nickelsdorf.

V Blattaria L., Trauben-K., Schaben-K. VI—VIII. Auwald bei Zurndorf.

V nigrum L., Dunkle K. VII, VIII. WF Andau.

Antirrhinum Orontium L., Kleines Löwenmaul, Acker-L. VI—IX. WF.: Baumgarten.

Veronica, Ehrenpreis.

V Teucrium L., Großer E. VI, VII. WF Donnerskirchen, Auwald bei Zurndorf, Baumgarten - Schattendorf (Krippelberg).

V scardica Griseb., Balkan-E. VI, VII. Weiden - Podersdorf.

Euphrasia, Augentrost.

E. Kerneri Wettst., Großblütiger A. VII—X. WF.: Neusiedl.

E. stricta Wolf ex Lehmann, Heide-A. VII—IX. WF.: Sauerbrunn.

E. tatarica Fisch., Tatarischer A. V—IX. Kalvarienberg bei Neusiedl, Trockenwiese südlich Weiden.

Melampyrum cristatum L., Kamm-Wachtelweizen. VI, VII. „Alte Hölzer" bei Nickelsdorf; Waldrand neben der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Orobanchaceae, Sommerwurzgewächse.

Orobanche lutea Baumg. (= O. rubens Wallr.), Luzerne-Sommerwurz, Gelbe S. V, VI. Pöttsching - Sauerbrunn.

Labiatae. Lippenblütler.

Teucrium Scordium L., Knoblauch-Gamander, Lauch-G., Lachenknoblauch. VII—IX. WF.: Auwald bei Zurndorf.

Scutellaria hastifolia L., Spieß-Helmkraut, Spießblatt-H. VII, VIII. „Söldnerwald" bei Nickelsdorf, Auwald bei Zurndorf; Graben zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

Stachys germanica L., Deutscher Ziest, Filz-Z. VI—VIII. WF.: Holzschlag bei Loretto, Baumgarten.

Salvia, Salbei.

S. glutinosa L., Kleb-S. VII—IX. WF Pöttschinger Wald.

S. austriaca Jacq., Österreichischer S. V, VI. WF Zurndorf, Nickelsdorf.

Salvia-Bastard:

S. pratensis x S. nemorosa = S. silvestris L. WF.: Donnerskirchen.

Hyssopus officinalis L., Gewöhnlicher Ysop, Echter Y. (VII) VIII—X. WF.: Bei der Gänselacke von Andau.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Origanum vulgare L., subsp. prismaticum Gaudin, Winter-Majoran, Falscher Stauden-Majoran. VIII—X. WF.: An der Leitha bei Leithaprodersdorf; Rand der Wälder um die „Kleine Puszta" bei Sauerbrunn, Waldrand bei Sieggraben.

Mentha verticillata L. (= M. aquatica x M. arvensis), Quirl-Minze, Quirlblütige M. VII—X. „Kleine Puszta" bei Sauerbrunn.

Gentianaceae, Enziangewächse.

Gentiana, Enzian.

G. asclepiadea L., Schwalbenwurz-E. VII—IX. WF.: Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

G. Pneumonanthe L., Lungen-E., Sumpf-E. VII—IX. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) Domin., Später Bitterling, Spätblühender B. VI—IX. Ebendort.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Kleines Tausendguldenkraut. VII—IX. WF.: Ebendort.

Oleaceae, Ölbaumgewächse.

Fraxinus angustifolia Vahl, Spitzblatt-Esche, Feld-E. IV, V Auwald bei Zurndorf.

Rubiaceae, Krappgewächse.

Asperula tinctoria L., Färber-Meier. VI, VII. Baumgarten.

Galium, Labkraut.

G. rotundifolium L., Rundblatt-L. VI—VIII. Lahmenwald zwischen Pöttsching und Sauerbrunn.

G. uliginosum L., Moor-L. V, VI. WF Wasen südlich Andau.

G. austriacum Jacq., Österreichisches L. VI—VIII. WF Baumgarten, am Brenntenriegel bei Sieggraben, am Fuße des Dachsriegels, zwischen Sommer- und Wintergstetten.

G. pumilum Murr., Niederes L. VI—VIII. WF Baumgarten, Wiesen, Lahmenwald zwischen Pöttsching und Sauerbrunn.

Dipsaceae, Kardengewächse.

Succisa pratensis Moench, Gewöhnlicher Teufelsabbiß. VII—IX. WF Leithaauen bei Zurndorf, Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

Succisella inflexa (Kluk) Beck, Südlicher Sumpfabbiß. VII—IX. WF Leithaauen bei Zurndorf.

Cucurbitaceae, Kürbisgewächse.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray (= E. echinata (Mühl.) Britton, Sterns et Poggenburg), Lappige Igelgurke. VII—IX. An der Wulka unterhalb der Straße Oggau Donnerskirchen.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Campanulaceae, Glockenblumengewächse.

Phyteuma, Teufelskralle.

Ph. spicatum L., Ähren-T. V, VI. WF.: Im Tal zwischen Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

Ph. orbiculare L., Rundkopf-T., Kugel-T., Kugel-Rapunzel. V—VIII. WF.: Wiese nordwestlich Stotzing; im Ödenburgergebirge zwischen Grußriegel und Hochkogel sowie am Fuße des Dachsriegels.

Compositae, Korbblütler.

Hieracium racemosum WK., Trauben-Habichtskraut. VII, VIII. Im Rosaliengebirge in der Wintergstetten bei Sieggraben.

Crepis, Pippau.

C. paludosa (L.) Moench, Sumpf-P V—VIII. WF.: An Bächen in der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn, im Sieggrabener Einschnitt am oberen Marzer Bach.

C. setosa Hall. fil., Borsten-P. VI—IX. Halbturn - Andau.

Sonchus paluster L., Sumpf-Gänsedistel. VII—IX. Auwald bei Zurndorf.

Chondrilla juncea L., Ruten-Knorpellattich, Binsen-K. VII—IX. WF.: Mönchhof.

Leontodon Leysseri (Wallroth) Beck (= Thrincia hirta Roth), Leysser's Milchkraut. VII—IX. Wasen südlich Andau unweit des Moorbirkenbestandes. Vereinzelt auch mit ganz hellgelben Blüten.

Scorzonera purpurea L., Blaßrote Schwarzwurz. V, VI. WF.: Rand der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Cirsium brachycephalum Juratzka, Kurzkopf-Distel. VI—IX. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

Centaurea micranthos Gmel., Kleinkopf-Flockenblume. VII—IX. Hetscherlberg bei St. Georgen.

Gnaphalium luteo-album L., Gelbliches Ruhrkraut. VII—Herbst. WF.: Som- und Wintergstetten bei Sieggraben.

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook., Gewöhnliche Perlblume, Perlkörbchen. VII—IX. In einer ansehnlichen Gruppe verwildert in der Wintergstetten bei Sieggraben. Vermutlich durch Ausflügler verschleppt.

Buphthalmum salicifolium L., Gewöhnliches Ochsenauge, Rindsauge. VII, VIII. WF.: Baumgarten.

Inula ensifolia L., Schwertblatt-Alant, Schwert-A. VII, VIII. Waldrand neben der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Doronicum Pardalianches L., Kriech-Gemswurz, Schwindelwurz. V, VI. WF.: Stotzingberg.

Arnica montana L., Berg-Wolferlei, Arnika. VI, VII. Bei Sieggraben am Fuße des Brenntenriegels und weiter nördlich am Fuße des Dachsriegels.

Senecio, Greiskraut.

S. aurantiacus (Hoppe) Lessing, Orange-G. VI—VIII. Wiese am Fuße des Dachsriegels.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

S. paludosus L., Sumpf-G. VII, VIII. Auwald bei Zurndorf.

Erechthites hieracifolia (L.) Raf., Amerikanisches Feuerkraut. Aftergreiskraut. VII—IX. WF.: Neustift, Winter- und Sommergstetten bei Sieggraben.

Rudbeckia hirta L., Rauher Sonnenhut, Rauhhaar-S. VIII—X. WF.: Böschung des Golser Kanals nördlich Podersdorf.

Cosmos bipinnatus Cavan., Fliederblatt-Schmuckblume. VII, VIII. WF.: Verwildert bei der Gänselacke in Andau.

Ambrosia elatior L., Hohes Traubenkraut, Ambrosie. VIII, IX. WF.: St. Adnrä.

Solidago gigantea Ait., Späte Goldrute. VIII, IX. WF.: Leithaprodersdorf, Wälder bei Zurndorf und Nickelsdorf, Sommer- und Wintergstetten bei Sieggraben.

Aster, Sternblume, Aster, Staudenaster.

A. novi-belgii L., Herbst-St. IX, X. WF.: Eingebürgert und sehr häufig im Zurndorfer Auwald, Neusiedl.

A. salignus Willd., Weiden(blatt)-St. VIII, IX. Eingebürgert im Zurndorfer Auwald.

A. Amellus L., Berg-St. VII—IX. Waldrand neben der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

A. canus WK., Graue St. VIII, IX. Sehr reichliche Bestände dieser Pflanze stellte ich in dem an das Gemeindegebiet Weiden anschließenden Teil der Neusiedler Wiesen fest.

Erigeron strigosus Mühlenbg., Ästiges Berufkraut. VI—X. Auf Rasen, Wiesen, Ödland, Brachen, an Wegen, so bei Andau, Neustift, Sauerbrunn. Die in früheren Ergänzungen angeführten Standorte von E. annuus gelten teils für diese Pflanze teils für E. strigosus, da ich bisher beide Arten, die wohl eher den Rang von Unterarten verdienen, nicht unterschied. Häufig kommen beide Pflanzen nebeneinander vor.

Achillea setacea WK., Feinblatt-Schafgarbe, Feinblättrige Sch. V—VIII. „Haidl" bei Nickelsdorf.

Matricaria, Kamille.

M. Chamomilla L., Echte K., Kleine K. V—IX. WF.: Klingenbach, Baumgarten, Sauerbrunn.

M. matricarioides (Less.) Porter, Knopf-K., Strahllose K. VI—VIII. WF Klingenbach, Baumgarten.

Chrysanthemum, Wucherblume.

Ch. Parthenium (L.) Bernh., Mutterkraut, Jungfernkraut, Mutterkamille. VI—VIII. Verwildert bei Sauerbrunn.

Ch. vulgare (L.) Bernh. Rainfarn. VII—X. WF.: An der Leitha bei Zurndorf.

Artemisia, Beifuß.

A. pontica L., Pontischer B. VII—IX. WF.: Baumgarten Schattendorf (Krippelberg).

A. austriaca Jacq., Österreichischer B. VII—IX. WF Mönchhof, Sandgrube.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

A. Absinthium L., Wermut, Echter W. VII—IX. WF.: An der Leitha bei Leithaprodersdorf.

Calendula officinalis L., Garten-Ringelblume, Echte R. VI—IX. WF.: Verwildert bei Neusiedl.

Monocotyledones, Einkeimblättler

Alismataceae, Froschlöffelgewächse.

Alisma lanceolatum With., Lanzett(blatt)-Froschlöffel, Lanzenblättriger F. VI—IX. WF.: Eisenstadt(-Kleinhöflein), Schützen, Auwald bei Zurndorf; im Ödenburgergebirge auf dem Weg von Rohrbach zum Herrentisch.

Juncaginaceae, Dreizackgewächse.

Triglochin palustris L., Sumpf-Dreizack. VI, VII. Sumpfwiesen der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Liliaceae, Liliengewächse.

Scilla bifolia L., Gewöhnlicher Blaustern, Zweiblatt-B. III, IV WF.: Unter Gebüsch oberhalb der Sandgrube bei Großhöflein.

Allium, Lauch.

A. angulosum L., Kanten-L. VI—VIII. Auwald bei Zurndorf, auch weißblühend.

A. carinatum L., Kiel-L. VI, VII. Auwald bei Zurndorf.

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf., Auen-Weißwurz, Breitblättrige W. V, VI. WF.: Hetscherlberg, Potzneusiedler Wald.

Asparagus officinalis L., Gewöhnlicher Spargel. VI, VII. WF.: Leithaprodersdorf, Zurndorf.

Amaryllidaceae, Narzissengewächse.

Leucojum aestivum L., Sommer-Knotenblume. IV, V. Zurndorfer Auwald.

Galanthus nivalis L., Gewöhnliches Schneeglöckchen. II, III. WF.: Wald beim Meierhof zwischen Eisenstadt und Schützen (Gemeindegebiet Oslip), Leithaauen zwischen Wimpassing und Leithaprodersdorf.

Iridaceae, Schwertliliengewächse.

Iris germanica L., Deutsche Schwertlilie. V, VI. WF.: Eingebürgert auf dem Hackelsberg.

Juncaceae, Simsengewächse.

Juncus, Simse.

J. ranarius Song. et Perr., Frosch-S. VI—IX. WF.: Südlich St. Margarethen.

J. subnodulosus Schrank, Knötchen-S. VII, VIII. WF.: Neusiedl.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Luzela pallescens (Wahlbg.) Swartz (= L. sudetica (Willd.) DC., var. pallescens (Wahlbg.) Aschers.), Blasse Hainsimse. III—V Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

Cyperaceae, Zypergrasgewächse.

Eriophorum latifolium Hoppe, Breitblatt-Wollgras. IV, V. WF.: Sumpfwiesen der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Carex, Segge.

C. elongata L., Walzen-S. V, VI. Moorwiese unweit des Herrentisches.

C. humilis Leyss., Erd-S., Niedrige S. III, IV. Marzer Kogel.

C. pilulifera L., Pillen-S. IV, V. Im Ödenburgergebirge im oberen Dachsgraben.

C. montana L., Berg-S. IV, V. Auf dem Ruster Höhenzug bei Oslip (Golibrig); Obersee Wald, Königsschüssel, Kehrweide, Marzer Kogel, Loipersbach, Sieggrabener Einschnitt, Wald bei Sigleß, Rand der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

C. Fritschii Waisbecker, Fritsch-S. IV, V. Obersee Wald südlich St. Margarethen. Meine Angabe „Königsschüssel bei Siegendorf" in der 5. Ergänzung ist irrig.

C. ericetorum Pollich, Heide-S. III—V. Kehrweide (Vratnik) bei Siegendorf und Obersee Wald.

C. caryophyllea La Tourrette, Frühlings-S. III—V. Im Ödenburgergebirge bei Loipersbach, im Sieggrabener Einschnitt.

C. fusca All. (= C. Goodenovii Gay), Braun-S., Wiesen-S. V—VIII. Moorwiesen der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

C. Hostiana DC. (= C. Hornschuchiana Hoppe), Saum-S. VI, VII. WF.: Weiden.

C. lepidocarpa Tausch, Mittlere Gelb-S. V, VI. WF.: Südlich St. Margarethen.

C. secalina Wahlenbg., Roggen-S. V, VI. WF.: Sandgrube bei Halbturn.

Gramineae, Echte Gräser (Süßgräser)

Bromus ramosus Huds., subsp. Benekenii (Lange) Schinz et Thellung, Rauhe Trespe. VI, VII. WF.: Loretto.

Hordeum Hystrix Roth, Salz-Gerste, Igel-G. VI, VII. WF.: Ostufer der Langen Lacke.

Poa bulbosa L., subsp. pseudoconcinna (Schur) A. et G., Ungarisches Rispengras. V, VI. Hackelsberg.

Sesleria uliginosa Opiz, Moor-Blaugras. III, IV. WF.: Leithaauen bei Zurndorf; Loipersbach.

Koeleria pyramidata (Lam.) PB., Wiesen-Kammschmiele, Gewöhnliche K. VI, VII. WF.: Wiesen.

Calamagrostis canescens (Web.) Roth (= C. lanceolata Roth), Moor-Reitgras, Sumpf-R., Lanzett-R. VI, VII. Leithaauen bei Zurndorf, Moorwiesen des Wasens südlich Andau.

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Molinia, Pfeifengras.

M. coerulea (L.) Moench, Blaues Pf., Sumpf-Pf. VII—IX. WF.: Neusiedl, Leithaauen bei Zurndorf.

M. arundinacea Schrank, Rohr-Pf., Rohrartiges Pf. VIII, IX. WF.: Auwald bei Zurndorf; im Rosaliengebirge bei Sauerbrunn.

Hierochloë australis (Schrad.) R. et Sch., Süd-Mariengras, Südliches M. IV, V WF Obersee Wald südlich St. Margarethen.

Bothriochloa Ischaemum (L.) Keng, Gewöhnliches Bartgras. VII, VIII. Rand der „Kleinen Puszta" bei Sauerbrunn.

Orchidaceae, Knabenkrautgewächse.

Epipactis, Waldstendel, Sumpfstendel.

E. microphylla (Ehrh.) Sw., Kleinblatt-W., Kleinblättriger W. VI—VIII. Laubwald südlich Loretto.

E. palustris (L.) Crantz, Weißer S. VI, VII. WF.: Weiden.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Langblatt-Waldvöglein. V, VI. WF Lahmenwald zwischen Pöttsching und Sauerbrunn.

Gymnadenia conopea (L.) R. Br., Langsporn-Händelwurz, Mücken-H. VI, VII. WF „Kleine Puszta" bei Sauerbrunn.

Orchis, Knabenkraut.

O. incarnata L., Fleischrotes K. V, VI. WF.: Leithaauen bei Zurndorf.

O. palustris Jacq., Sumpf-K. V, VI. WF.: Weißensee südlich Apetlon.

O. Morio L., Wiesen-K., Kleines K., Gewöhnliches K. IV, V WF.: Sieggraben.

Araceae, Aronstabgewächse.

Arum maculatum L., Gewöhnlicher Aronstab, Flecken-A. V WF.: Wald beim Meierhof zwischen Eisenstadt und Schützen (Gemeindegebiet Oslip), auch auf der Seite des Tiergartens; Krippelberg bei Baumgarten.

Die militärischen Operationen 1848-49 im burgenländischen Raum

Von Adolf Harmuth

Der Sturmwind, der 1848 durch Europa peitschte, verschonte auch die Österreichische Monarchie nicht. Neben den sozialen Problemen, die auf eine zeitgerechte Lösung harrten, tauchten hier auch die Wünsche unterdrückter Nationen auf. Und wer fühlte sich nicht unterdrückt von dem Dutzend hier nebeneinander und durcheinander hausenden Völkerschaften? Während ein Teil der burgenländischen Heinzen mit den von den Ungarn vertretenen demokratischen Ideen liebäugelte, waren die evangelischen Sachsen in Siebenbürgen mehr auf der Seite des Habsburger Erzhauses. Mit Genugtuung bringt „Der Siebenbürger Bote" aus Her-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Burgenländische Heimatblätter

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Traxler Gottfried

Artikel/Article: Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee 1-15