

# BURGENLÄNDISCHE HEIMATBLÄTTER

Herausgegeben vom Amt der Burgenländischen Landesregierung,  
Landesarchiv, Landesbibliothek und Landesmuseum

27. Jahrgang

Eisenstadt 1965

Heft Nr. 1/2

## Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee.

8. Ergänzung zum gleichnamigen Buch von Karl Pill  
Von Gottfried Traxler, Eisenstadt.

In der vorliegenden Arbeit sind wieder Ergebnisse einiger gemeinsam mit Herrn Prof. Helmut Melzer, Judenburg, unternommener Exkursionen verwertet. Bei Pflanzen, deren Entdeckung bzw. Bestimmung meinem Partner zu danken ist, habe ich daher einen entsprechenden Vermerk angebracht.

Abkürzung: WF. = Weitere(r) Fund(e).

### LITERATUR:

- J anchen Erwin, *Catalogus Florae Austriae*, I. Teil, 2. Ergänzungsheft, Wien 1964.  
Melzer Helmut, *Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland*, VZBG, 101/102, 1962, 192—200.  
Rothmaler Werner, *Exkursionsflora von Deutschland*, Kritischer Ergänzungsband, Gefäßpflanzen, Leipzig 1963.  
Sauerzopf Franz, *Zur Verbreitung des großen Nixenkrautes — *Najas marina* L. — im Neusiedlersee*, *Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland*, Heft 31, 170—174.  
Wendelberger Gustav, *Über zwei alte Fundortsangaben des Mäusedorns (*Ruscus Hypoglossum*) aus dem Burgenland*, *Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland*, Heft 29, 11—13.

## Pteridophyta, Farnpflanzen.

### *Lycopodiaceae*, Bärlappgewächse.

*Lycopodium clavatum* L., Keulen-Bärlapp, Heide-B. VII, VIII. WF.: Siegrabener Kogel, Rosaliengebirge bei Sauerbrunn gegen Mitterriegel.

### *Equisetaceae*, Schachtelhalmgewächse.

#### *Equisetum*, Schachtelhalm.

*E. ramosissimum* Desf., Sand-Sch. V—VII. WF.: Sandige Weg- und Acker-  
ränder südlich St. Margarethen, bei Sauerbrunn.

*E. fluviatile* L., Teich-Sch., Schlamm-Sch. V, VI. WF.: Einschnitt zwischen Neusiedl und Parndorf (Hanftal).

## Gymnospermae, Nacktsamer.

### *Coniferae, Nadelhölzer.*

*Chamaecyparis Lawsoniana* (A. Murr.) Parl., Lawsons-Zypresse. IV, V. WF.: Bei Wiesen eine zweite kleine Pflanzung nahe dem Kamm des Rosalingebirges.

*Pseudotsuga Menziesii* (Mirbel) Franco (= *Ps. taxifolia* (Poir.) Britton), Küsten-Douglasie. IV, V. WF.: Ein größerer Bestand im Dachsgraben, im Walde östlich Sieggraben ein weitgehend fehlgeschlagener Pflanzversuch.

## Angiospermae, Decksamer.

### Dicotyledones, Zweikeimblättrler.

#### Apetalae, Fehlkroner.

##### *Betulaceae, Birkengewächse.*

*Alnus viridis* (Chaix) DC., Grün-Erle. IV, V. WF.: Im Ostteil von Sieggraben als Wegrandgebüsch (reichlich), auch im anschließenden Wald (schluchtartiger Graben) mehrfach.

##### *Fagaceae, Buchengewächse.*

*Quercus rubra* L., Rot-Eiche. V. WF.: Eingestreut auch im Leonhardwalde westlich Pöttelsdorf.

##### *Salicaceae, Weidengewächse.*

*Salix repens* L., Kriech-Weide. IV. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein, nasse Wiese westlich Rohrbach.

##### *Moraceae, Maulbeergewächse.*

*Maclura pomifera* (Rafin.) C. Schneider, Gewöhnlicher (Echter) Osage-Dorn. V, VI. Weingartenrandgebüsch unweit der Quelle am Fuße des Hackelsberges bei Winden.

##### *Ulmaceae, Ulmengewächse.*

*Celtis occidentalis* L., Amerikanischer Zürgelbaum. V. Halbverwildert an einer Grundstücksgrenze zwischen Königsschüssel und Oberseewald. Sonst Parkbaum oder Zierstrauch im Schloßpark in Eisenstadt und Halbturn und im Aupark bei Bruckneudorf.

##### *Santalaceae, Sandelgewächse.*

*Thesium bavarum* Schrank, Großer Bergflachs. VI—VIII. WF.: Bergwiesen und Waldränder bei Neustift a. d. R.

*Polygonaceae, Knöterichgewächse.*

*Rumex, Ampfer.*

*R. thyrsiflorus* Fingerhuth, Rispen-Sauerampfer. VII—IX. WF.: Wiesen bei Eisenstadt(-St. Georgen) und westlich Hornstein.

*R. Patientia* L., Garten-A. VI, VII. WF.: Wegränder bei Mönchhof und Andau.

*R. stenophyllus* Ledeb., Schmalblatt-A. VII, VIII. WF.: Sumpfwiese südlich Oslip und südlich Tadtén, „Lange Wiesen“ westlich Hornstein.

*R. paluster* Sm., Sumpf-A. VII, VIII. WF.: Sumpfwiese südlich Oslip.

Rumex-Bastard:

*R. stenophyllus* x *R. paluster* = *R. heteranthus* Borb. Sumpfwiese südlich Oslip (det. Melzer).

*Reynoutria japonica* Houtt. (= *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.), Japanischer Flügelknöterich. VIII, IX. WF.: Auf Schutt verwildert bei Rohrbach.

*Chenopodiaceae, Gänsefußgewächse.*

*Chenopodium strictum* Roth, Streifen-Gänsefuß. VII—IX. WF.: Rücken zwischen Königsschüssel und Oberseewald.

*Beta vulgaris* L., subsp. *vulgaris* (L.), var. *alba* DC., Futterrübe, Burgunderrübe. VII—IX. WF.: Verwildert bei Mattersburg.

*Kochia scoparia* (L.) Schrad., var. *trichophylla* (hort.) Graebn., Sommerzypresse, Feuerbusch, Sibirische Heidehexe. VII—IX. WF.: Verwildert bei Mattersburg (Schutzplatz gegen Forchtenau).

*Salsola Kali* L., Kali-Salzkraut. VII—IX. WF.: Felder und Ödland bei Pama.

*Amarantaceae, Fuchsschwanzgewächse.*

*Amarantus, Fuchsschwanz.*

*A. albus* L., Weiß-F. VII—IX. WF.: Felder zwischen Neudorf und Gattendorf.

*A. crispus* (Lesp. et Thév.) N. Terrac., Krauser F. VII—IX. Bei Häusern in Klingenberg (det. Melzer).

*A. chlorostachys* Willd., Grünähriger F. VII—X. WF.: Felder bei Deutsch Jahrdorf.

*A. paniculatus* L., Rispen-F. VII—X. WF.: Auf Schutt bei Mattersburg.

*Caryophyllaceae, Nelkengewächse.*

*Spergularia, Salzmiere, Schuppenmiere.*

*Sp. rubra* (L.) Presl, Acker-S., Rote S. V—IX. WF.: Brachen bei Siegraben.

*Sp. marina* (L.) Griseb. (= *Sp. salina* Presl), Srtand-S., Salz-Schuppenmiere. V—IX. Feuchte Salzstellen bei Neusiedl.

*Cerastium pumilum* Curt., Niedriges Hornkraut. IV—VI. WF.: Trockenrasen gegenüber Hollern auf burgenländischem Gebiet.

*Dianthus, Nelke.*

*D. superbus* L., Pracht-N. VII—IX. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein, Schöllingberg bei Wiesen, Krippelberg bei Baumgarten, Dachgraben.

*D. Pontederæ Kerner*, Kleinblütige Steinnelke. V—VIII. WF.: Lichte Wälder nördlich Nickelsdorf.

*Cucubalus baccifer L.*, Beeren-Hühnerbiß. VII, VIII. WF.: Gebüsch auf der Kehrweide bei Siegendorf, an der Leitha unterhalb Hornstein, Kleine Leitha bei Deutsch Jahrdorf. Gebüsch am Fuße des Schölling bei Wiesen, bei Walbersdorf.

*Silene Otites (L.) Wibel*, Ohrlöffel-Leimkraut. V—VII. WF.: Trockenrasen bei Pama.

*Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewächse.*

*Euphorbia, Wolfsmilch.*

*E. polychroma Kern.*, Bunt-W. IV, V. WF.: Schölling bei Wiesen.

*E. salicifolia Host*, Weiden(blatt)-W. IV, V. WF.: Brache zwischen Gattendorf und Potzneusiedl.

**Dialypetalae, Freikroner.**

*Aristolochiaceae, Osterluzeigewächse.*

*Asarum europæum L.*, Europäische Haselwurz. III—V. WF.: Leithaauwald bei Bruckneudorf, Wald oberhalb (südlich) Walbersdorf.

*Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse.*

*Isopyrum thalictroides L.*, Gewöhnliches Muschelblümchen. IV. WF.: Königberg (Steinbruch) bei Winden.

*Aquilegia vulgaris L.*, Gewöhnliche Akelei. V—VII. WF.: Bei den aufgelassenen Steinbrüchen bei Loretto.

*Caltha palustris L.*, Sumpf-Dotterblume. IV, V.

*subsp. laeta (Sch. N. K.) Hegi*, Geradfrüchtige D. Wiese am Fuße des Dachsriegels bei Siegraben.

*subsp. palustris (L.)*, Gewöhnliche D. Zurndorf, Deutsch Jahrdorf; Heuberg bei Neustift, Oberer Marzerbach.

*subsp. cornuta (Sch. N. P.) Hegi*, Schnabel-D. Neusiedler Wiesen.

*Consolida orientalis (J. Gray) Schrödinger*, Ost-Rittersporn, Morgenländischer R. VI—VIII. Schuttplatz bei Jois.

*Thalictrum, Wiesenraute.*

*Th. lucidum L.*, Schmalblatt-W. VI, VII. WF.: Leithaniederung unterhalb Hornstein und bei Leithaprodersdorf.

*Th. galioides (DC.) Pers.*, Labkraut-W. VI, VII. WF.: Oberseewald.

*Th. elatum Jacq.* (= *Th. flexuosum Bernh.*), Hügel-W. VI, VII. Rücken zwischen Königsschüssel und Oberseewald, an der Leitha unterhalb Hornstein.

*Anemone, Windröschen.*

*A. silvestris L.*, Steppen-W. V. VI. WF.: Auwald nördlich Nickelsdorf.

*A. nemorosa L.*, Busch-W. III—V. WF.: Am oberen Marzerbach mehrfach, Siegraben Bach (sehr häufig), Ors bach unterhalb Siegraben.

*A. ranunculoides* L., Gelbes W. IV, V. WF.: Leithaauwälder bei Leithaprodersdorf, Bruckneudorf, gegenüber Gerhaus und bei Potzneusiedl; Kaltwasserbach bei Sauerbrunn.

*Pulsatilla pratensis* (L.) Mill., Wiesen-Kuhschelle. subsp. *nigricans* (Stoerck) Zämel. IV, V. WF.: Hangwiese zum Marzerbach unterhalb des Bundesforstgartens.

*Clematis recta* L., Aufrechte Waldrebe. VI, VII. WF.: Wälder bei Klingensbach, Krippelberg bei Baumgarten.

*Ranunculus illyricus* L., Illyrischer Hahnenfuß. V, VI. WF.: Hutweide bei Parndorf, trockene Hänge bei Potzneusiedl.

#### *Papaveraceae, Mohngewächse.*

*Papaver Rhoeas*, L. f. *strigosum* (Boeningh.), Striegelhaar-Mohn. V—VII, Herbst. WF.: Felder und Wegränder bei Hornstein und bei Pama.

*Corydalis pumila* (Host) Rchb., Niedriger Lerchensporn. III, IV. WF.: Auf dem Ruster Höhenzug im Walde bei Oslip. — Gegenüber den Angaben in Hegi (Bd. IV/1, S. 4 und 61) und in einigen Bestimmungsbüchern, wonach die Blütentrauben nur 1—8 oder gar nur 1—5 Blüten aufweisen, kann ich aus eigener Beobachtung feststellen, daß Blütentrauben mit 9—12 Blüten bei günstigen Lichtverhältnissen keineswegs selten sind.

#### *Cruciferae, Kreuzblütler.*

*Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh., Gewöhnliche Ackerkresse. IV, V, (Herbst). WF.: Hutweide bei Parndorf, Hänge bei Sauerbrunn.

*Erysimum repandum* Höjer, Brachen-Schöterich. IV—VI. Auf der Parndorfer Hutweide stellte ich eine großblütige Variation fest, bei der entgegen Hegi, Bd. IV/1, S. 138, die Länge der Kelchblätter 7—8 mm, jene der Kronblätter 12—13 mm erreichte.

*Rorippa austriaca* (Crantz) Bess., Österreichische Sumpfkresse. V—VIII. WF.: Weg- und Ackerränder bei Mönchhof.

*Cardamine pratensis* L., Wiesen-Schaumkraut. IV, V. subsp. *paludosa* (Knaf) Čelak., Sumpf-W. Leithaauen bei Nickelsdorf. subsp. *Matthioli* (Moretti) Arcangeli, Weißes W. Marzerbach, oberer Sieggraben Bach.

#### *Dentaria, Zahnwurz.*

*D. enneaphyllos* L. Neunblatt-Z. III, IV. WF.: Auwiesengraben bei Sieggraben.

*D. bulbifera* L., Zwiebel-Z. IV—VI. WF.: Sieggraben - Greimkogel.

*Arabis Turrita* L., Bogenfrucht - Gänsekresse. IV, V. WF.: Lichte Waldstellen bei Breitenbrunn.

*Lepidium densiflorum* Schrad., Dichtblütige Kresse. V—VII. An Wegen, Weingarten- und Ackerrändern auf dem Rücken zwischen Königsschüssel und Oberseewald.

*Erucastrum nasturtiiifolium* (Poir.) O. E. Schulz, Stumpfkantige Hundsrauke. VI — Herbst. WF.: Feld- und Wegränder bei Pama.

*Rapistrum perenne* (L.) All., Gewöhnlicher Rapsdotter. VI, VII. Trockenrasen der „Kleinen Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Resedaceae, Waugewächse.*

*Reseda Luteola* L., Färber-Wau. VI—IX. Im Rosalien- und Ödenburgergebirge selten, so im Dachsgaben.

*Violaceae, Veilchengewächse.*

*Viola, Veilchen.*

*V. stagnina* Kit., Graben-V., Weiher-V. IV, V. „Lange Wiesen“ bei Hornstein. — Von meinen früheren Standortsangaben sind diejenigen von Weiden · Podersdorf (1. Ergänzung), Eisenstadt · Wulkaprodersdorf (2. Ergänzung) und Leithaauen bei Zurndorf (6. Ergänzung) irrig, da es sich in diesen Fällen um *Viola pumila* handelt. Hingegen bleibt die Angabe vom Wasen südlich Andau aufrecht.

*V. elatior* Fr., Hohes V. V, VI. WF.: An der Kleinen Leitha und in den Auwäldern bei Nickelsdorf. — Die Angabe „Oberseewald“ in der 4. Ergänzung ist zu streichen.

*V. pumila* Chaix, Zwerg-V. V, VI. Neben der Bahnstrecke Eisenstadt · Wulkaprodersdorf bei Eisenstadt (Gemeindegebiet Kleinhöflein), Neusiedler Wiesen, Leithaauen bei Zurndorf und Nickelsdorf.

*V. mirabilis* L., Wunder-V. IV, V. WF.: Leithaauwald bei Bruckneudorf (selten).

*V. Beraudii* Boreau, Hecken-V. III, IV. WF.: Wald bei Oslip, Königsberg bei Winden.

*Guttiferae, Hartheugewächse.*

*Hypericum perforatum* L., Gewöhnliches Johanniskraut. V—VIII. subsp. *veronense* (Schrank) A. Fröhlich. WF.: „Gebirge“ westlich Pötteldorf, Krippelberg bei Baumgarten.

*Crassulaceae, Dickblattgewächse.*

*Sedum oppositifolium* Sims, Persische Fetthenne. VI—VIII. Verwildert auf Ödland bei Pama.

*Saxifragaceae, Steinbrechgewächse.*

*Saxifraga bulbifera* L., Zwiebel-Steinbrech. V, VI. WF.: Beim Bundesforstgarten Marz, Wiese nächst Kote 533 bei Sieggaben.

*Chrysoptenium alternifolium* L., Wechselblatt-Milzkraut. IV—VI. WF.: Sieggaben Bach, Auwiesengraben und Mausgraben bei Sieggaben, Gebirgsgräben bei Neustift a. d. R.

*Rosaceae, Rosengewächse.*

*Alchemilla, Frauenmantel.*

*A. monticola* Opiz, Weiden-F. V—VIII. WF.: Bergwiesen bei Neustift a. d. R.

*A. flabellata* Buser (= *A. glaucescens* Wallr.), Fächer-F. V—VIII. Wiese im Ödenburgergebirge zwischen Grubriegel und Hochkogel.

*A. glabra* Neygenfind s. str., Kahler F. V—IX. WF.: Wiese bei Kote 533 bei Siegggraben.

*A. subcrenata* Buser, Stumpfzähniger F. V—IX. Siegggrabener Kogel (Mausgraben).

*Rosa gallica* L., Essig-Rose. VI, VII. WF.: Krippelberg bei Baumgarten.

*Cydonia oblonga* Mill. Gewöhnliche Quitte. V. VI. WF.: Feldrandgebüsch am Hange oberhalb Eisenstadt, verwildert.

*Sorbus torminalis* (L.) Crantz, Elsbeerbaum, Adlersbeerbaum. V. WF.: Leonhardwald bei Pöttelsdorf, Grenzwald bei Pöttsching, Wald oberhalb Walbersdorf, Schöllingberg bei Wiesen.

#### Sorbus-Bastard:

*S. torminalis* x *S. Aria*. In der Umgebung des alten Steinbruches bei Müllendorf (gegen Hornstein). Ein aus einer größeren Anzahl von Bäumen gebildeter Bestand ist sicherlich sekundärer Bastard *S. latifolia* (Lam.) Pers. Doch gibt es auch ein davon völlig isoliertes, in seinen Formen deutlich verschiedenes Einzelvorkommen, das ich für den primären Bastard *S. rotundifolia* (Bechst.) Hedlund halte.

*Malus silvestris* (L.) Mill., Holz-Apfel, Glattblättriger A. V. WF.: Auwald bei Leithaprodersdorf.

#### *Cerasus*, Kirschbaum, Weichsel.

*C. Mahaleb* (L.) Mill., Steinweichsel, Türkische W. IV, V. Aus gegebenem Anlaß möchte ich festhalten, daß die Weichselrohrzucht im Gebiete der Gemeinden Walbersdorf und Zemendorf noch aufrecht ist. Bei meinen botanischen Wanderungen konnte ich noch eine erfreuliche Anzahl wohlgepflegter „Weichselgärten“ feststellen. Nur in der Gemeinde Pöttelsdorf wurden die Weichselkulturen aufgelassen.

*C. vulgaris* Mill., subsp. *vulgaris* (Mill.), Baumweichsel. IV, V. Verwildert bei Eisenstadt (Hang des Leithagebirges nördlich der Stadt), Müllendorf (alter Steinbruch), im Ödenburgergebirge südlich Marz.

*Armeniaca vulgaris* Lam., Gewöhnlicher Marillenbaum, Aprikosenbaum. IV. Verwildert bei Oslip (Goli brig).

*Persica vulgaris* Mill., Gewöhnlicher Pfirsichbaum. III, IV. WF.: Verwildert am Fuße des Zeilerberges.

#### *Papilionaceae*, Schmetterlingsblütler.

*Laburnum anagyroides* Medik., Gewöhnlicher Goldregen. V. WF.: Mönchhof, Gemeinewald.

*Genista germanica* L., Deutscher Ginster. V, VI. Waldränder bei Neustift a.d.R.

*Galega officinalis* L., Gewöhnliche Geißraute. VI—VIII. Auengebüsch bei Leithaprodersdorf.

*Astragalus austriacus* Jacq., Österreichischer Tragant. V, VI. WF.: Trockenrasen bei Mönchhof.

*Lotus tenuis* W et K., Salz-Hornklee. V—IX. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein, feuchte Mulden bei Pama.

*Medicago varia* Martyn, Bastard-Luzerne, Sand-L., Bunte L. VI—IX. WF.: Trockene Wiesen bei Forchtenau.

*Vicia, Wicke.*

*V. dumetorum* L., Hecken-W. V—VIII. WF.: Leonhardswald westlich Pöttelsdorf, Mausgraben bei Sieggraben.

*V. Lathyroides* L., Zwerg-W. IV—VI. WF.: Hutweide bei Parndorf (sehr häufig), Gaisgraben bei Neustift a. d. R., trocken: Hänge östlich Sieggraben.

*V. pannonica* Crantz, subsp. *pannonica* (Crantz), Echte Ungar-W. V—VII. WF.: Parndorfer Hutweide.

*Lathyrus, Platterbse.*

*L. paluster* L., Sumpf-P VI, VII. WF.: „Lange Wiesen“ westlich Hornstein.

*L. Aphaca* L., Ranken-P V—VII. WF.: Getreidefelder bei Klingenbach.

*L. silvester* L., Wald-P. VII, VIII. subsp. *platyphyllos* (Retz.) Celak. WF.: Marzer Kogel und südlich davon bei Kote 312, Waldrand westlich Sauerbrunn nahe der Landesgrenze.

*L. latifolius* L., Flügel-P., Breitblättrige P., Große bunte P. VI—VIII. WF.: An der Eisenbahn südlich Parndorf.

*L. hirsutus* L., Rauhaar-P., Behaartfrüchtige P. VI—VIII. WF.: Hanftal bei Neusiedl.

*Onagraceae, Nachtkerzengewächse.*

*Epilobium, Weidenröschen.*

*E. collinum* Gmel., Hügel-W., Urgebirgs-W. VI—IX. WF.: Im Rosaliengebirge oberhalb Sauerbrunn.

*E. palustre* L., Sumpf-W. VII—IX. WF.: Sumpfige Talsohle südlich des Marzer Kogels.

*Malvaceae, Käsepappelgewächse.*

*Lavatera thuringiaca* L., Thüringer Strauchpappel. VII, VIII. Auch in der Ebene an Wegen, Rainen, unbauten Orten und in Gebüsch z. B. Joiser Heide, „Gebirge“ bei Pöttelsdorf.

*Geraniaceae, Storchschnabelgewächse.*

*Geranium phaeum* L., Brauner Storchschnabel. V, VI. WF.: Leithaauwald unterhalb Hornstein.

*Balsaminaceae, Springkrautgewächse.*

*Impatiens, Springkraut.*

*I. parviflora* DC., Kleinblütiges Spr. IV—X. WF.: An der Leitha unterhalb Hornstein.



*I. glandulifera* Royle, Drüsen-Spr. VII—IX. WF.: Ebendorf, ferner auf burgenländischem Boden an der Leitha gegenüber Gerhaus und Hollern.

*Simarubaceae, Bitterholzgewächse.*

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (= *A. peregrina* Buc'hoz), F. A. Barkley, = *A. glandulosa* Desf.), Chinesischer Götterbaum. VII. WF.: An der Leitha unterhalb Hornstein.

*Anacardiaceae, Pistaziengewächse.*

*Rhus hirta* (L.) Sudworth (= *Rh. typhina* Torner), Hirschkolben-Sumach, Essigbaum. VI, VII. Forstlich kultiviert im Rosaliengebirge bei Wiesen.

*Aceraceae, Ahorngewächse.*

*Acer, Ahorn.*

*A. campestre* L., Feld-A., Maßholder. V. WF.: Leonhardwald bei Pöttelsdorf, Rosaliengebirge bei Sauerbrunn, jedoch nur in den unteren Höhenlagen.

*A. Negundo* L., Eschen-A. IV. WF.: Auwald unterhalb Hornstein, auf burgenländischem Gebiet gegenüber Hollern, Gemeindegewald von Mönchhof, Leonhardwald bei Pöttelsdorf.

*Vitaceae, Rebengewächse.*

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., Gewöhnlicher Wilder Wein, Gewöhnliche Jungfernebe. VII, VIII. Waldrand nordwestlich Wiesen verwildert oder eingebürgert.

*Umbelliferae, Doldengewächse.*

*Trinia glauca* (L.) Dum., Kleiner Faserschirm, Seegrüner F. IV. WF.: „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn.

*Apium repens* (Jacq.) Lagasca, Kriech-Sellerie, Kriechender Sumpfschirm. VII—IX. Feuchte Mulden bei Pama.

*Seseli varium* Trevir, Bunter Bergfenchel, VII, VIII. WF.: Trockenrasen bei Pama.

*Oenanthe aquatica* (L.) Poir., Wasser-Rebendolde, Wasserfenchel, Roßfenchel. VI—VIII. WF.: Gräben im Wasen südlich Andau bzw. Tadtén.

*Anethum graveolens* L., Echter Dill. VII, VIII. Verwildert auf Schutt bei Jois.

*Angelica Archangelica* L., Echte Engelwurz. VII, VIII. Die Angabe in der 7. Ergänzung ist irrig, es handelt sich um *Heracleum Mantegazzianum* Somm. et Lev.

*Peucedanum, Haarstrang.*

*P. alsaticum* L., Elsässer-H. VII, VIII. WF.: Leonhardwald bei Pöttelsdorf.

*P. Carvijolia* Vill., Kümmel (blatt)-H. VII—IX. WF.: Waldränder westlich Pöttelsdorf, Krippelberg bei Baumgarten.

*Heracleum Mantegazzianum Sommier et Levier*, Riesen-Bärenklau. VI, VII. An den Ufern der alten Leitha und auf einem Schutthaufen in Bruckneudorf (det. Melzer).

### Sympetalae, Vereintkroner.

#### *Primulaceae, Schlüsselblumengewächse.*

*Lysimachia nemorum* L., Wald-Felberich. V—VIII. WF.: Bergwiesen und quellige Stellen bei Neustift a. d. R.

*Androsace elongata* L., Langstiel-Mannsschild, Langstieliger M. IV, V. WF.: Paudorfer Hutweide, häufig.

#### *Primula, Schlüsselblume.*

*P. veris* L., subsp. *canescens* (Opiz) Hayek (= *P. pannonica* Kern.), Graufilzige (Ungarische) Arznei-Sch. IV, V. Trockene Wiesen und Gebüsche bei Loretto, auf dem Schölling bei Wiesen, im Gaisgraben bei Neustift a. d. R., Auwälder nördlich Nickelsdorf, „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn.

*P. elatior* (L.) Hill, Hohe Sch., Hochstiel-Sch. IV, V. Wiese am Ausgang des Grabens zwischen Winter- und Sommerstetten südlich Marz. Leider nur ein spärlicher Restbestand, da die Pflanze der Art der Bodenbehandlung mit chemischen Mitteln nicht gewachsen zu sein scheint.

*Cyclamen purpurascens* Mill. (*C. europaeum* L.), Gewöhnliches Erdbrot, Zyklamen, Alpenveilchen. VIII, IX. WF.: Wald oberhalb (südlich) Walbersdorf, sehr reichlich.

#### *Ericaceae, Heidegewächse.*

*Calluna vulgaris* (L.) Hull, Gewöhnliche Besenheide, Herbst-Heidekraut, Gewöhnliches Heidekraut. VII—IX. WF.: Wald an der Landesgrenze bei Pötsching, Krippelberg bei Baumgarten.

*Vaccinium Vitis-idaea* L., Preiselbeere. V, VI. Im Rosaliengebirge oberhalb Sauerbrunn gegen Mitterriegel. Am Standort der höchst seltene, wenn nicht einmalige Fall, daß unsere Pflanze in Gesellschaft bodenständiger Kastanie (*Castanea sativa* Mill.) wächst.

#### *Cuscutaceae, Teufelszwirngewächse.*

*Cuscuta campestris* Yuncker, Nordamerikanische (oder Ungarische) Grobseide des Klees, Große Kleeseide. VII—IX. WF. Anger im Ortsbereich von Taden.

#### *Hydrophyllaceae, Wasserblattgewächse.*

*Phacelia tanacetifolia* Benth., Rainfarn-Büschelschön, Rainfarnblättriges Büschelkraut. V—X. WF.: Verwildert bzw. als Unkraut in einem Acker des Auwaldgebietes nördlich Nickelsdorf.

#### *Boraginaceae, Rauhbblattgewächse.*

*Myosotis sparsiflora* Mikan pater, Zerstreutblütiges Vergißmeinnicht, Locker-

blütiges V., Auen-V. IV—VI. WF.: Leithaauwald auf burgenländischem Gebiet gegenüber Gerhaus und bei Potzneusiedl.

*Omphalodes, Nabelnüsschen.*

*O. verna Moench*, Großblütiges N., Gedenkemein, Großes Vergißmeinnicht. IV, V. Das Vorkommen am Ausgang des Buchgrabens bei Eisenstadt, das ich nun schon annähernd ein Jahrzehnt beobachte, ist keine vorübergehende Verwilderung, sondern eine alte Einbürgerung und stammt aus der Zeit, da sich dort eine Gartenanlage befand, von der u. a. auch der schon von Pill erwähnte, heute noch lebhaft wuchernde Bestand von *Rudbeckia laciniata* L. übrig geblieben ist.

*O. scorpioides (Haenke) Schrank*, Kleinblütiges N. IV, V. Leithaauwälder bei Leithaprodersdorf, Bruckneudorf, auf burgenländischem Gebiet gegenüber Pachfurth und Gerhaus.

*Pulmonaria, Lungenkraut.*

*P. angustifolia* L., Schmalblatt-L. IV, V. WF.: Schölling bei Wiesen, Wald an der Landesgrenze bei Pöttsching.

*P. mollissima* Kern., Grauhaar-L. IV. Potzneusiedler Wald.

*Symphytum officinale* L., Gewöhnliche Beinwell, Arznei-B. V—VII. var. *inundatum* Menyhárt. Gräben im Wasen südlich Andau.

*Solanaceae, Nachtschattengewächse.*

*Solanum Lycopersicum* L., Tomate, Paradeiser. VII—X. WF.: Verwildert bei Parndorf und Mattersburg.

*Petunia Atkinsiana* D. Don. (= *P. hybrida* hort.), Garten-Petunie. VI—IX. WF.: Verwildert auf Schutt bei Jois.

*Scrophulariaceae, Rachenblütler.*

*Veronica, Ehrenpreis.*

*V. Teucrium* L., Großer E. VI, VII. WF.: Wald oberhalb Zagersdorf.

*V. prostrata* L., Liege-E., Liegender E. IV, V. WF.: „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn, Bandmaisriegel — Marzer Bach.

*V. catenata* Pennell, Bleicher Wasser-E. VII—X. WF.: Feuchte Mulden bei Pama.

*V. scardica* Griseb., Balkan-E. VI, VII. WF.: Entwässerungsgräben südlich St. Margarethen.

*Orphantha lutea (L.) Kern.*, Gelber Zahntrost. VIII, IX. WF.: Marzer Kogel.

*Euphrasia, Augentrost.*

*E. Kernerii* Wettst., Großblütiger A. VII—X. WF.: Moorwiese nordwestlich Stotzing.

*E. stricta* Wolff ex Lehmann, Host, Heide-A. VII—IX, WF.: Wald an der Landesgrenze bei Pöttsching.

*E. tatarica* Fisch., Tatarischer A. V—IX. WF.: Rücken zwischen Königsschüssel und Oberseewald.

*Labiatae, Lippenblütler.*

*Teucrium Scordium L.*, Knoblauch-Gamander, Lauch-G., Lachen-Knoblauch. VII—IX. WF.: Bodenmulde östlich Halbturn, „Lange Wiesen“ westlich Hornstein.

*Scutellaria hastifolia L.*, Spieß-Helmkraut, Spießblatt-H. VII, VIII. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*Prunella-Bastard:*

*P. vulgaris* x *P. laciniata* = *P. intermedia* Link. Waldrand bei Zagersdorf und Draßburg.

*Nepeta Cataria L.*, Echte Katzenminze. VII, VIII. WF.: Fuß des Hackelsberges bei Jois.

*Salvia, Salbei.*

*S. officinalis L.*, Echter S., Garten-S. VI, VII. Straßenböschung am Siegggrabener Sattel, verwildert.

*S. glutinosa L.*, Kleb-S. VII—IX. WF.: Leithaauwald unterhalb Hornstein, Wald oberhalb Zagersdorf.

*S. pratensis L.*, Wiesen-S. V—VII. Zwei besonders auffallende und dekorative Variationen fand ich bei den alten Steinbrüchen bei Loreto: Eine großblütige mit dunkelblauer Oberlippe und blaßblauer Unterlippe und eine kleinblütige mit hellrosalila Oberlippe und dunkelkarminroter Unterlippe.

*Calamintha officinalis Moench*, Wald-Bergminze. VIII, IX. WF.: Marzer Kogel.

*Origanum vulgare L.*, subsp. *prismaticum Gaudin*, Winter-Majoran, Falscher Stauden-M. VIII—X. WF.: Waldrand bei Pöttsching, Halbturn, Baumgarten.

*Plantaginaceae, Wegerichgewächse.*

*Plantago maritima L.*, Salz-Wegerich. VI—VIII. Feuchtes, salziges Ödland bei Pama.

*Gentianaceae, Enziangewächse.*

*Gentiana, Enzian.*

*G. asclepiadea L.*, Schwalbenwurz-E. VII—IX. WF.: Siegggrabener Kogel.

*G. Pneumonanthe L.*, Lungen-E. VII—IX. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*G. ciliata L.*, Fransen-E. VIII—X. WF.: Wald an der Landesgrenze bei Pöttsching, Krippelberg bei Baumgarten, Wiese im Dachsgraben.

*G. austriaca A. et J. Kerner*, subsp. *austriaca (A. et J. Kern.)*, Österreichischer Herbst-E. VI—X. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) Domin.*, Später Bitterling, Spätblühender B. VI—IX. WF.: Feuchte Mulden bei Pama.

*Centaureum, Tausendguldenkraut.*

*C. culgare Rafn.*, subsp. *uliginosum (W.K.) Soó*, Salz-T. VII, VIII. WF.: Gräben südlich St. Margarethen, „Lange Wiesen“ bei Hornstein, feuchte Mulden bei Pama.

*C. pulchellum* (Sw.) Druce, Kleines T. VI—X. WF.: Wiesen und Raine an der Leitha unterhalb Hornstein.

*Rubiaceae, Krappgewächse.*

*Galium, Labkraut.*

*G. palustre* L., Sumpfl. V—VII. subsp. *elongatum* (Presl) Lange. Wasen südlich Tadtén.

*G. glaucum* L., Seegrünes L. V—VII. WF.: Ödenburgergebirge beim Bundesforstgarten Marz.

*Galium-Bastard:*

*G. Mollugo* x *G. verum* = *G. ochroleucum* Wolff. Waldrand bei Zagersdorf.

*Adoxaceae, Moschuskrautgewächse.*

*Adoxa Moschatellina* L., Gewöhnliches Moschuskraut. III—V. WF.: Leithaferwald bei Potzneusiedl.

*Dipsacaceae, Kardengewächse.*

*Succisa pratensis* Moench, Gewöhnlicher Teufelsabbiß. VII—IX. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*Cucurbitaceae, Kürbisgewächse.*

*Cucurbita Pepo* L., Gewöhnlicher Kürbis, Feld-K. VI—IX. WF.: Auf Schutt verwildert zwischen Mattersburg und Forchtenau, im Dachsgaben.

*Campanulaceae, Glockenblumengewächse.*

*Campanula Cervicaria* L., Borsten-Glockenblume. VI, VII. WF.: Im Ödenburgergebirge beim Herrentisch.

*Phyteuma spicatum* L., Ähren-Teufelskralle. V, VI. WF.: Bergwiesen bei Neustift a. d. R.

*Compositae, Korbblütler.*

*Hieracium, Habichtskraut.*

*H. racemosum* W.K., Trauben-H. VII, VIII. WF.: Rosaliengebirge oberhalb Sauerbrunn.

*H. echinoides* Lumnitzer, Natterkopf-H. VII, VIII. Zeilerberg, trockene Grasplätze bei Pama.

*H. Auricula* L., Ohrchen-H. V—VII. WF.: Bergwiesen östlich Siegraben und bei Neustift a. d. R.

*Lactuca, Lattich.*

*L. saligna* L., Weiden-L. VII, VIII. An Feldwegen auf der Joiser Heide.

*L. viminea* (L.) Presl, Ruten-L. VII, VIII. Fuß des Zeilerberges.

*Chondrilla juncea* L., Ruten-Knorpellattich, Binsen-K. VII—IX. WF.: Trokenrasen beim Potzneusiedlerwald, Marzer Kogel, Wegrand im Dachgraben (Ödenburgergebirge).

*Scorzonera, Schwarzwurz.*

*Sc. austriaca* Willd., Österreichische Schw. IV, V. WF.: „Kleine Pusztá“ bei Sauerbrunn.

*Sc. humilis* L., Niedrige Schw., Kleine Schw. V, VI. WF.: Wiese nächst Kote 533 bei Sieggraben.

*Cirsium, Distel.*

*C. oleraceum* (L.) Scop., Kohl-D. VI—IX. WF.: An der Leitha unterhalb Hornstein.

*C. brachycephalum* Juratzka, Kurzkopf-D. VI—IX. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*C. vulgare* (Savi) Ten., Speer-D. VI—IX. hypoleucum (DC.) Kummer. Bihrkogel bei Wiesen.

*Cirsium-Bastard:*

*C. canum* x *C. oleraceum* = *C. tataricum* (Jacq.) All WF.: Hanftal bei Neusiedl, Wiese zwischen Grußriegel und Hochkogel im Ödenburgergebirge.

*Centaurea, Flockenblume.*

*C. Jacea* L., subsp. *sub-Jacea* (Beck) Hylander, Kammschuppige F., Fransen-F. VII—IX. Bergwiesen und Wiesen am Fuße des Rosaliengebirges südlich Marz, bei Wiesen und Sauerbrunn.

*C. stenolepis* Kerner, Schmalschuppige F. VII—IX. Krippelberg bei Baumgarten.

*Carlina, Eberwurz.*

*C. vulgaris* L., subsp. *longifolia* (Rchb.) Arcang. (= *C. stricta* (Rouy) Fritsch), Langblatt-E. VII—IX. Waldrand südlich Loretto, Fuß des Rosaliengebirges südlich Marz.

*C. acaulis* L., Erd-E., Silberdistel. VII—IX. subsp. *acaulis* (L.), var *alpina* Jacq. (= var. *caulescens* (Lam.) Rchb.). WF.: Waldrand östlich Sieggraben.

*Buphthalmum salicifolium* L., Gewöhnliches Ochsenauge, Rindsauge. VII, VIII. WF.: Waldrand südlich Walbersdorf, Marzer Kogel.

*Inula Oculus-Christi* L., Christusauge. VI—VIII. WF.: Ruster Höhenzug bei Oslip.

*Petasites, Pestwurz.*

*P. albus* (L.) Gaertn., Weiße P. III, IV. WF.: Auwiesengraben, oberer Sieggraben Bach.

*P. hybridus* (L.) G. M. Sch., Gewöhnliche P. III, IV. WF.: Am Ortsbach unterhalb Sieggraben.

*Senecio, Greiskraut.*

*S. integrifolius* (L.) Clairv. s. str., Steppen-Gr. VI, VII. WF.: Leithauwald nördlich Nickelsdorf, „Kleine Pusztá“ bei Sauerbrunn.

*S. ovirensis* (Koch) DC., Obir-Gr., Alpenländisches Gr. VI, VII. Wiese zwischen oberem Dachsgraben und Herrentisch östlich Siegggraben.

*S. erucifolius* L., subsp. *tenuifolius* (Jacq.) H. Reichenbach (= *S. tenuifolius* Jacq.), Schmalblättriges Rauken-Gr. VII—IX. „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

#### *Helianthus, Sonnenblume.*

*H. tuberosus* L., Knollen-S., Erdbirne, Topinambur. X, XI. Meine bisherigen Angaben beziehen sich auf *H. decapetalus* L.

*H. decapetalus* L., Zehnstrahlige S. VII, VIII. WF.: An der Wulka bei Trausdorf, zwischen Mattersburg und Forchtenau, Ostteil von Siegggraben, bei Sauerbrunn, auf Schutt bei Rohrbach, am Fuße des Schölling bei Wiesen.

*Rudbeckia laciniata* L., Schlitzblatt-Sonnenhut. VII, VIII. Verwildert an der Leitha unterhalb Hornstein.

*Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake, Behaartes Franzosenkraut, Haar-F. V—X. Bei Häusern im Ostteil von Siegggraben.

*Tagetes patulus* L., Ausgebreitete Samtblume. VII—IX. Verwildert auf Schutt bei Jois und Mattersburg.

#### *Aster, Sternblume, Aster, Staudenaster.*

*A. novi-belgii* L., Herbst-St. IX, X. WF.: An der Wulka bei Trausdorf, auf Schutt bei Rohrbach.

*A. lanceolatus* Willd., Lanzettblatt-St. VIII—X. Verwildert am Bach unterhalb Forchtenau.

*A. Amellus* L., Berg-St. VII—IX. WF.: Krippelberg bei Baumgarten.

*Callistephus chinensis* (L.) Nees, Chinesische Sommeraster. VII—IX. WF. Verwildert auf Schutt bei Mattersburg und Forchtenau.

*Achillea asplenifolia* Vent., Farn-Schafnarbe, Farnblättrige Sch. VI—VIII. WF.: Wiese auf dem Heuberg bei Neustift a. d. R.

*Calendula officinalis* L., Garten-Ringelblume. VI—IX. WF.: Verwildert bei Pama.

### **Monocotyledones, Einkeimblättrler.**

#### *Liliaceae, Liliengewächse.*

*Veratrum album* L., Weiß-Germer, Weißer G. VI—VIII. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*Ornithogalum Boucheanum* (Kunth) Aschers., Grüner Milchstern. IV, V. WF.: Tabor bei Neusiedl.

#### *Allium, Lauch.*

*A. angulosum* L., Kanten-L. VI—VIII. WF.: „Lange Wiesen“ bei Hornstein.

*A. montanum* F. W. Schmidt, Berg-L. VII, VIII. WF.: Marzer Kogel, Wald am Stubenbühel südlich Mattersburg.

*A. suaveolens* Jacq., Duft-L. VII—IX. Moorwiese nordwestlich Stotzing.

*A. ursinum* L., Bären-L., Wald-Knoblauch. V. WF.: Auwälder bei Königshof und Bruckneudorf.

*A. carinatum* L., Kiel-L. VI, VII. WF.: Rand des Leithaauwaldes unterhalb Hornstein.

*A. oleracum* L., Glocken-L., Gemüse-L. VI, VII. Gebüsch am Rande des Leonhardwaldes westlich Pöttelsdorf.

*A. sativum* L., Knoblauch. VII, VIII. Häufig verwildert in Weingärten, Gebüsch, an Wegen und auf Abfallplätzen.

*Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf., Auen-Weißwurz, Breitblättrige W. V, VI. WF.: Leithauferwald bei Potzneusiedl.

*Asparagus officinalis* L., Gewöhnlicher Spargel. VI, VII. WF.: „Gebirge“ westlich Pöttelsdorf.

### *Amaryllidaceae, Narzissengewächse.*

*Leucojum aestivum* L., Sommer-Knotenblume. IV, V. WF.: An feuchten Stellen der Auwälder bei Nickelsdorf, insbesondere an der Kleinen Leitha und einem toten Arm derselben.

*Galanthus nivalis* L., Gewöhnliches Schneeglöckchen. II, III. WF.: Zeilerberg, Königsberg (Steinbruch) bei Winden. — Eine entzückende Laune der Natur, eine Variation, bei der die äußeren Perigonblätter nahe der Spitze einen (gelblich) grünen Fleck aufwiesen, fand ich in mehreren Exemplaren im Leithagebirge bei Eisenstadt zwischen „Schöner Jäger“ und der Kürschnergube.

### *Iridaceae, Schwertliliengewächse.*

*Crocus albiflorus* Kit., Weißer Safran. III, IV, Siegrabener Kogel (Mausgraben).

### *Juncaceae, Simsenengewächse.*

#### *Juncus, Simse.*

*J. tenuis* Willd., Zarte S. VI—IX. WF.: An Wegen beim Oberseewald.

*J. ranarius* Song. et Perr., Frosch-S. VI—IX. Bei der Schwefelquelle von Schützen.

*J. subnodulosus* Schrank, Knötchen-S. VII, VIII. „Lange Wiesen“ westlich Hornstein, nasse Wiese westlich Rohrbach.

*J. alpinus* Vill., Gebirgs-S., Alpen-S. VII, VIII. Zitzmannsdorfer Wiesen.

### *Cyperaceae, Zypergrasgewächse.*

*Holoschoenus vulgaris* Link, Gewöhnliche Glanzbinse. VII, VIII. Feuchte Mulden bei Pama.

#### *Carex, Segge.*

*C. Otrubae* Podpěra (= *C. lamprophysa* Samuelson, = *C. nemorosa* Reben-tisch), Hain-S. V, VI. Schützen, Schwefelquelle.



*C. paniculata* Juslen., Rispen-S. V, VI. WF.: Oberer Marzerbach.

*C. stellulata* Good., Stern-S. V, VI. WF.: Bergwiesen auf dem Heuberg bei Neustift a. d. R.

*C. humilis* Leyss., Erd-S., Niedrige S. III, IV. WF.: Bandmaisriegel bei Marz.

*C. pilulifera* L., Pillen-S. IV, V. WF.: Sieggraben - Greimkogel, Bergwiese bei Neustift a. d. R.

*C. montana* L., Berg-S. IV, V. WF.: Wald an der Landesgrenze bei Pötttsching.

*C. caryophyllaea* La Tourrette, Frühlings-S. III—V. WF.: Trockenwiesen bei Potzneusiedl, gegenüber Hollern auf burgenländischem Gebiet, östlich Sieggraben.

*C. Micheli* Host, Micheli-S. V, VI. WF.: Hang westlich des Kaltwasserbaches bei Sauerbrunn.

*C. serotina* Mérat (= *C. Oederi* Retz.), Kleine Gelb-S. V, VI. Feuchte Mulden bei Pama.

*C. riparia* Curtis, Ufer-S. V, VI. WF.: Wasen bei Wallern.

*C. vesicaria* L., Blasen-S. V, VI. Moorwiese zwischen oberem Dachsgraben und Herrentisch östlich Sieggraben.

#### *Gramineae, Echte Gräser.*

*Festuca valesiaca* Schleich. s. str., Walliser Schwingel. VI, VII. Auch auf Trockenrasen östlich des Neusiedlersees, so Lange Lacke östlich Apetlon.

*Glyceria declinata* Bréb., Blaugrünes Schwadengras. V—VII. Sieggraben Bach östlich Sieggraben.

*Melica picta* K. Koch, Buntes Perlgras. V, VI. Wald oberhalb Zagersdorf (det. Melzer).

#### *Poa, Rispengras.*

*P. pratensis* L., *angustifolia* (L.) Gaud., Schmalblatt-R. V, VI. WF.: Eisenstadt, Sandgrube.

*P. supina* Schrad., Läger-R. V. Bihrkogel bei Wiesen.

#### *Calamagrostis, Reitgras.*

*C. varia* (Schrad.) Host, Bunt-R. VII, VIII. Rosaliengebirge bei Sauerbrunn.

*C. canescens* (Web.) Roth, Moor-R., Sumpf-R., Lanzett-R. VI, VII. WF.: Moorwiese zwischen oberem Dachsgraben und Herrentisch.

*Molinia arundinacea* Schrank, Rohr-Pfeifengras, Rohrartiges P. VIII, IX. WF.: Krippelberg, Wald oberhalb Walbersdorf, Marzer Kogel, Wald an der Landesgrenze bei Pötttsching, Schölling, Dachsgraben.

*Hierochloë australis* (Schrad.) R. et Sch., Südliches Mariengras. IV, V. WF.: Wald an der Landesgrenze bei Pötttsching, Hang westlich des Kaltwasserbaches bei Sauerbrunn.

*Phleum nodosum* L., Knollen-Lieschgras. VI—VIII. Rosaliengebirge bei Wiesen.

*Chrysopogon Gryllus* (Torner) Trin., Gewöhnlicher Goldbart. VI, VII. WF.: „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn (spärllich).

*Orchidaceae, Knabenkrautgewächse.*

*Epipactis palustris* (L.) Crantz, Weißer Sumpfstendel. VI, VII. WF.: Sumpfwiese im Dachsgraben.

*Cephalanthera, Waldvöglein.*

*C. Damasonium* (Mill.) Druce, Weißes W., Breitblatt-W. V, VI. WF.: Auwald bei Nickelsdorf, Ödenburgergebirge beim Bundesforstgarten Marz.

*C. longifolia* (L.) Fritsch, Langblatt-W. V, VI. WF.: Ödenburgergebirge beim Bundesforstgarten Marz.

*Orchis, Knabenkraut.*

*O. incarnata* L., Fleischrotes K. V, VI. WF.: Wasen bei Wallern.

*O. maculata* L. s. str., Echtes Flecken-K. V, VI. WF.: Waldwiese im Ödenburgergebirge beim Bundesforstgarten Marz, auf Bergwiesen, feuchten Stellen und Waldrändern auf dem Heuberg bei Neustift.

*O. palustris* Jacq., Sumpf-K. V, VI. WF.: Wasen bei Wallern.

*O. Morio* L., Wiesen-K., Kleines K., Gewöhnliches K. IV, V. WF.: „Kleine Puszta“ bei Sauerbrunn, hier auch f. *incarnata* Lindberg.

*O. purpurea* Huds., Braunrotes K. V. WF.: Auwald bei Nickelsdorf.

*Ophrys insectifera* L. partim, Fliegen-Ragwurz. V. WF.: Müllendorf, aufgelassener Steinbruch, Loretto, Rasen und Waldränder südlich des Ortes, sehr häufig bei den aufgelassenen Steinbrüchen gegen die Dreifaltigkeitskapelle.

*Araceae, Aronstabgewächse.*

*Acorus Calamus* L., Gewöhnlicher Kalmus. VI, VII. Mühlbach bei Oslip.

*Arum maculatum* L., Gewöhnlicher Aronstab, Flecken-A. V. WF.: Leithaauald bei Königshof, gegenüber Gerhaus auf burgenländischem Gebiet.

## Zwei Mundartgedichte aus Wimpassing a. d. Leitha vom Jahre 1879

Von Karl M. Klier, Wien

In meiner Sammlung von Lied-Flugblattgedichten fand sich ein Stück, enthaltend zwei Mundart-Gedichte, gedruckt zu Raab im Jahre 1879, das ich anno 1919 in Pottendorf, Niederösterreich, erhalten hatte<sup>1</sup>. Das erste Gedicht nimmt den Josefitag zum Anlaß und klingt in eine Huldigung an einen fernen, nicht näher bezeichneten Josef aus. Vermutlich wurde das Lied bei einer — geistlichen? — Tafelrunde zum besten gegeben. Das zweite Gedicht schildert in launiger Weise den bisherigen Lebenslauf des aus Wimpassing stammenden Domherrn Josef Trichtl.

<sup>1</sup> Vgl. Karl M. Klier, *Erlebnisse eines Volksliedsammlers II. An der Grenze* (1919). — In: *Volk und Heimat* XV, 1962, Nr. 17, S. 3 f.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Burgenländische Heimatblätter](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Traxler Gottfried

Artikel/Article: [Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee. 1-18](#)