

Zur Kenntnis der Pompilidae des Burgenlandes (Hymenoptera)

Von Michael M a d l , Frauenkirchen

Zusammenfassung

Derzeit sind aus der Familie Pompilidae 66 Arten im Burgenland nachgewiesen. Die Funddaten von 25 Arten werden angegeben. 7 Arten sind neu für die Fauna des Burgenlandes.

Summary

To the knowledge of the Pompilidae of Burgenland (Hymenoptera) — In Burgenland the family Pompilidae is represented by 66 species. Records of 25 species are dealt with. 7 species are new to the fauna of Burgenland.

Einleitung

Eine Übersicht über die Pompiliden-Fauna von Österreich findet man in den Arbeiten von Priesner (1967, 1968, 1969). In diesen Arbeiten sind auch 59 Arten aus dem Burgenland angeführt. Die Funddaten beziehen sich vor allem auf das Nordburgenland, insbesondere auf den Bezirk Neusiedl a. See. Die Angaben von Priesner, der ein guter Kenner der Familie Pompilidae war, wurden von mir nomenklatorisch auf den neuesten Stand gebracht.

Die vorliegende Arbeit basiert auf dem Material, das der Verfasser in den letzten Jahren im Bezirk Neusiedl a. See gesammelt hat. Obwohl das Material nur aus etwa 50 Exemplaren bestand, enthielt es 25 Arten, von denen 7 neu für das Burgenland waren.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Oberstudienrat H. Wolf (Plettenberg, BRD) recht herzlich für die Bestimmung der Pompiliden bedanken.

Funddaten

In der Systematik folge ich Wahis (1986). Zur Frage der Unterarten gehen die Ansichten der Spezialisten weit auseinander. In dieser Arbeit handelt es sich immer um die Nominatunterart, falls nicht andere Angaben gemacht werden.

Unterfamilie: Pepsinae

Cryptocheilus (Adonta) versicolor (Scopoli, 1763) Synonyme: *Sphex formicaria* Christ, 1791; *Sphex bipunctata* Fabricius, 1793; *Sphex sexpunctata* Fabricius, 1794; *Ichneumon tripunctator* Fabricius, 1798; *Calicurgus binotatus* Lepeletier, 1845; *Salius bipunctatus* Smith, 1873; *Salius sexpunctatus* var. *nigripes* Costa, 1887; *Priocnemis splendidulus* Costa, 1887; *Salius splendidulus* Dalla Torre, 1897; *Cryptochilus vorticosus* Haupt, 1927; *Cryptochilus vorticosus* f. *italica* Haupt, 1935; *Cryptochilus versicolor* f. *femorata* Haupt, 1935; *Cryptochilus versicolor* f. *fraudulentum* Priesner, 1968; *Cryptocheilus versicolor* f. *transvestitus* Wolf, 1972.

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 22.7.1986. Priesner (1968) führt folgende Fundorte an: Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Priocnemis (Priocnemis) agilis (Shuckard, 1837)

Synonyme: *Priocnemis obtusiventris* Schioedtte, 1837; *Priocnemis fraterculus* Junco, 1946; *Priocnemis obtusiventris* var. *moravicus* Wolf, 1960; *Priocnemis obtusiventris* var. *stigmaticus* Wolf, 1960; *Priocnemis obtusiventris* var. *subalpinus* Wolf, 1960.

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, östlich bis Mittelasien.

Untersuchtes Material: Apetlon, Fuchslochlacke 1 ♀ 21.8.1989 — Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 25. 8. 1989 — Weiden a. See 1 ♀ 10. 8. 1989.

Priesner gibt unter *Priocnemis obtusiventris subalpina* Wolf folgende Fundorte an: Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Zurndorf.

Priocnemis (Priocnemis) cordivalvata Haupt, 1927.

Verbreitung: Nord-, Mittel- und Osteuropa, Sibirien.

Untersuchtes Material: Frauenkirchen ♀ 16. 8. 1986. Neu für das Burgenland.

Priocnemis (Priocnemis) exaltata (Fabricius, 1775)

Synonyme: *Sphex gibba* Scopoli, 1763; *Priocnemis nudipes* Dahlbom, 1845; *Sphex revo* Harris, 1870; *Priocnemis longicornis* Haupt, 1927; *Priocnemis exaltatus* f. *ruficeps* Nordström & Forsius, 1928; *Priocnemis exaltatus valkeilai* Wolf, 1959.

Verbreitung: Nord— bis nördliches Südeuropa, östlich bis Mittelasien.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 17. 8. 1989. Neu für das Burgenland.

Priocnemis (Priocnemis) hyalinata (Fabricius, 1793)

Synonyme: *Pompilus femoralis* Dahlbom, 1829; *Pseudagenia discrepans* Costa, 1887; *Priocnemis trifurcus* Radoszkowski, 1888; *Priocnemis vitripennis* Verhoeff, 1892; *Salius (Priocnemis) notatulus* Saunders, 1896; *Priocnemis notatus* var. *marpurgensis* Strand, 1910; *Priocnemis pseudofemoralis* Susterka, 1938; *Priocnemis femoralis taigaica* Wolf, 1967.

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa, östlich bis Usbekistan.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 17. 8. 1989 — Weiden a. See 1 ♂ 27. 7. 1989.

Neu für das Burgenland.

Priocnemis (Priocnemis) mesobrometi (Wolf, 1958)

Verbreitung: Südliches Mittel- und Südeuropa.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 17. 8. 1989.

Neu für das Burgenland.

Priocnemis (Priocnemis) minutalis Wahis, 1979

Synonym: *Pompilus minor* Zetterstedt, 1838.

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa, östlich bis Sibirien.

Untersuchtes Material: Frauenkirchen 1 ♀ 17. 8. 1986.

Priesner (1968) gibt unter *Priocnemis minor* Zetterstedt folgende Fundorte an: Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Priocnemis (Priocnemis) parvula Dahlbom, 1845

Synonyme: *Priocnemis mocsary* Gussakovskij, 1930; *Priocnemis klosei* Haupt, 1937; *Priocnemis haupti* Sustera, 1938; *Priocnemis vinetorum* Blüthgen, 1944; *Priocnemis parvalus* var. *neglectus* Wolf, 1960; *Priocnemis parvulus* var. *pseudominor* Wolf, 1960.

Verbreitung: Westpaläarktis, Mittelasien.

Untersuchtes Material: Frauenkirchen 1 ♂ 17. 8. 1986.

Priesner (1968) führt folgende Fundorte an: Neusiedl a. See, Zurndorf.

Priocnemis (Priocnemis) pusilla Schioedte, 1837

Synonym: *Priocnemis pusillus* var. *cotticus* Wolf, 1962.

Verbreitung: Paläarktis.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 22. 8. 1989, 2 ♀ 23. 8. 1989 — Neusiedl a. See, Lehmgstetten 1 ♀ 11. 8. 1989.

Priesner (1968) gibt folgende Fundorte an: Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Nickelsdorf, Winden a. See, Zurndorf.

Priocnemis (Umbripennis) vulgaris (Dufour, 1841)

Synonyme: *Calicurgus vulgaris* Lepeletier, 1845; *Priocnemis mimulus* Wesmael, 1851; *Priocnemis maculipennis* Schenck, 1857; *Priocnemis claripennis* Schenck, 1857; *Priocnemis relictus* Verhoeff, 1870; *Priocnemis simulans* Thomson, 1874; *Priocnemis schencki* Kohl, 1884; *Priocnemis mimulus* f. *atra* Haupt, 1930.

Verbreitung: Mitteleuropa, Türkei, Mittelasien.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♂ 17. 8. 1989. Priesner (1968) gibt unter *Priocnemis mimula* Wesmael folgende Fundorte an: Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Winden a. See.

Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808)

Synonyme: *Pompilus calcaratus* Dahlbom, 1829; *Pompilus maculipennis* Dahlbom, 1829; *Pompilus albispinus* Herrich-Schaeffer, 1830; *Pompilus curtus* Zetterstedt, 1838; *Priocnemis gyllenhali* Dahlbom, 1843; *Anoplius labiatus* Lepeletier, 1845; *Anoplius unimacula* Lepeletier, 1845; *Calicurgus odontellus*

Lepeletier, 1845; *Pompilus bivirgatus* Costa, 1881; *Priocnemis fuscopennis* Verhoeff, 1892; *Calicurgus hyalinatus* var. *duplonotata* Blüthgen, 1961; *Calicurgus hyalinatus* var. *strittianus* Wolf, 1972.

Verbreitung: Holarktis.

Untersuchtes Material: Frauenkirchen 1 ♀ 30. 7. 1987 — Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 25. 7. 1989.

Priesner (1967) gibt unter *Calicurgus hyalinatus* Fabricius folgende Fundorte an: Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Dipogon (Deuteraenia) bifasciatus (Geoffrey, 1785)

Synonyme: *Pompilus hircanus* Fabricius, 1798; *Agencia intermedia* Dahlbom, 1843.

Verbreitung: Europa, Naher bis Ferner Osten.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 8. 8. 1989.

Priesner (1968) führt unter *Dipogon hircanum* Fabricius Winden a. See als Fundort an.

Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)

Synonyme: *Ceropales punctum* Fabricius, 1804; *Agencia canaliculata* Schenck, 1857; *Anoplius submarginatus* Lepeletier, 1845; *Anoplius albigena* Lepeletier, 1845; *Auplopus carbonarius* var. *ribauti* Priesner, 1960; *Auplopus collinus* Haupt, 1962; *Auplopus silvalis* Haupt, 1962.

Verbreitung: Paläarktis.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 1 ♀ 17. 8. 1989.

Neu für das Burgenland.

Auplopus rectus (Haupt, 1927)

Synonyme: *Pseudagenia dubia* Haupt, 1927; *Pseudagenia recta* f. *atra* Haupt, 1930; *Auplopus rectus* f. *nigra* Priesner, 1962; *Auplopus rectus pallipes* Priesner, 1967; *Auplopus rectus albocoxatus* Wolf, 1975.

Verbreitung: Mittel-, Ost- und Südeuropa, Nordafrika, Mittelasien.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Lehmgstetten 1 ♀ 11. 8. 1989.

Priesner (1967) führt folgende Fundorte an: Neusiedl a. See, Oggau, Winden a. See, Zurndorf.

Unterfamilie: Pompilinae

Eoferreola rhombica (Christ, 1791)

Synonyme: *Pompilus coccineus* Fabricius, 1791; *Evania cincta* Fabricius, 1798; *Pompilus basalis* Herrich-Schaeffer, 1830; *Pompilus tropicus* Wiesmann, 1849; *Pompilus thoracicus* Schenck, 1907.

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, östlich bis Mongolei.

Untersuchtes Material: Jois, Hackelsberg 2 ♀ 24. 8. 1989.

Priesner (1968) gibt unter *Tea rhombica* Christ folgende Fundorte an: Jois, Neusiedl a. See (Panzergraben), Winden a. See.

Arachnospila (Ammosphex) abnormis (Dahlbom, 1842)

Verbreitung: Mitteleuropa, östlich bis China.

Untersuchtes Material: Weiden a. See 1 ♀ 27. 7. 1989.

Neu für das Burgenland.

Arachnospila (Ammosphex) anceps (Wesmael, 1851)

Synonyme: *Pompilus unguicularis* Thomson, 1870; *Pompilus crombaci* Tournier, 1890; *Pompilus expletus* Tournier, 1890; *Pompilus lustricus* Tournier, 1890; *Pompilus navus* Tournier, 1890; *Pompilus radiosus* Tournier, 1890; *Pompilus saxeus* Tournier, 1890; *Psammochares hedickei* Haupt, 1929; *Pompilus (Ammosphex) anceps cyrnus* Wolf, 1965; *Pompilus (Ammosphex) anceps peninsulanus* Wolf, 1966; *Arachnospila (Ammosphex) anceps serica* Wolf & Moczár, 1972.

Verbreitung: Europa, Türkei, östlich bis Mongolei.

Untersuchtes Material: Apetlon, Fuchslotzacke 1 ♀ 21. 8. 1989 — Frauenkirchen 1 ♀ 15. 8. 1986, 2 ♀ 30. 8. 1986.

Wegen der Häufigkeit dieser Art gibt Priesner (1968) keine genaueren Funddaten an. In der Sammlung Priesner, die im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt wird, befanden sich Exemplare von folgenden Fundorten: Bernstein, Jois, Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Arachnospila (Ammosphex) wesmaeli (Thomson, 1870)

Verbreitung: Europa, östlich bis Sibirien.

Untersuchtes Material: Apetlon, Fuchslotzacke 1 ♀ 21. 8. 1989.

Neu für das Burgenland.

Arachnospila (Anoplochares) minutula (Dahlbom, 1842)

Synonyme: *Pompilus cellularis* Dahlbom, 1843; *Pompilus neglectus* Dahlbom, 1843; *Anoplius inermis* Lepeletier, 1845; *Pompilus anoplius* Dalla Torre, 1897; *Pompilus (Anoplochares) minutulus simplicicrus* Priesner, 1960; *Arachnospila minutula apenninusurata* Wolf, 1970.

Verbreitung: Europa, östlich bis Ferner Osten.

Untersuchtes Material: Weiden a. See 1 ♂ 1 ♀ 10. 8. 1989.

Priesner (1968) führt folgende Fundorte an: Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Anoplius (Anoplius) caviventris (Aurivillius, 1907).

Synonyme: *Pompilus cardui* Perkins, 1917; *Anoplius carbonarius* Haupt, 1937; *Anoplius atricolor* Moczár, 1944.

Verbreitung: Mitteleuropa, Großbritannien, östlich bis Mittelasien.

Untersuchtes Material: Neusiedl a. See, Bahndamm 5 ♀ 25. 7. 1989, 1 ♀ 8. 8. 1989, 2 ♀ 17. 7. 1989 — Zitzmannsdorfer Wiesen 2 ♀ 10. 8. 1989.

Priesner (1968) führt Purbach als Fundort an.

Anoplius (Anoplius) nigerrimus (Scopoli, 1763)

Synonyme: *Sphex nigra* Fabricius, 1775; *Pompilus incisus* Tischbein, 1850; *Pompilus melanarius* Schenck, 1857; *Pompilus excerptus* Tournier, 1889; *Pompilus*

diffilis Tournier, 1889; *Pompilus nigerrimus* var. *kohli* Verhoeff, 1892; *Anoplius wheeleri* Banks, 1939; *Anoplius banksi* Dreisbach, 1950.

Verbreitung: Holarktis.

Untersuchtes Material: Apetlon, Fuchslochlacke 1 ♀ 21. 8. 1989 — Neusiedl a. See, Bahndamm 2 ♀ 17. 8. 1989, 1 ♀ 22. 8. 1989 — Zurndorf, Eichenwald-Hutweide 1 ♂ 1 ♀ 1. 9. 1989.

Priesner (1968) gibt folgende Fundorte an: Neusiedl a. See, Winden a. See.

Anoplius (Arachnophroctonus) infuscatus (Van der Linden, 1827)

Synonyme: *Pompilus minor* Herrich-Schaeffer, 1830; *Pompilus sericatus* Shuckard, 1835; *Pompilus chalibeatus* Schioedte, 1837; *Pompilus difformis* Schioedte, 1837; *Pompilus dispar* Dahlbom, 1843; *Pompilus sabulicola* Thomson, 1874; *Pompilus meticulous* Costa, 1882; *Pompilus aeruginosus* Tournier, 1890; *Pompilus aerarius* Tournier, 1890; *Pompilus argentatus* Tournier, 1890; *Pompilus calcatus* Tournier, 1890; *Pompilus onus* Tournier, 1890; *Pompilus stellatus* Tournier, 1890; *Pompilus utendus* Tournier, 1890; *Pompilus vivus* Tournier, 1890; *Pompilus xysticus* Tournier, 1890; *Anoplius petulans* Haupt, 1962; *Paracyphononyx cinctellus* Haupt, 1962; *Anoplius dispar lusitanicus* Wolf & Diniz, 1970; *Anoplius infuscatus fortunatus* Wolf, 1975; *Anoplius dispar simii* Wolf, 1978.

Verbreitung: Paläarktis.

Untersuchtes Material: Apetlon, Fuchslochlacke 1 ♂ 21. 8. 1989 — Neusiedl a. See, Lehmstetten. 1 ♂ 1 ♀ 11. 8. 1989.

Priesner (1968) führt folgende Fundorte an: Illmitz, Neusiedl a. See, Nickelsdorf, Winden a. See, Zurndorf.

Episyron albonotatum (Van der Linden, 1827)

Synonyme: *Pompilus rufipes* var. *simplex* Tournier, 1889; *Episyron ordinarius* Priesner, 1966; *Episyron ordinarius albisquamis* Priesner, 1966; *Episyron ordinarius corsicus* Priesner, 1966; *Episyron ordinarius sardonius* Priesner, 1966.

Verbreitung: Europa, östlich bis Ferner Osten.

Untersuchtes Material: Weiden a. See 1 ♂ 27. 7. 1989.

Priesner (1969) gibt unter *Episyron ordinarius* Priesner folgende Fundorte an: Neusiedl a. See, Nickelsdorf, Weiden a. See, Winden a. See.

Episyron rufipes (Linné, 1758)

Synonyme: *Sphex laevigata* Rossi, 1794; *Pompilus gracilis* Lepeletier, 1845; *Pompilus rufipes* var. *septemmaculatus* Wesmael, 1851; *Pompilus argyrolepis* Costa, 1887; *Pompilus compressus* Tournier, 1889; *Pompilus aequatus* Tournier, 1889; *Pompilus pygidialis* Tournier, 1889; *Pompilus rufipes* var. *fuscatus* Tournier, 1889; *Pompilus deuterus* Dalla Torre, 1897; *Pompilus ephialtes* Dalla Torre, 1897; *Episyron rufipes sardous* Wolf, 1961.

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Mittelasien.

Untersuchtes Material: Podersdorf 1 ♂ 27. 7. 1989.

Priesner (1969) führt folgende Fundorte an: Illmitz, Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Unterfamilie: Ceropalinae

Ceropales variegata (Fabricius, 1798)

Synonym: *Ceropales destefanii* Costa, 1887.

Verbreitung: Europa, Nordafrika, östlich bis Mittelasien.

Untersuchtes Material: Frauenkirchen 1 ♂ 5. 7. 1986.

Priesner (1969) gibt Winden a. See als Fundort an.

Systematisches Verzeichnis (Checklist) der Arten

Innerhalb der Unterfamilien werden die Gattungen und Arten alphabetisch angeführt. Von den Arten, die in dieser Arbeit nicht behandelt wurden, werden sowohl die von Priesner (1967, 1968, 1969) verwendeten Namen als auch die Fundorte angeführt.

Unterfamilie: Pepsinae

Gattung: *Auplopus* Spinola, 1841

carbonarius (Scopoli, 1763)

rectus (Haupt, 1927): Neusiedl a. See, Winden a. See (ssp. *pallipes* Priesner).

Gattung: *Caliadurgus* Pate, 1946

fasciatellus (Spinola, 1808)

Gattung: *Cryptocheilus* Panzer, 1806

fabricii (Van der Linden, 1827): Breitenbrunn, Jois (Jungerberg), Neusiedl a. See (Panzergraben), Winden a. See, Zurndorf.

notatus (Rossi, 1792): Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Oggau, Winden a. See (ssp. *affinis* Van der Linden).

richardsi Moczár, 1953: Winden a. See.

versicolor (Scopoli, 1763)

Gattung: *Dipogon* Fox, 1897

bifasciatus (Scopoli, 1763)

subintermedius (Magretti, 1886): Burgenland (*nitidum* Haupt).

Gattung: *Priocnemis* Schioedte, 1837

agilis (Shuckard, 1837)

cordivalvata Haupt, 1927

enslini Haupt, 1927: Breitenbrunn.

exaltata (Fabricius, 1775)

fastigiata Haupt, 1934: Jois, Parndorf.

gracilis Haupt, 1927: Neusiedl a. See; Neusiedl a. See, Weiden a. See (*huesingi* Wolf).

hankoi Moczár, 1944: Breitenbrunn, Neusiedl a. See, Winden a. See.
hyalinata (Fabricius, 1793)
mesobrometi (Wolf, 1958)
minuta (Van der Linden, 1827): Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurn-
 dorf (auch *f. italica* Haupt).
minutalis Wahis, 1979
parvula Dahlbom, 1845
pusilla (Schioedte, 1837)
schioedtei Haupt, 1927: Winden a. See.
sulci Balthasar, 1943: Breitenbrunn.
susterai Haupt, 1927: Breitenbrunn, Winden a. See.
vulgaris (Dufour, 1841)

Unterfamilie: Pompilinae

- Gattung: *Agenioideus* Ashmead, 1902
cinctellus (Spinola, 1808): Jois (Jungerberg), Neusiedl a. See (Panzer-
 graben), Winden a. See.
nubecula (Costa, 1874): Winden a. See, Zurndorf.
sericeus (Van der Linden, 1827): Jois, Neusiedl a. See, Winden a. See.
- Gattung: *Anoplius* Dufour, 1834
caviventris (Aurivillius, 1907)
infuscatus (Van der Linden, 1827)
nigerrimus (Scopoli, 1763): Neusiedl a. See, Winden a. See.
viaticus (Linné, 1758): Winden a. See.
- Gattung: *Aporinellus* Banks, 1911
sexmaculatus (Spinola, 1805): Breitenbrunn, Illmitz, Winden a. See.
- Gattung: *Aporus* Spinola, 1808
unicolor Spinola, 1808: Winden a. See (*femoralis* Van der Linden).
- Gattung: *Arachnospila* Kincaid, 1900
abnormis (Dahlbom, 1842)
anceps (Wesmael, 1851)
ausa (Tournier, 1890): Breitenbrunn, Winden a. See.
fumipennis (Zetterstedt, 1890): Jois (Jungerberg), Winden a. See.
fuscmarginata (Thomson, 1870): Winden a. See, Zurndorf.
minutula (Dahlbom, 1842)
rufa (Haupt, 1927): Jois (Jungerberg), Winden a. See.
spissa (Schioedte, 1837): Breitenbrunn, Winden a. See.
trivialis (Dahlbom, 1843): Neusiedl a. See, Nickelsdorf, Winden a. See,
 Zurndorf.
wesmaeli (Thomson, 1870)

Gattung: *Eoferreola* Arnold, 1935
rhombica (Christ, 1791)

Gattung: *Episyron* Schioedte, 1827
albonotatum (Van der Linden, 1827)
arrogans (Smith, 1873): Winden a. See (*funereipes* Costa).
rufipes (Linné, 1758): Illmitz, Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.

Gattung: *Evagetes* Lepeletier, 1845 (*Sophropompilus* Ashmead, 1902)
crassicornis (Shuckard, 1835): Bernstein, Oberwart.
dubius (Van der Linden, 1827): Jois, Neusiedl a. See, Winden a. See.
elongatus (Lepeletier, 1845): Winden a. See (*magretti* Kohl).
gibbulus (Lepeletier, 1845): Neusiedl a. See, Weiden a. See, Winden a. See (*pilosellus* Wesmael).
littoralis (Wesmael, 1851): Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.
pectinipes (Linné, 1758): Illmitz, Weiden a. See, Winden a. See.
siculus (Lepeletier, 1845): Winden a. See (*contemptus villicus* Tournier).
subglaber (Haupt, 1941): Winden a. See.
subnudus (Haupt, 1941): Neusiedl a. See, Winden a. See.
tumidosus (Haupt, 1941): Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf (ssp. *sinuatus* Haupt).

Gattung: *Ferreola* Lepeletier, 1845
diffinis (Lepeletier, 1845): Großhöflein.

Gattung: *Homonotus* Dahlbom, 1843
sanguinolentus (Dahlbom, 1843): Neusiedl a. See (Panzergraben), Winden a. See, Zurndorf.

Gattung: *Nanoclavelia* Haupt, 1962
leucoptera (Dahlbom, 1843): Neusiedl a. See (Panzergraben), Winden a. See, Zurndorf.

Gattung: *Pompilus* Fabricius, 1798
cinereus (Fabricius, 1775): Illmitz, Zurndorf (*pulcher* Fabricius)

Gattung: *Tachyagetes* Haupt, 1930
filicornis (Tournier, 1889): Neusiedl a. See, Nickelsdorf, Zurndorf.

Unterfamilie: Ceropalinae

Gattung: *Ceropales* Latreille, 1796
maculatus (Fabricius, 1775): Neusiedl a. See, Winden a. See, Zurndorf.
variegatus (Fabricius, 1798)

Literatur

- D a y , M. C., 1988: Spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae). — Handbk. Ident. Br. Insects 6, 4: 60 pp..
- O e h l k e , J. & W o l f , H., 1987: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Hymenoptera — Pompilidae. — Beitr. Ent. Berlin 37, 2: 279 — 390.
- P r i e s n e r , H., 1967: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs Teil II. — Naturkd. Jahrb. Linz 1967: 123 — 140.
- 1968: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs Teil III. — Naturkd. Jahrb. Linz 1968: 125 — 209.
- 1969: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs Teil IV. — Naturkd. Jahrb. Linz: 77 — 132.
- W a h i s , R., 1986: Catalogue systematique et codage des Hyménoptères Pompilides de la region Ouest-Européenne. — Notes faun. Gembloux 12: 91 pp..
- W o l f , H., 1972: Pompilidae (Hymenoptera). — Insecta Helvetica Fauna 5: 176 pp..

Beitrag zur Kenntnis der Cleptidae und Chrysididae des Burgenlandes (Hymenoptera, Chrysidoidea)

Von Michael M a d l , Frauenkirchen

Zusammenfassung

Die Familie Cleptidae ist im Burgenland mit 8 Arten vertreten. *Cleptes splendens* Fabricius ist neu für die Fauna des Burgenlandes. Von der Familie Chrysididae sind aus dem Burgenland 66 Arten und Unterarten aus 8 Genera bekannt. Folgende Arten konnten erstmals im Burgenland nachgewiesen werden: *Elampus bidens* Förster, *Holopyga ignicollis* Dahlbom, *Hedychridium lampadum* Linsenmaier, *Chrysis fasciata* Olivier, *Chrysis inaequalis* Förster, *Chrysis subsinuata fallax* Mocsáry.

Abstract:

Contribution to the knowledge of the Cleptidae and Chrysididae of Burgenland (Hymenoptera, Chrysidoidea) — In Burgenland the family Cleptidae is represented by 8 species. *Cleptes splendens* Fabricius is new to the fauna of Burgenland. 66 species and subspecies of 8 genera of the family Chrysididae are known from Burgenland. First records of following species are dealt with from Burgenland: *Elampus bidens* Förster, *Holopyga ignicollis* Dahlbom, *Hedychridium lampadum* Linsenmaier, *Chrysis fasciata* Olivier, *Chrysis inaequalis* Förster, *Chrysis subsinuata fallax* Mocsáry.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Burgenländische Heimatblätter](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Madl Michael

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Pompilidae des Burgenlandes \(Hymenoptera\) 18-27](#)