

Ein neuer Weißling für das Burgenland: Leptidea reali Reissinger 1989

(Lepidoptera, Pieridae)

von Heinz H a b e l e r , Graz

Durch Lorković 1993 aufmerksam gemacht, wurden Sammlungsbestände von *Leptidea sinapis* L. auf *Leptidea reali* Reiss. untersucht, da die für Europa neu erkannte Art bisher mit *Leptidea sinapis* L. verwechselt wurde. Die beiden Arten sind nach äußeren Merkmalen nicht sicher zu unterscheiden, wengleich es scheint, daß *L. reali* Reiss. öfter als *L. sinapis* L. auf der Unterseite der Hinterflügel, in der hinteren Hälfte, eine gleichmäßig grün-graue Färbung zeigt, während *L. sinapis* dort vorzugsweise ein aus Adern und Binden aufgebautes fleckenreiches Muster besitzt.

Erstes sicheres Exemplar für das Burgenland: Galgenhügel bei Rechnitz, 5. 5. 1984 Fauster leg., Habeler det. Präp.-Nr. 1598.

Aufgrund der bisher vorliegenden genitaldeterminierten Exemplare scheint sich folgendes Bild abzuzeichnen: In submontanen und kollinen Lagen kommt *Leptidea sinapis* L. gemeinsam mit *Leptidea reali* Reiss. vor. Aus höheren Berglagen der Steiermark wurden nur *L. sinapis* L. bekannt, wobei aber zu bedenken ist, daß eine so „gewöhnliche und häufige“ Art nicht flächendeckend dokumentiert ist. Überraschenderweise konnten von der Küste Dalmatiens und den Kvarner-Inseln Rab und Krk vorläufig ebenfalls nur *L. sinapis* L. sichergestellt werden.

Literatur:

Z. Lorković 1993: *Leptidea reali* Reissinger 1989 (= lorkovici Real 1988), a new European species (Lepid., Pieridae). *Natura Croatica* Bd. 2 Nr. 1:1 — 26, Zagreb.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Burgenländische Heimatblätter](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Habeler Heinz

Artikel/Article: [Ein neuer Weißling für das Burgenland: *Leptidea reali* Reissinger 1989 \(Lepidoptera, Pieridae\) 41](#)