

sehr großen Afterklappen eingesenkt. — Ein Männchen besitze ich leider nicht.

Ich habe dieses interessante Insekt Mitte September 1907 hinter dem Büchelhofe, d. i. neben dem Fußwege nach St. Primus, von einer jungen Eiche abgeschüttelt, von deren Saft es sich nährte. In Deutschland soll es sich auch auf Erlen, Pappeln und Ephen finden. Bemerkt sei noch, daß dieser Schnabelkerf der einzige europäische Vertreter der in Australien und Südasien sehr artenreichen Gattung *Ledra Fabr.* ist. Unter den sonstigen einheimischen Zirpen steht ihm die kleinere gehörnte Dornenzirpe (*Centrotus cornutus L.*) am nächsten, die aber zur Familie der Buckelzirpen (*Membracidae*) gehört; diese besitzt auf den Seiten des Vorderrückens je einen nach außen ragenden Fortsatz und überdies an dessen Hinterende einen wellenförmig gebogenen, weit nach hinten reichenden Dorn und ist jedenfalls viel häufiger als die Ohrenzirpe.

Dr. R. Latzel.

I. Nachtrag zum Verzeichnisse der bisher in Kärnten beobachteten Käfer.

Von Theodor Prosen.

(2. Fortsetzung.)

Helodidae.

Helodes minuta L. **v. laeta* Panz. Manchmal unter der Stammform.

— **Gredleri* Kiesw. Bei Unterdrauburg, sehr vereinzelt.

— **Bonvouloiri* Tourn. Eisenkappel.

— **marginata* F. Vereinzelt im ganzen Lande.

Microcara testacea L. In der Sattnitz bei Klagenfurt, mehrmals.

Cyphon coarctatus Payk. **v. palustris* Thoms. Auf feuchten Wiesen bei Klagenfurt, bisweilen in Anzahl.

Hydrocyphon deflexicollis Müll. Auch bei Unterdrauburg.

Eucinetus haemorrhous Dft. Auch bei Villach und Unterdrauburg, vereinzelt.

Dryopidae.

Dryops **lutulentus* Er. Von Gobanz bei Villach gesammelt.

— **nitidulus* Heer. In den Gailauen bei Reisach und Villach sehr zahlreich. Auch bei Grafenstein.

Esolus angustatus Müll. Auch im Gailtale an Waldbächen gefunden.

— **parallelepipedus* Müll. Villach, in den Gailauen, selten.

Latelmis Volckmari Panz. Grafenstein, Eisenkappel, Unterdrauburg, mehr minder selten.

— **opaca* Müll. Sattnitz bei Klagenfurt, selten.

— **Mülleri* Er. An der Glanfurt bei Klagenfurt, ein Stück.
Riolus cupreus Müll. An der Sattnitz und Glanfurt bei Klagenfurt, nicht selten.

— **subviolaceus* Müll. **v. auronitens* Kiesw. An der Glanfurt, selten.

— **nitens* Müll. Bei Villach und Klagenfurt (Glanfurt), nicht selten.

Helmis **Latreillei* Bedel. In Oberkärnten, an Waldbächen mehr minder selten.

— **Maugei* Bedel **v. Megerlei* Dfl. Im Gailtale und bei Grafenstein, auch am Ankogel, hochalpin, nicht selten.

— **obscura* Müll. Im Gailtale und bei Unterdrauburg, selten.

Georyssidae.

Georyssus crenulatus Rossi **v. integrostriatus* Motsch. Hie und da unter der Stammform.

— **substriatus* Heer. Gailtal, Grafenstein, Unterdrauburg, vereinzelt.

— **caclatus* Er. Mit voriger Art, stellenweise nicht selten.

Heteroceridae.

Heterocerus **fenestratus* Thunbg. Unterdrauburg, am Draufufer, selten.

— **fuscus* Kiesw. Wie voriger.

— **hispidulus* Kiesw. Desgleichen.

— **pruinus* Kiesw. Gailauen, nicht selten. Auch bei Eisenkappel gesammelt.

— **sericans* Kiesw. Unterdrauburg, nicht selten.

*Micilus *murinus* Kiesw. Gailufer, auch bei Eisenkappel, sehr selten.

Dermestidae.

*Globicornis *nigripes* F. Gailtal, nach Klimsch auf *Spiraea* nicht selten.

*Trogoderma *nigrum* Hbst. Bei Villach. Holler fing ein Stück auf der Petzen.

Ctesias serra F. Klagenfurt, vereinzelt.

*Anthrenus *fuscus* Oliv. Villach, sehr selten.

Byrrhidae.

*Byrrhus *arietinus* Steff. In höheren Lagen, sub- und hochalpin, vereinzelt.

— **glabratus* Heer. In den Karawanken, ziemlich selten.

— **picipes* Dft. Gurktaleralpen (Fladnitz, Leitersteg, 2100 Meter), Hochobir, vereinzelt.

— — **v. amphibolus* Ganglb. Im Kopreingraben an der Petzen von Holler gesammelt.

*Curimus *petraeus* Gredl. E. Klimsch fing ein Stück hochalpin am Reißkofel.

*Syncalypta *striatopunctata* Steff. Bei Unterdrauburg im Geniste der Drau, ein Stück.

Elateridae.

*Corymbites *castaneus* L. Bei Sachsenburg und am Wörthersee, vereinzelt.

— **Zenii* Rosenh. Bei Raibl von Forstrat Gobanz gefangen.

Agriotes liliginosus Rossi **v. Laichartingi* Gredl. Bei Villach (Teufelsgraben) von Schatzmayr in zwei Stücken gefangen.

— **acuminatus* Steph. Bei Eisenkappel, ein Stück.

— **pallidulus* Illig. Bei Klagenfurt (Sattnitz), ein Stück.

Ludius ferrugineus L. Auch im Gailtale.

*Silesis *terminatus* Er. Bei Villach von Gobanz gesammelt.

Adrastus limbatus F. **v. turcicus* Strl. Diese albanische Form fing Gobanz bei Eisenkappel.

— **lacertosus* Er. Bei Villach, selten.

- Hypnoides *tenuicornis* Germ. In den Gailauen, nicht selten.
- *pulchellus* *v. *exiguus* Rand. Hie und da unter der Stammform.
- *dermestoides* Hbst. *a. *humeropectus* Buyss. und *a. *bi-pustulatus* Schilsky. In Gesellschaft der Stammform mehr minder häufig.
- **flavipes* Aubé. Am Fuße des Luschariberges von Schatzmayr gesammelt.
- **meridionalis* Lap. Gailtal, Gurkufer bei Grafenstein, Unterdraunburg, öfters in Anzahl.
- Cardiophorus *melampus* Illig. Bei Villach, ein Stück (Schatzmayr).
- Betarmon ferrugineus* Scop. Auch in den Gailauen bei Villach nicht selten.
- Drasterius bimaculatus* Rossi. Die Aberrationen **variegatus* Küst., **sexsignatus* Buyss., **basalis* Rtt., **binotatus* Rossi hie und da unter der Stammform.
- Elatér *pomona* Steph. Bei Villach.
- *sanguinolentus* Schrank *v. *immaculatus* Schauf. Vereinzelt unter der Stammform.
- **ruficeps* Muls. Bei Mörttschach im oberen Mölltale.
- Athrú vittatus* F. *a. *Stephensi* Buyss. und
- — *v. *Oskayi* Kiesw. Unter der Stammform, mehr minder selten.
- **cavifrons* Redtb. Nach Klimsch im Gailtale, nicht selten.
- **angulifrons* Rtt. Bei Eisenkappel, selten.
- Denticollis linearis* L. *a. *suturalis* Dft. Hie und da unter der Stammform.

Eucnemidae.

- Melasis buprestoides* L. Im Gailtale und bei Eisenkappel, mehr minder selten.
- Eucnemis *capucina* Ahr. Bei Villach, Klagenfurt und Kraßnitz (Gurktal), vereinzelt.
- Dirrhagus *lepidus* Rosenh. Bei Villach und Eisenkappel, an letzterem Orte wiederholt in Anzahl von Forstrat Gobanz gesammelt.

Dirrhagus pygmaeus F. Auch im Gailtale wiederholt beobachtet.

— **Emyi Rouget*. Diese gallische Art sammelte Forstrat Gobanz bei Unterdrauburg.

Hypococclus procerulus Mannh. Bei Eisenkappel, nicht sehr selten.

Hylobius corticalis Payk. Vellach bei Eisenkappel, ein Stück.

Drapeles biguttatus Pill. Bei Eisenkappel von Forstrat Gobanz gesammelt, sehr vereinzelt.

Buprestidae.

*Dicerca *moesta* F. Gobanz fing ein Stück bei Eisenkappel.

*Poecilonota *festiva* L. Kraßnitz im Gurktale, auch bei Villach, auf *Juniperus*, sehr selten.

*Buprestis *9-maculata* L. Villach, vereinzelt.

*Chrysobothris *Solieri* Lap. Klagenfurt, ein Stück (Holler).

*Agrilus *subauratus* Gebl. Bei Klagenfurt und Paternion, sehr selten.

— *viridis* L. Die Varietäten **fagi* Ratzb. und **ater* F. hie und da unter der Stammform.

— **minusculus* Marsh. Kraßnitz im Gurktale, ein Stück.

— *derasofasciatus* Lac. Auch von Schatzmayr bei Warmbad Villach gesammelt.

— **hyperici* Crtz. Bei Klagenfurt (Klimsch).

— *obscuricollis* Kiesw. Auch im Gailtale.

*Aphanisticus *pusillus* Oliv. E. Klimsch fing ein Stück am Lurnfelde auf Eiche.

Lymexylidae.

Hylecoetus dermestoides L. **v. Marci* L. und **v. morio* F. Unter der Stammform, vereinzelt.

Ptinidae.

*Niptus *hololeucus* Falderm. Unterdrauburg, auch Metnitztal, vereinzelt.

Ptinus rufipes Oliv. Vereinzelt im ganzen Lande.

— **bicinctus* Sturm. Unterdrauburg.

— **dubius* Sturm. Bei Klagenfurt, vereinzelt.

Anobiidae.

*Ernobius *tabidus* Kiesw. Bei Eisenkappel von Gobanz gefangen.

Ernobius **parvicollis* Muls. Bei Kraßnitz im Gurktale, ein Stück.

— **pini* Sturm. Bei Klagenfurt, sehr selten.

Anobium **fagi* Muls. Bei Eisenkappel, vereinzelt.

Trypophytus **carpini* Hbst. Unterdrauburg.

Caenocara *bovistae* Hoffm. Über ganz Kärnten verbreitet und stellenweise nicht selten.

— — **v. castaneae* Grell. Bei Klagenfurt (Siebenhügel).

— **affinis* Sturm. Ebendort.

Oedemeridae.

Calopus *serraticornis* L. Auch bei Unterdrauburg.

Xanthochroa **gracilis* Schmidt. Nach Klimsch in den Alpen des Metnitztales.

Oedemera *subulata* Oliv. Klagenfurt, Karawanken und Gailtal nicht selten.

Pythidae.

Pytho **depressus* L. Techendorf (Ossiachersee), nicht häufig.

Lissodema **4-pustulatum* Marsh. Bei Eisenkappel und Unterdrauburg.

Sphaeriestes **mutilatus* Beck. In den Karawanken, vereinzelt.

Hylophilidae.

Hylophilus **lateralis* Grell. Von Forstrat Gobanz bei Ossiach gefangen.

Anthicidae.

Mecynotarsus **serricornis* Panz. Bei Villach, Grafenstein und Unterdrauburg, am Drau- und Gurkufer im Frühjahr oft in großer Zahl.

Anthicus **humilis* Germ. Gailtal, selten.

— *floralis* L. **var. formicarius* Goeze. Unter der Stammform.

— **bifasciatus* Rossi. Bei Villach, ein Stück.

Meloidae.

Zonabris **variabilis* Pallas. Diese südeuropäische Art soll nach Gobanz bei Villach beobachtet worden sein.

Mordellidae.

Tomoxia biguttata Gyll. Auch in den Karawanken, selten.

Mordella **aurofasciata* Com. Bei Villach, sehr selten.

— **bipunctata* Germ. Bei Villach, sehr vereinzelt.

— *aculeata* L. **a. leucaspis* Küst. Bei Villach, ein Stück.

Mordellistena abdominalis F. **a. maculicollis* Schilsky. Unter der Stammform, hie und da.

— *humeralis* L. Die Aberrationen **axillaris* Gyll., **nigricollis* Schilsky, **fulvipennis* Schilsky, **atrata* Schilsky unter der Stammform, stellenweise nicht selten.

— *neuwaldeggiana* Panz. Vereinzelt im ganzen Lande.

— **micans* Germ. Gurktal, Klagenfurt, mehr minder häufig.

— **stenidea* Muls. Villach, ein Stück.

Cyrtanaspis **phalerata* Germ. Bei Unterdrauburg, selten.

Anaspis frontalis L. **v. verticalis* Fald. Diese kaukasische Form fing Schatzmayr in einem Stücke am Dobratsch.

— **subtestacea* Steph. Bei Villach, vereinzelt.

— **subtilis* Hampe. Bei Maria Gail in mehreren Stücken von Schatzmayr gesammelt (W. E. Z. 1903, pag. 172).

— **carians* Muls. Im Gailtale und bei Villach, mehr minder selten.

Melandryidae.

Hallomenus **axillaris* Illig. Bei Eisenkappel.

Orchesia **acicularis* Reitt. Eisenkappel, in wenigen Stücken gesammelt.

— *micans* Panz. Nach Klimsch auch im oberen Gailtale.

— *minor* Walk und

— *undulata* Kr. Auch bei Eisenkappel.

Anisoxya **fuscata* Illig. Bei Eisenkappel, sehr selten.

Phloeotrya **subtilis* Reitt. Eisenkappel, ein Stück.

— *rufipes* Gyll. Kleblach und Eisenkappel, mehr minder selten.

Xylita livida Sahlb. In den Karawanken (Bodental, Eisenkappel), sehr selten.

Serropalpus barbatus Schall. In Oberkärnten (Kötschach, Weisbriach), in wenigen Stücken.

*Hypulus *bifasciatus* F. Bei Klagenfurt und Unterdrauburg, vereinzelt.

Alleculidae.

Allecula morio F. Auch bei Eisenkappel.

Gonodera luperus Hbst. **a. ferruginea* F. Unter der Stammform, nicht sehr selten.

— **antennata* Panz. Diese südliche Art wurde bei Villach in einem Stücke erbeutet.

Mycetochara axillaris Payk v. *morio* Rdtb. Auch bei Klagenfurt.

— **thoracica* Gredl. Nach Schaschl auch in Kärnten gesammelt.

Omophlus lepturoides F. Von Gobanz auch bei Villach gefangen.

Tenebrionidae.

*Blaps *gigas* L. Ein lebendes Stück dieser südlichen Art fand sich nach Klimsch in Ferlach.

— **mucronata* Latr. Unterdrauburg, ein Stück.

Crypticus quisquilius L. Umgebung von Klagenfurt, nicht selten.

Diaperis boleti L. **v. morio* Baudi. Bei Villach, unter der Stammform.

Arrhenoplita haemorrhoidalis F. Im Gailtale bisweilen sehr zahlreich.

*Hypophloeus *pini* Panz. Wie vorige Art.

— **bicolor* Oliv. Nach Schaschl in Kärnten beobachtet.

*Melasia *Perroudi* Muls. Diese südliche Art sammelte Gobanz mehrmals bei Unterdrauburg.

*Helops *lanipes* L. In morschem Holze verbreitet und nirgends selten.

Cerambycidae.

Rhamnusium bicolor Schrk. Auch bei Unterdrauburg.

Xylosteus Spinolae Friv. Diese seltene Art wurde auch in Oberkärnten (Raibl, Arnoldstein, Bleiberg und Heiligengeist bei Villach) gesammelt.

Acmaeops septentrionis Thoms. **v. simplonica* Stierl. Mallnitzer Tauern, selten.

Cortodera femorata F. *a. *flavipennis* Rtt. Tarvis (Schlitzschlucht), Sachsenburg, sehr vereinzelt.

Pidonia lurida F. *a. *Ganglbaueri* Ormay. Hie und da unter der Stammform.

Nivellia sanguinosa Gyll. Ein Stück dieser nordischen Art erhielt Klinsch aus den Metnitztaleralpen.

Leptura sexguttata F. *a. *exclamationis* F. Von Kanschegg bei Kleblach-Lind gefangen.

— *pubescens* F. Auch bei Raibl und auf der Petzen.

Caenoptera **Kiesenwetteri* Muls. In den Karawanken, vereinzelt.

Anisarthron barbipes Schrk. Auch in den Gailauen, selten.

Rhopalopus hungaricus Hbst. Arnoldstein, ein Stück.

Purpuricenus Koehleri L. Nach Gobanz bei Villach.

Plagionotus arcuatus L. Auch bei Unterdrauburg.

Xylotrechus rusticus L. Im Gail- und Drautale, mehr minder selten.

Clytanthus Herbsti Brahm. Auch in den Gailauen.

— **sartor* F. Bei Klagenfurt, nicht häufig.

Monochamus galloprovinzialis Oliv. v. *pistor* Germ. Auch bei Villach und Eisenkappel.

Exocentrus lusitanus L. Vereinzelt auch bei Klagenfurt.

Pogonochaerus decoratus Fairm. Bei Klagenfurt, Eisenkappel und Unterdrauburg, überall selten.

— **ovatus* Goeze. In Unterkärnten, vereinzelt.

Anaesthetis testacea F. Von Schatzmayr bei Villach in zwei Stücken gefangen.

Saperda similis Laich. Warmbad Villach, ein Stück (Gobanz).

— *8-punctata* Scop. Auch bei Villach.

Menesia bipunctata Zoubk. Bei Klagenfurt und Villach, selten.

Stenostola nigripes F. Von Gobanz bei Unterdrauburg gesammelt.

Phytoecia affinis Harrer. Auch bei Eisenkappel.

— **rufipes* Oliv. Nach Schatzmayr bei Villach (St. Leonhard).

— *a. *Schreiberi* Ganglb. Von Forstrat Gobanz bei Eisenkappel in einem Stücke gefangen.

*Phytoecia *cylindrica* L. Im ganzen Lande verbreitet, mehr minder häufig.

— **uncinata* Redtb. Bei Eisenkappel, ein Stück.

Oberea pupillata Gyll. Im Gailtale und bei Eisenkappel.

— *erythrocephala* Schrk. Auch bei Unterdrauburg.

Chrysomelidae.

Donacia marginata Hoppe **a. unicolor* Westh. Vereinzelt unter der Stammform.

— **antiqua* Kunze. Am Wörthersee (Loretto), sehr selten.

— **vulgaris* Zschach. Mit voriger Art, selten.

— **cinerea* Herbst. Am Wörthersee und an der Glanfurt, nicht häufig.

Orsodaene cerasi L. Auch die Aberrationen **melanura* F. und **limbata* Ol. unter der Stammform, vereinzelt.

*Lema *puncticollis* Curt. Kraßnitz im Gurktale, selten.

*Coptocephala *rubicunda* Laich. Bei Klagenfurt, nicht häufig.

Cryptocephalus 6-punctatus L. **a. pictus* Suffr. Unter der Stammform.

— *albolineatus* Suffr. Auch Mallnitzer Tauern, selten.

— *Schäfferi* Schrank. Auch am Freudenberg in zwei Stücken gesammelt.

— *violaceus* Laich. **a. smaragdinus* Suffr. Stellenweise ziemlich häufig.

— *10-maculatus* L. **a. scenicus* Ws. Bei Unterdrauburg. Die Stammform wurde im Lande noch nicht beobachtet.

— *frenatus* Laich. **a. Fabricii* Ws. Im Gailtale unter der Stammform.

— *4-pustulatus* Gyllh. *a. rhaeticus* Heyd. Auch in Oberkärnten wiederholt gesammelt.

— *flavipes* F. Die Aberrationen **nigrescens* Gratl und **signatifrons* Suffr. bei Klagenfurt nicht selten.

— *bilineatus* L. **a. moestus* Ws. Umgebung von Klagenfurt und Karawanken, vereinzelt.

— **exiguus* Schneid. Umgebung von Klagenfurt, nicht selten.

*Cryptocephalus *fulvus* Goeze. Oberkärnten, mehr minder häufig.

— *pusillus* F. *a. *Marshami* W. Verbreitet und stellenweise nicht selten.

Pachybrachis hippophaës Suffr. Nach E. Klimsch in den Gailauen auf Weiden ziemlich häufig.

— *picus* Ws. Ebendort, von E. Klimsch in zwei Stücken gesammelt.

Gastroidea polygoni L. *a. *ruficollis* F. Unter der Stammform stellenweise nicht selten.

Chrysomela coerulea Oliv. Am Fuße des Hochobir, in der Seisera und bei Mieß, nicht selten.

— *marcasitica* Germ. *v. *turgida* Ws. Dobratsch, Gurnitz und Unterdrauburg, mehr minder selten.

— *purpurascens* Germ. *v. *avia* Ws. Bei Unterdrauburg.

— **crassicollis* Suffr. Bei Unterdrauburg.

— *fastuosa* Scop. *a. *speciosa* L. Unter der Stammform mehr minder häufig.

— *varians* Schaller *a. *aethiops* F. Bei Klagenfurt, sehr vereinzelt.

— **Hoffmanni* Ganglb. In der Gamsgrube auf der Pasterze 1908 entdeckt. Sie findet sich unter lose aufliegenden Steinen. (Zoolog.-bot. Gesellsch., 1909, pag. 366.)

Chrysochloa tristis F. *a. *smaragdina* Ws. In den Karawanken, selten. Nach E. Klimsch in den Gailauen bei Kirchbach nicht selten.

— **rugulosa* Suffr. Obervellach, sehr selten.

— *frigida* Ws. Forstrat Gobanz sammelte die Art auch bei Döllach im Mölltale.

Phytodecta rufipes Deg. *a. *6-punctatus* F. Unter der Stammform nicht selten.

— **Gobanzi* Reitt. Von Forstrat Gobanz bei Raibl gesammelt.

— *pallidus* L. *a. *nigripennis* Ws. Eisenkappel, vereinzelt.

Phaedon cochleariae F. *a. *neglectus* Sahlb. Unter der Stammform, verbreitet.

Melasoma aenea L. *a. *vitellinae* Scop. Verbreitet und nicht selten.

Melasoma 20punctata Scop. **a. pustulata* Ws. Unter der Stammform, vereinzelt.

Luperus gularis Gredl. Vereinzelt auch bei Oberdrauburg und im Gailtale.

Derocrepis **serbica* Kutsch. Diese südosteuropäische Art sammelte Forstrat Gobanz bei Eisenkappel.

Chalcoides **lamina* Bedel. Nach E. Klimsch in der Sattnitz bei Klagenfurt auf jungen Pappeln. Auch die Aberrationen **saphirina* Ws., **aeruginosa* Ws., **cuprea* Ws.

Psylliodes **thlaspi* Foudr. Unterdrauburg.

— **cuprea* Koch. Im Gailtale, sehr selten.

— **fusiformis* Illig. Bei Villach, sehr vereinzelt.

Hallica **saliceti* Ws. Im Gailtale, sehr häufig.

— *oleracea* L. **a. nobilis* Ws. und **a. lugubris* Ws. Unter der Stammform mehr minder häufig.

Phyllotreta tetrastigma Com. **a. dilatata* Thoms. Nirgends selten.

— **atra* F. Im Gailtale nach E. Klimsch, vereinzelt.

Aphthona coerulea Geoffr. v. *pseudacori* Marsh. Eisenkappel, von Forstrat Gobanz gesammelt.

Longitarsus **fulgens* Foudr. Bei Feldkirchen im Frühjahr nicht selten.

— *suturalis* Marsh. Oberkärnten, hie und da in größerer Anzahl.

— **suturellus* Duft. Bei Klagenfurt, sehr vereinzelt.

— **viduus* All. Bei Unterdrauburg, selten.

— **curtus* All. Wie vorige Art.

— **nigrofasciatus* Goeze. Ebenfalls bei Unterdrauburg.

— *exoletus* L. Auch bei Klagenfurt nicht selten.

— **rubiginosus* Foudr. Nach E. Klimsch im Gailtale, vereinzelt.

Dibolia rugulosa Redtb. Von Forstrat Gobanz bei Unterdrauburg gesammelt.

— *cynoglossi* Koch. Bei Klagenfurt und Unterdrauburg wiederholt gefangen.

Cassida rufopirens Suffr. Nach Gobanz auch bei Unterdrauburg.

— *stigmatica* Suffr. Auch bei Eisenkappel, selten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [101](#)

Autor(en)/Author(s): Proßen Theodor

Artikel/Article: [I. Nachtrag zum Verzeichnisse der bisher in Kärnten beobachteten Käfer \(2. Fortsetzung\) 127-138](#)