

Ein neuerlicher Beitrag zur Schmetterlings- fauna Kärntens.

Von Josef Thurner (Klagenfurt).

(Fortsetzung.)

II. Microlepidoptera.

Herr Dr. Egon Galvagni (Galv.) in Wien hat mir nachträglich eine Liste der von ihm im Nockgebiete (Flattnitz, Haidner Höhe, Turracher Höhe usw.) sowie im Gebiete des Weißensees aufgefundenen Microlepidopteren übermittelt, welche in vorliegender Arbeit mitverwendet werden konnte. In dieser Liste fanden sich auch Funddaten von Micros, welche von Herrn Hofrat Ingenieur Kautz in Wien im Glocknergebiete festgestellt wurden.

Crambus luteellus S. V. Ende August bei Dellach am Millstätter See (Kosch.).

Crambus perlellus Sc. Im Juli bei Zell Pfarre auch in der Form *waringtonellus* Stt. (Kosch.). Im August am Döbriacher Moore und bei Dellach am Millstätter See sowie am 18. Juli im Plöckengebiete bei 1300 m (Kosch.). Bei Tarvis von Galv. am 14. Juli festgestellt.

Crambus languidellus Z. Haidner Höhe am 3. Juli ein Pärchen (Galv.).

Crambus radiellus Hb. Haidner Höhe, Stangenock und Turracher Höhe im Juli (Galv.).

Crambus furcatellus Zett. Stangenock im Nockgebiete am 30. Juli (Galv.).

Crambus pyramidellus Tr. Im Loibltale häufig (Thurn.). Kosch. bezeichnet die Art von der Grasalm in der Koschuta (Karawanken) Ende Juni und vom Plöcken Mitte Juli. — Pfandscharte (Kautz), Haidner Höhe Mitte Juli (Galv.).

Crambus conchellus S. V. In höheren Lagen des Loibl- und Zelltales am Kahlkogel in den Karawanken mehrfach im Juni—Juli. — Kosch. bekam sie bei Zell Pfarre, am Aufstiege zur Millstätter Alm und am Plöcken, Galv. auf der Flattnitz, Kautz im Glocknergebiete.

Crambus myellus Hb. Häufig in der Umgebung Klagenfurts. Ulrichsberg (Thurn.), Zell Pfarre Ende Juni in variablen Stücken (Kosch.), Naggl am Weißensee im Juli (Galv.).

Crambus specularis Hb. Flattnitz bei den hinteren Wänden Anfang Juli (Galv.).

Crambus falsellus S. V. Loibltal einzeln (Thurn.), Zell Pfarre zwei Männchen am 24. Juli (Kosch.), Flattnitz Juli—August (Galv.).

Crambus craterellus Sc. Im Klagenfurter Becken nicht selten. Auch bei Friesach häufig.

Crambus ericellus Hb. Bei Zell Pfarre ein Stück am 27. Juli (Kosch.).

Nr. 49. **Crambus uliginosellus** Z. Bei Hermagor und Liesing im Lesachtale von Proh. Ende Juli festgestellt. Neu für Kärnten.

Nr. 50. **Homoeosoma nimbellum** Z. Am 2. Juli 1924 erhielt ich bei Klagenfurt ein Männchen (vid. Proh.). Am 29. Juni 1935 bei Zell Pfarre (Kosch.) und am 15. Juni auch bei Hermagor (Proh.). Neu für Kärnten.

- Nr. 51. *Homoeosoma binaevellum* Hb. Flattnitzhöhe am 3. Juli ein Stück dieser für Kärnten neuen Art von Galv. erbeutet.
- Plodia interpunctella* Hb. Ein Stück am 20. August 1920 bei Klagenfurt erhalten (Thurn.).
- Ephestia elutella* Hb. Der Kuriosität wegen erwähne ich nur, daß ich die Art aus Raupen zog, die ich in einem Lebensmittelgeschäft in dort lagerndem gestoßenem Paprika fand.
- Hyphantidium terebrellum* Zk. Am 29. Juli ein Männchen und am 27. Juni ein Weibchen bei Zell Pfarre (Kosch.).
- Zophodia convolutella* Hb. Ein Stück von Hbf. am 10. Mai bei Hüttenberg erhalten.
- Nr. 52. *Salebria adelphella* F. R. Diese für das Land noch nicht festgestellte Art erhielt ich am 9. Juni 1917 im Joibltale (det. Hauder), ein weiteres Weibchen am 13. Mai 1934 in der Sattnitz am Lichte (Thurn.).
- Salebria obductella* Z. fand Proh. Mitte August bei Hermagor. — Ein Stück erhielt auch ich am 15. Mai 1935 bei Klagenfurt.
- Salebria fusca* Hw. erhielt ich am 17. Juli auf der Saualpe bei 1600 m und am 3. Mai bei Klagenfurt. — Galv. verzeichnet sie von der Turracher Höhe vom 19. September.
- Nephopteryx hostilis* Stph. Ein verdunkeltes Weibchen erhielt Kosch. am 27. Juni 1935 am Lichte bei Zell Pfarre.
- Nr. 53. *Dioryctria splendidella* H. S. Bei Klagenfurt am Maria Saaler Berge und Ulrichsberge mehrfach Mitte Juli—August am Lichte, einzeln noch bis Mitte September (det. Kautz). Am 12. Juli erhielt sie auch Hbf. am Lichte bei Hüttenberg. — Neu für Kärnten.
- Nr. 54. *Dioryctria Schützeella* Fuchs. Zwei sichere Männchen (vid. Preißcker) bekam Kosch. bei Zell Pfarre. — Neu für Kärnten.
- Acrobasis consociella* Hb. Am 11. Juli 1927 ein Stück am Maria Saaler Berge am Lichte erbeutet (det. Proh.).
- Rhodophaea rosella* Sc. Sehr einzeln am Lichte am Maria Saaler Berge wie bei Maria Rain (Thurn.). Dellach am Millstätter See am 26. Juli zwei Männchen (Kosch.).
- Rhodophaea suaveola* Zk. Ein einzelnes Stück am 18. August 1926 am Maria Saaler Berge am Lichte (Thurn., det. Proh.).
- Glyptoteles leucacrinella* Z. Ein auffallend dunkles Weibchen am 2. Juli 1924 bei Klagenfurt erbeutet (Thurn., det. Proh.).
- Myelois cribrella* Hb. Einzeln am Lichte in der Umgebung Klagenfurts (Thurn.).
- Endotricha flammealis* S. V. Im August mehrfach am Lichte in der Umgebung Klagenfurts, darunter auch die v. *adustalis* Tur. nicht selten (Thurn.). Bei Dellach am Millstätter See Ende Juli mehrere Männchen (Kosch.).
- Nymphula nymphaea* L. Flattnitz in zweiter Generation am 20. September (Galv.).
- Nymphula stratiotata* L. Ein Männchen am 7. Juni 1936 beim Lichte am Ulrichsberge, was nicht wundernehmen darf, da sich auf diesem Berge auch kleinere Sümpfe befinden. — Flattnitz am 11. September (Galv.).
- Stenia punctalis* S. V. Im August—September einzeln am Lichte am Maria Saaler Berg und Ulrichsberg (Thurn.).
- Perinephele lancealis* S. V. Am 29. Juni am Obir bei 1800 m und am 10. Juni ein Stück bei Eberstein (Thurn.).
- Nr. 55. *Scoparia ulmella* Knaggs. Flattnitz, weißer Fels bei Flattnitz, Anfang bis Mitte Juli (Galv.). Neu für Kärnten.
- Scoparia Zelleri* Wk. Am 20. Juli 1931 im Angerbachtale (Plöcken) bei ca. 1400 m (Kosch.).

- Nr. 56. *Scoparia basistrigalis* Knaggs. 5. Juli ein Männchen bei Tarvis (Thurn.). Neu für Kärnten.
- Scoparia ingrata* Z. Von Kosch. Ende Juni—Juli in der Koschuta auf der Grasalm (ca. 1500 m) und am 29. Juni von mir am Obir getroffen. Flattnitz, weißer Fels, Ende Juni, Anfang Juli (Galv.).
- Scoparia dubitalis* Hb. Ulrichsberg und Loibltal im Juni mehrfach. Kosch. fand auch bei Zell Pfarre ein schwachgezeichnetes Weibchen.
- Scoparia manifestella* H. S. Nahe der kärntnerischen Grenze bei der Tschechischen Hütte in den Sanntaler Alpen Ende Juni festgestellt (Thurn.).
- Scoparia valesialis* Dup. Im Glocknergebiet bei 2300 bis 2600 m von Kautz im Juli erhalten.
- Scoparia laetella* Z. Ende Juni bis Ende Juli einzeln (3 Stück) bei Zell Pfarre (Kosch.).
- Agrotera nemoralis* Sc. Ist öfters in der Umgebung Klagenfurts anzutreffen. Ein Stück traf ich auch Mitte Juni im Loibltale.
- Nr. 57. *Glyphodes unionalis* Hb. Ein Stück dieser für Kärnten neuen Art erhielt Sieder Ende Juni am Lichte in der Sattnitz.
- Orenaia lugubralis* Ld. Glocknergebiet, Gamsgrube (Kautz).
- Evergestis frumentalis* L. Ich fing den Falter einmal am 22. Juni beim Lichte am Ulrichsberg, weiters im Juli 1922 einzeln bei Mauthen im Gailtale, Habf. schließlich auch am 13. Juni bei Hüttenberg.
- Evergestis extimalis* Sc. Von Mitte Juni bis Mitte August einzeln bei Klagenfurt, Ulrichsberg (Thurn., Sieder).
- Nr. 58. *Phlyctenodes palaealis* Schiff. Auch von Herrn Sieder wurde mir ein Männchen dieser für Kärnten neuen Art überbracht, welches er bei Klagenfurt erbeutete.
- Phlyctenodes verticalis* L. Bei Klagenfurt mehrfach im Mai—Juni. Auch am Ulrichsberg Ende Juni mehrfach am Lichte (Thurn.). Zell Pfarre zwei Männchen am 27. Juni (Kosch.).
- Phlyctenodes sticticalis* L. Haidner Höhe, hintere Wände bei Flattnitz Anfang Juli (Galv.).
- Mecyna polygonalis* Hb. Bei Klagenfurt im Mai und August mehrfach. Am 5. Juni auch auf der Matschacher Alm in den Karawanken (Thurn.).
- Cyneda dentalis* S. V. In der Umgebung Klagenfurts einzeln (Thurn.). Dellach am Millstätter See am 23. August ein Männchen (Kosch.). Plöcken Ende Juni ein Männchen (Thurn.).
- Titanio pollinalis* S. V. Überall bei Klagenfurt im Frühjahr häufig. Ulrichsberg, Maria Rain, Rosental (Thurn.).
- Pionea crocealis* Hb. Von Kosch. ein Weibchen am 18. Juli am Plöcken bei ca. 1300 m.
- Pionea stachydalis* Germ. Am 15. Juni ein einzelnes Weibchen in der Stadt Klagenfurt erhalten (Thurn.).
- Pionea forficatalis* L. Ich bekam ein Stück am 16. Juni im Loibltale bei ca. 1100 m, Kosch. ein Pärchen im Juli bei Zell Pfarre. Friesach am 22. Juni, Flattnitz Anfang Juli (Galv.).
- Pionea rubiginalis* Hb. Bei Klagenfurt und am Ulrichsberg einzeln Mitte Juni bis Juli (Thurn.).
- Pionea decrepitalis* H. S. Tarvis—Florianska am 17. Juli zwei Stück (Galv.).
- Pionea olivialis* S. V. Im Juli einzeln im Rosentale (Thurn.). Ein Pärchen im Juli bei Zell Pfarre (Kosch.).
- Pyrausta terrealis* Tr. Ein Männchen am 13. Juli beim Plöckenhaus (1300 m) (Kosch.). Flattnitzhöhe am 7. Juli (Galv.).

- Pyrausta sambucalis** S. V. Einzeln bei Klagenfurt und am Ulrichsberg Mai—Juni (Thurn.). Flättnitz am 9. Juli (Galv.).
- Pyrausta repandalis** S. V. Einmal am 20. Juli 1927 am Lichte am Ulrichsberg (Thurn., det. Kautz).
- Pyrausta flavalis** S. V. Mehrfach in der Umgebung Klagenfurts (Thurn.).
- Pyrausta austriacalis** H. S. Flättnitz am 1. Juli (Galv.).
- Pyrausta porphyralis** S. V. Flättnitz, hintere Wände, Anfang Juli (Galv.).
- Pyrausta falcatalis** Gn. Bei Friesach am Geiersberg am 24. Juni häufig (Galv.). Die v. *chermesinalis* Gn. fand Preißer am Predil Mitte Juli.
- Platyptilia Zetterstedti** Z. v. *doronycella* Fuchs. Je ein Männchen am 30. Juni und 9. Juli 1935 in der Koschuta (Kosch.).
- Alucita baliodactyla** Z. Am 27. Juli erhielt Kosch. ein Männchen bei Zell Pfarre.
- Pterophorus carphodactylus** Hb. Ende Juli am Obir (Thurn.). Am 10. Juli 1935 auf der Setitsche (1600 m) in den Karawanken von Kosch. festgestellt.
- Stenoptilia pterodactyla** L. Am Maria Saaler Berg bei Klagenfurt mehrfach bereits im April (Thurn.). Im Juli traf sie Kosch. bei Zell Pfarre und auch im Plöckengebiet.
- Nr. 59. **Orneodes zonodactyla** Z. Am Prisanik bei Tarvis am 14. Juli von Galv. festgestellt. — Bisher für Kärnten noch nicht nachgewiesen.
- Acala hastiana** L. Am 6. April 1926 am Ulrichsberg und ein weiteres überwintertes Stück der v. *autumnana* Stph. bekam ich am 2. Mai am Maria Saaler Berg (det. Prohaska).
- Acala variegana** Schiff. St. Leonhard bei Flättnitz am 11. September (Galv.).
- Acala holmiana** L. Am 26. August ein Männchen bei Dellach am Millstätter See (Kosch.).
- Amphisa gerningana** Schiff. Im Juli am Ulrichsberg am Lichte (Thurn.). Bei Zell Pfarre ein Männchen am 21. Juli und ein solches am 23. Juli 1931 am Cellon im Plöckengebiet bei ca. 1400 m (Kosch.).
- Capua reticulana** Hb. Ein Stück erhielt ich am 29. Juni 1920 bei Friesach (det. Kautz.).
- Cacoecia musculana** Hb. Bei Klagenfurt einzeln im Mai (Thurn.).
- Cacoecia semialbana** Gn. Flättnitz Anfang Juli (Galv.).
- Pandemis cinnamomeana** Fr. Am 18. Juli ein Weibchen am Plöcken bei 1300 m (Kosch.).
- Pandemis heparana** Schiff. Im Loibltale am 18. August 1923 in ca. 1100 m. Bei Klagenfurt vereinzelt (Thurn.). Dellach am Millstätter See ein Weibchen am 31. Juli 1912 (Kosch.).
- Tortrix forsterana** F. Flättnitzhöhe am 30. Juni (Galv.).
- Tortrix viburniana** F. Bei Villach mehrfach von Proh. erhalten.
- Nr. 60. **Cnephasia abrasana** Dup. Ende Mai mehrere Stücke bei Klagenfurt (Thurn.). Neu für Kärnten.
- Cnephasia canescana** Gn. Beim Militärschutzhaus in der Koschuta am 20. Juli von Kosch. erhalten.
- Cnephasia incertana** Tr. v. *minorana* H. S. Am 2. Juli 1920 bei Friesach erbeutet (Thurn., det. Mitterberger).
- Anisotaenia ulmana** Hb. Bei Friesach am 20. Juli 1920 von mir und am 18. Juli 1931 am Plöcken bei ca. 1400 m von Kosch. erhalten.
- Nr. 61. **Anisotaenia rectifasciana** Hb. Recht häufig in Liesing und Sankt Lorenzen im Lesachtale von Proh. festgestellt. — Neu für das Land.

Conchylis curvistrigana Wilk. Diese in Kärnten erst in einem Stücke bei Federaun von Proh. nachgewiesene Art bekam ich am 20. Juli 1934 in einem Männchen am Lichte am Ulrichsberg (det. Hauder, Linz).

Nr. 62. **Conchylis implicitana** Wck. Diese für das Land neue Art traf Galv. am 8. Juli auf der Flattnitzhöhe.

Conchylis ciliella Hb. Ende Juni bis Mitte Juli bei Zell Pfarre (Kosch.).

Evetria duplana Hb. Ein Stück am 2. Oktober 1927 am Lichte am Maria Saaler Berg (Thurn.).

Evetria turionana Hb. Am 12. Mai am Maria Saaler Berg ein Stück am Lichte (Thurn.).

Evetria buollana Schiff. Ende Juli mehrfach am Maria Saaler Berg am Lichte. Ein Stück noch am 20. August (Thurn.).

Olethreutes capreana Hb. Am Maria Saaler Berg ein Stück am 18. Juli (Thurn.).

Olethreutes corticana Hb. Am Maria Saaler Berg und auch bei Friesach im Juni festgestellt (Thurn.).

Olethreutes sauciana Hb. Am 13. Juli 1936 von Kosch. am Obir erhalten.

Ol. noricana Hd. fand auch Kautz Ende Juli in der Gamsgrube im Glocknergebiet.

Ol. rufana Scop. Am 27. Juli am Plöckenpaß von Kosch. und in der Form *arenana* Lah. von Proh. bei Niedergail im Lesachtale festgestellt.

Ol. Schultziana F. Haidner Höhe Anfang Juli (Galv.).

Ol. spuriana Hd. Pfandscharte am 1. August (Kautz).

Ol. antiquana Hb. Ein Männchen am 3. Juli bei Zell Pfarre (Kosch.).

Steganoptycha granitana Hb. Liesing im Lesachtale in Fichtenwäldern von Proh. festgestellt.

Steg. diniana Gn. Am 24. Juli 1936 bei Zell Pfarre (Kosch.). Ende Juli auf der Franz-Josephs-Höhe (Kosch.), dort wohl mit Brennholz in solche Höhe verschleppt. — Flattnitz Ende September (Galv.).

Nr. 63. **Steg. rufimitrana** Hb. Diese für Kärnten neue Art wurde von Kosch. auf der Franz-Josephs-Höhe bei zirka 2400 m mehrfach erbeutet.

Gypsonoma neglectana Dup. Am 6. Juli 1935 bei Friesach von mir ein Stück erbeutet (det. Proh.).

Gypsonoma nigrimaculana Hb. Am 3. Juli 1935 bei Zell Pfarre ein Männchen (Kosch.).

Bactra lanceolana Hb. Von Kosch. ein Männchen am 3. Juli 1935 bei Zell Pfarre erhalten (det. Preißacker).

Nr. 64. **Semasia pupillana** Vl. Am 30. Juli ein Stück beim Glocknerhause (Thurn.). Neu für Kärnten.

Netocelia uddmanniana L. Zweimal am 7. Juli und am 21. Juli am Ulrichsberg am Lichte erbeutet (Thurn.). Naggl am Weißensee am 13. Juli (Galv.).

Nr. 65. **Epiblema fulvana** Stph. Ein Stück dieser ebenfalls für das Land neuen Art erhielt ich am 3. Juli 1920 bei Friesach (det. Hauder, Linz).

Nr. 66. **Epiblema scopoliانا** Hw. Ein Stück am 24. Mai 1926 bei Grafenstein (Thurn., det. Proh.). Ebenfalls neu für Kärnten.

Epiblema cana Hw. Ende Juni—Juli in der Koschuta bei zirka 1200 m und Mitte Juli am Plöcken von Kosch. festgestellt. Anfang Juli Flattnitzhöhe (Galv.).

Epiblema tripunctana F. Juli—August am Maria Saaler Berg und am Ulrichsberg (Thurn.). Ende Juli traf sie auch Kosch. bei Zell Pfarre.

Epiblema pflugiana Hw. Ende Juni einzeln am Obir von 1600 m aufwärts festgestellt (Thurn.).

- Epiblema luctuosana** Dup. Am 4. Juli ein Stück auf der Matschacher Alm in den Karawanken bei 1600 m (Thurn., det. Hauder).
- Epiblema simploniana** Dup. Flattnitz am 15. Juli (Galv.).
- Grapholitha scopariana** H. S. Am 2. Mai 1925 am Maria Saaler Berg ein Stück (Thurn.).
- Grapholitha duplicana** Zett. Fünf Weibchen erhielt Proh. bei Liesing im Lesachtale. Große Tiere, die er v. major nennt.
- Nr. 67. **Pamene regiana** Z. Am 1. Mai 1925 bei Maiernigg nächst Klagenfurt ein Männchen (Thurn., det. Proh.). Neu für Kärnten.
- Nr. 68. **Carpocapsa grossana** Hw. Diese für Kärnten auch noch nicht festgestellte Art wies Kosch. in je einem Weibchen am 21. und 25. Juli 1935 von Zell Pfarre nach.
- Carpocapsa splendana** Hb. Am 6. August ein Weibchen bei der Franz-Josephs-Höhe im Glocknergebiete (2400 m) von Kosch. erhalten.
- Ancylis tineana** Hb. Diese für das Land erst spärlich verzeichnete Art erhielt ich am 30. März am Ulrichsberg (det. Kautz).
- Ancylis laetana** F. Ulrichsberg am 1. Juni (Thurn.), Zell Pfarre am 21. Juni ein Männchen (Kosch.).
- Choreuthes myllerana** F. Glocknergebiet bei 2200 m am 1. August (Kautz).
- Glyphipteryx Bergsträsserella** F. Ende Mai einzeln bei Grafenstein (Thurn., det. Proh.).
- Glyphipteryx Fischerella** Z. Am 27. Juli 1935 ein Männchen bei Zell Pfarre (Kosch.).
- Tinagma perdicellum** Z. v. **matutinellum** Z. Auf den Bergen des Lesachtals bei Liesing in Höhen zwischen 1300 bis 1800 m in dieser verdunkelten Form (Proh.).
- Yponomeuta cognatellus** Hb. Loibltal mehrfach. — Bei Möllbrücke-Sachsenburg (Proh.) und auch auf der Franz-Josephs-Höhe, dort hinauf wohl nur mit Streu verschleppt (Kosch.).
- Argyresthia conjugella** Z. Am 3. Juli 1935 ein Weibchen in Zell Pfarre (Kosch., det. Preißecker).
- Argyresthia certella** Z. Bei Liesing im Lesachtale in Fichtenwäldern (Proh.).
- Argyresthia glabratella** Z. Bei Liesing im Lesachtale (Proh.).
- Plutella maculipennis** Curt. Einzeln im Juli bei Zell Pfarre (Kosch.).
- Plutella annulatella** Curt. Ein Stück am 15. Juni bei Liesing (Proh.), Bärengaben in den Karawanken am 9. Juni (Galv.).
- Plutella similella** Zett. Ein Stück am 15. Juni bei Liesing im Lesachtale (Proh.).
- Gerostoma asperellum** L. Am 18. Juli 1927 bei Karnburg am Ulrichsberg gefunden (Thurn., det. Hauder).
- Cerostoma nemorellum** L. Flattnitz am 11. September ein Stück (Galv.).
- Nr. 69. **Gelechia ochripalpella** Frey. Am 3. und 4. Juli je ein Stück bei Liesing im Lesachtale und weiters ein Stück am Grünkofel bei Liesing in 1800 m von Proh. gefunden. Neu für Kärnten.
- Gelechia tragicella** Heyd. Flattnitz, bei alten Lärchen nicht selten Anfang Juli. — Hintere Wände (Galv.).
- Gelechia infernalis** H. S. Ende Juni—Juli bei Zell Pfarre und auf der Grasalm in der Koschuta gefunden (Kosch., det. Preißecker).
- Gelechia albifemorella** Hofm. Etliche Männchen am 24. Juli bei Zell Pfarre (Kosch., det. Preißecker). Ende Juni traf ich diese Art häufig bei der Tschechischen Hütte in den Steiner Alpen, nahe der kärntnerischen Grenze (det. Kautz).
- Nr. 70. **Gelechia elatella** H. S. Flattnitzhöhe in Himbeerschlägen ein Pärchen am 8. September (Galv.). Neu für Kärnten.

Gelechia trauniella Z. Diese seltenere Art traf Kosch. in einem Männchen am 18. Juni 1935 bei Zell Pfarre (det. Preißecker).

Nr. 71. **Lita tussilaginella** Hein. Im Bärengraben in den Karawanken traf Galv. diese für Kärnten neue Art am 9. Juni.

Nr. 72. **Teleia saltuum** Z. Diese für das Land noch nicht nachgewiesene Art traf Prof. am 20. Juli beim Tuffbade bei St. Lorenzen im Lesachtale.

Xystophora unicolorella Dup. Mitte Juli bei Federaun und bei Liesing (Proh.).

Anacamptis fulvistiliella Tr. Häufig bei Liesing im Juli (Proh.).

Anacamptis anthyllidella Hb. Ein Männchen am 24. Juli 1935 bei Zell Pfarre (Kosch., det. Preißecker).

Anacamptis taeniolella Z. Bei Heiligenblut am 28. Juli (Kautz).

Argyritis libertella Z. Flattnitz beim weißen Fels Anfang Juli (Galv.).

Ypsolophus fasciellus Hb. Am 5. Mai 1936 am Ulrichsberg (Thurn.).

Ypsolophus limosellus Schläg. Ein Stück bei Klagenfurt am 18. August 1928 erhalten (Thurn., det. Hauder).

Nothris verbascella Hb. Am 21. Juli 1927 am Ulrichsberg (Thurn., det. Kautz).

Sophronia humerella Schiff. Am Riedenkopf bei Liesing bei 1700 m nicht selten von Proh. festgestellt.

Symmoca albicanella Z. Ende Juni am Ulrichsberg und Anfang Juli auch bei Pontafel (Thurn.).

Symmoca achrestella Rbl. Am 2. Juli 1924 bei Klagenfurt ein Männchen (Thurn., det. Proh.).

Endrosis lactella Schiff. Im September bei Klagenfurt mehrfach. Am 20. Juli 1922 auf der Würmlacher Alpe (Gailtal) bei zirka 1800 m (Thurn., det. Mitterberger).

Pleurota bicostella Cl. Mehrfach bei Zell Pfarre, Setitsche und Obir von 1200 bis 1800 m im Juli erhalten (Kosch.).

Topeutis labiosella Hb. Ein Männchen am 5. Juli auf der Setitsche (Kosch.).

Dasystoma salicellum Hb. Bei Maiernigg ein Pärchen am 27. März 1926 an einem Erlenstamm erhalten (Thurn.).

Psecadia pusiella Römer. Ich erhielt den hübschen Falter in vier Stücken von Habf. aus Hüttenberg. — Auch in der Sattnitz bei Klagenfurt kommt er einzeln dem Lichte zugeflogen.

Psecadia bipunctella F. Am 1. Juni 1930 ein Stück am Ulrichsberg von mir am Lichte erhalten (det. Kautz).

Psecadia decemgutella Hb. Ein Männchen am 23. August 1935 bei Zell Pfarre am Lichte (Kosch.).

Nr. 73. **Depressaria yatiana** F. Diese für Kärnten neue Art erhielt ich in einem Stücke am 6. Juni 1926 am Ulrichsberg am Lichte (det. Proh.).

Depressaria ciliella Stt. Von Galv. auf der Flattnitz am 24. September festgestellt.

Depressaria douglasella Stt. Diese erst von Proh. bei Möderndorf festgestellte Art bekam ich in einem Stücke am 19. Juni bei Loretto nächst Klagenfurt.

Nr. 74. **Anchinia dolomiella** Mn. Am 14. Juni 1926 im Loibltale bei zirka 1100 m am Lichte. Ein zweites Stück erhielt ich an gleicher Fundstelle am 14. Juli 1926 (det. Rbl.). Neu für Kärnten.

Hypercallia citrinalis Sc. Ein Männchen am 29. Juni 1935 bei Zell Pfarre und ein Weibchen am 18. Juli 1931 am Plöcken von Kosch. erhalten.

Carcina quercana F. Einzeln Anfang August bei Klagenfurt (Thurn.).

- Harpella forcicella** Sc. Nicht selten in der Sattnitz und am Maria Saaler Berg. — Ende Juni auch am Ulrichsberg. — Kosch. traf die Art auch am 21. Juli 1935 bei Zell Pfarre.
- Borkhausenia similella** Hb. Bei Liesing im Lesachtale in Fichtenwäldern (Proh.). Flattnitz am 8. Juli und 12. September (Galv.).
- Nr. 75. **Epermenia aequidentella** Hoffm. Am 24. Juli 1935 bei Zell Pfarre von Kosch. erbeutet (det. Preißecker). Neu für das Land.
- Scythris obscurella** Sc. Grasalm in der Koschuta bei 1200 m am 30. Juni. Am 3. August 1931 ein Männchen auf der Franz-Josephs-Höhe im Glocknergebiete (Kosch.). Flattnitz am 9. Juli (Galv.).
- Scythris amphonicea** HG. Nicht selten im August bei Zell Pfarre (Kosch.). Turracher Höhe am 19. Juli (Galv.).
- Nr. 76. **Scythris disporella** Tgstr. Am 1. August ein Weibchen bei Liesing von Proh. erhalten (vid. Müller-Rutz). Neu für Kärnten.
- Nr. 77. **Scythris glacialis** Frey. Pfandscharte am 1. August von Kautz erhalten. Neu für Kärnten.
- Scythris laminella** H. S. Bei Liesing häufig (Proh.).
- Scythris rostrigerella** Z. Im Juli bei Villach (Proh.).
- Ochromolopis icetella** Hb. Zwei Stück am 1. August bei Liesing (Proh.).
- Cybophora idaei** Z. Flattnitz Anfang Juli mehrfach auf Himbeerschlagen. — Prisanik bei Tarvis (Galv.).
- Coleophora ornatipenella** Hb. Bei Klagenfurt im Mai mehrfach (Thurn., det. Kautz).
- Coleophora leucapenella** Hb. Am 1. Juni ein Stück am Ulrichsberg (Thurn., det. Rebel).
- Coleophora coronillae** Z. (**gallipenella** Tr.). Am 29. Juni 1935 bei Zell Pfarre ein Männchen (Kosch., det. Preißecker).
- Coleophora vulnerariae** Z. Von Proh. bei Möderndorf gefangen.
- Coleophora curripipenella** Z. Ein Weibchen am 27. Juni 1935 bei Zell Pfarre von Kosch. erhalten (det. Preißecker, vid. Rebel). Erst einmal von Proh. in der Garnitzenschlucht bei Hermagor in Kärnten erhalten.
- Coleophora altivolella** Z. Am 24. Mai 1926 bei Grafenstein ein Stück von mir erhalten (det. Proh.).
- Elachista gleichenella** F. Ende Mai bei Möderndorf und am 22. Juli bei Liesing (Proh.).
- Elachista albifrontella** Hb. Lumkofel im Lesachtale bei 1600 m Ende Juli häufig (Proh.).
- Elachista humilis** Z. Ende April—Mai bei Möderndorf (Proh.).
- Elachista Freyi** Stgr. Ein Weibchen dieser Art erhielt Proh. am 1. August bei Liesing.
- Elachista pollinariaella** Z. Im Juni 1930 bei Friesach erbeutet (Thurn., det. Kautz).
- Elachista argentella** Cl. Bei Hermagor am 18. Mai (Proh.).
- Nr. 78. **Elachista festucicolella** Z. Am Riedenkopf bei Liesing in 1700 m ein Stück dieser für Kärnten neuen Art (Proh.).
- **Ornix avelanella** Stt. Am 27. Juli 1935 bei Zell Pfarre von Kosch. erhalten (det. Preißecker).
- Bedellia somnulentella** Z. Am 10. Juli 1935 am Aufstiege zur Setitsche in den Karawanken von Kosch. erhalten (det. Preißecker).
- Nr. 79. **Nepticula argentipenella** Z. Am 14. Juli bei Liesing von Proh. erhalten (det. Rebel). Neu für Kärnten.
- Acrolepia cariosella** Tr. Bei Obergail im Lesachtale (Proh.).
- Acrolepia arnicella** Heyd. Lumkofel bei Liesing bei 1800 bis 1900 m Ende Juli häufig (Proh.).
- Lypusa maurella** F. Bei Obervellach (Proh.).
- Teichobia verhuelella** Stt. Flattnitz, Weißer Fels, Anfang Juli (Galv.).

- Narycia monilifera** Geoffr.-Fourc. Am 31. Juli in Anzahl bei Liesing (Proh.).
- Diplodoma marginepunctella** Stph. Ein Männchen am 9. Juli 1935 auf der Grasalm bei 1200 m von Kosch. erhalten.
- Diplodoma adpersella** Hein. Galv. verzeichnet die Art für den Prisanik bei Tarvis, 14. Juli.
- Melasma lugubris** Hb. Bei Hüttenberg (Habf.), Saualpe mehrfach, auch im Loiblale (Thurn.), bei Velden (Viktor Mayer), Flattnitz, Golitz (Galv.). Scheinbar mindestens in Unterkärnten sehr verbreitet.
- Euplocamus anthracinalis** Sc. Mai am Ulrichsberg beim Lichte einzeln. — Auch bei Tage fliegend. — Ende Juni auch im Plöckengebiet mehrfach (Thurn.).
- Scardia boleti** F. Ein Stück am 2. Juli bei Klagenfurt (Thurn.).
- Tinea arcella** F. An feuchten Stellen bei Liesing häufig (Froh.).
- Tinea arcuatella** Stt. Zwei Stück erhielt Proh. bei Liesing.
- Tinea albipunctella** Hw. Golitz Ende Juni (Galv.).
- Tinea ignicomella** H. S. Mehrfach von Proh. in Fichtenwäldern bei Liesing festgestellt.
- Tinea misella** Z. Naggl am Weißensee am 15. Juni (Galv.).
- Incurcaria praelatella** Schiff. Flattnitz am 30. Juni (Galv.).
- Incurvaria vetulella** Zett. ab **unicolor** Rbl. Flattnitz, hintere Wände Ende Juni—Anfang Juli. Die v. **triglavensis** Haud. auf der Golitz am 28. Juni zwei Stück (Galv.).
- Incurvaria oehlmanniella** Tr. Bei Heiligenblut am 28. Juli (Kautz).
- Nemotois fasciellus** F. Am 7. Juli 1927 am Ulrichsberg mehrfach (Thurn., det. Hauder).
- Adela viridella** Z. Anfang Mai bei Maria Rain festgestellt.
- Adela albicinctella** Mn. Mitte Mai bei Ferlach um Salixbüsche schwärmend (Thurn., Kautz).

Nachtrag zu den Macros.

- Lycaena damon** Schiff. Von Mach. auch am Jovansteig am Obir bei zirka 1300 m erhalten.
- Oenels aello** Hb. Am Gmeineck bei Spittal von Mach. festgestellt.
- Leucodonta bicoloria** Schiff. Am 10. Juni ein Männchen in der Sattnitz am Lichte erhalten (Thurn.).
- Nr. 80. **Thaumetopoea pithyocampa** Schiff. Anfang August 1936 von Kau bei Villach erbeutet. Neu für Kärnten.
- Agrotis flammatra** F. Vertatscha in den Karawanken bei zirka 1900 m am 4. Juli 1937 von Sieder und Krobath erhalten.
- Agrotis lucerneae** L. Desgleichen mehrfach am 7. August 1937.
- Nr. 81. **Agrotis vestigialis** Rott. Diese für Kärnten neue Art bekam Kau Ende Juli einzeln bei Villach.
- Nr. 82. **Dasypolia templi** Thbg. v. **alpina** Rgh. Gmeineck bei Spittal im September von Dr. Leo Heidenthaler aus Salzburg am Lichte erhalten. Neu für Kärnten.
- Jaspidea celsia** L. Am 3. Oktober 1937 von Leutgeb am Lichte in der Sattnitz ein Männchen.
- Nr. 83. **Nonagria nexa** Hb. Je ein Stück dieser für Kärnten neuen Art bekam Sieder am 28. August und 28. September 1937 in der Sattnitz am Lichte.
- Nr. 84. **Thalpocharis parva** Hb. Am 28. Mai 1937 bekam ich ein Männchen dieser ebenfalls für das Land neuen Art am Lichte in der Sattnitz.
- Nr. 85. **Leucanitis stolidia** F. Am 15. September 1936 bekam Kau bei Villach und am 28. September 1937 Sieder in der Sattnitz am Lichte diese südliche Art, welche für unser Land neu ist. — Ich

trug Bedenken, selbe auf Grund des einzigen Fundes durch Kau für das Land Kärnten als heimisch zu verzeichnen, da ich eine zufällige Verschleppung mit der Eisenbahn vermutete. Der zweite Fund Sieders in der Sattnitz im vorigen Jahre erweist jedoch daß diese Art doch bei uns, wenn auch offenbar sehr selten, anzutreffen ist.

Larentia tempestaria H. S. Sieder hat am 4. Juli 1937 diese seltene hochalpine Art auch in den Karawanken, und zwar im Gebiete der Vertatscha bei zirka 1900 m in vegetationsarmem, schattigem Terrain erhalten.

Earlas clorana L. Einzeln im Juni in der Sattnitz am Lichte.

In vorliegender Arbeit erscheinen 271 Großschmetterlings- und 218 Kleinschmetterlingsarten erwähnt. Für das Land Kärnten sind davon 54 Großschmetterlings- und 31 Kleinschmetterlingsarten neu, d. h. im Lande bisher noch nicht festgestellt.

Diese für das Land neuen Arten erscheinen in der Arbeit mit fortlaufenden Nummern versehen.

Um eine Übersicht über den Stand der bisher für Kärnten nachgewiesenen Arten zu geben, sei folgendes bemerkt:

Im Hauptwerke Gabriel Höfners „Die Schmetterlinge Kärntens“ samt den vier in verschiedenen Jahrgängen der „Carinthia II“ erschienenen Nachträgen hiezu sind nachgewiesen:

1021 Macros und 1163 Micros

In meiner Arbeit „Sechzehn für Kärnten neue Falterarten etc.“, Jahrgg. 112/113 der „Carinthia II“, 1923 . . .	16	„	—	„
In meiner Arbeit „Ein weiterer Beitrag zur Lepidopterenfauna Kärntens“, Jahrgang 114/115 der „Carinthia II“, 1925 . . .	4	„	4	„
In vorliegender Arbeit . . .	54	„	31	„

zusammen . . 1095 Macros und 1198 Micros

womit sich die für das Land Kärnten bisher festgestellte Artenzahl auf 2293 stellt.

Zur Säugetierfauna Kärntens.

Die an dieser Stelle wiederholt beklagte mangelhafte Kenntnis der Kleinsäuger Kärntens berechtigt zur Festhaltung folgender Funde, so „gewöhnlich“ diese auch sein mögen:

1. *Eptesicus serotinus* Schreber (spätfliende Fledermaus).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [128_48](#)

Autor(en)/Author(s): Thurner Josef

Artikel/Article: [Ein neuerlicher Beitrag zur Schmetterlingsfauna Kärntens \(Fortsetzung\) 105-114](#)