

Carinthia II	161./81. Jahrgang	S. 121—131	Klagenfurt 1971
--------------	-------------------	------------	-----------------

Verzeichnis der Vogelarten des Bezirkes Spittal an der Drau

Von Jakob ZMÖLNIG, Molzbichl

In langjähriger Beobachtungstätigkeit wurde versucht, eine möglichst genaue Übersicht über die Vogelwelt im Bezirk Spittal an der Drau zu erreichen. Hauptbeobachtungsgebiete waren dabei das Drautal bei Spittal und der Millstätter See. Darüber hinaus wurden auch zahlreiche Beobachtungen im Nockgebiet und in den Tauern angestellt. Seit dem Jahre 1970 werden auch Beringungen durchgeführt, welche bereits Rückmeldungen erbrachten. In Ermangelung genauer quantitativer Daten muß ich mich auf die allgemeinüblichen Bezeichnungen, wie selten, häufig usw., beschränken. Es wäre natürlich besser, wenn exaktere Angaben über die Brutpaarzahlen gemacht werden könnten, doch müssen diese fehlenden Angaben für eine spätere Arbeit aufgehoben werden. Um eine gewisse Einheitlichkeit in der Bezeichnung zu gewährleisten, verwende ich die von NIETHAMMER, KRAMER und WOLTERS in ihrer Arbeit „Die Vögel Deutschlands“ (1964) gewählten Bezeichnungen:

Brutvögel

1. Jahresvogel: Arten, die regelmäßig brüten und während des ganzen Jahres vertreten sind (auch Teilzieher)
2. Sommervogel: Arten, die regelmäßig brüten und im Winter nicht oder nur ausnahmsweise vertreten sind
3. Unregelmäßiger Brutvogel
4. Ehemaliger Brutvogel

Regelmäßige Gäste und Durchzügler

1. Jahresgast: Arten, die das ganze Jahr über vertreten sind, aber nicht brüten
2. Sommergast: Arten, die im Sommer regelmäßig vertreten sind, ohne zu brüten
3. Wintergast
4. Durchzügler

Nicht alljährlich beobachtete Gäste

1. Unregelmäßiger Gast
2. Gelegentlicher Gast
3. Irrgast

Verzeichnis der beobachteten Arten S e e t a u c h e r (Gaviidae)

Prachttaucher: Durchzügler. Am Millstätter See alljährlicher Durchzügler in sehr geringer Zahl; vor allem November—Dezember.

L a p p e n t a u c h e r (Podicipedidae)

Haubentaucher: Wintergast und Durchzügler. Regelmäßiger Durchzügler und Überwinterer am Millstätter See (21. März 1970: etwa 300 Ex. rastend). Wasservogelzählung Mitte Jänner 1971: Bisheriges Überwinterungsmaximum von 185 Ex. Brutnachweise liegen bisher noch keine vor. Die Ursache dürfte im Fehlen von Schilfbeständen liegen.

Rothalstaucher: Wintergast und Durchzügler. Regelmäßiger Durchzügler am Millstätter See, jedoch immer nur wenige Exemplare (21. April 1970 1 Ex., 14. November 1970 2 Ex.), Überwinterung eher unregelmäßig (16. Jänner 1971 2 Ex.).

Zwergtaucher: Jahresvogel. Brutvogel an kleineren Gewässern des Gebietes (Brutbestand noch nicht genau erfaßt). Durchzug und Überwinterung am Millstätter See festgestellt (16. Jänner 1971 35 Ex.).

K o r m o r a n e (Phalacrocoracidae)

Kormoran: Wintergast und Durchzügler. Alljährlich einzelne Exemplare an der Drau und am Millstätter See am Durchzug (November bzw. März—April). Gelegentlich Überwinterung (1 Ex. vom 20. Jänner bis 21. April 1970 am Millstätter See).

Zwergscharbe: Irrgast. Ein Präparat befindet sich in einer privaten Sammlung in Seeboden. Erlegungsdatum unbekannt (1930?), (beim BRUGGER-Vater).

R e i h e r (Ardeidae)

Graureiher: Unregelmäßiger Brutvogel und Durchzügler. Im Jahre 1956 brütete ein Paar bei St. Peter in Holz und brachte vier Junge hoch. Einziger Brutnachweis aus dem Bezirk. Durchzug im März und April bzw. August bis November (17. März 1970 1 Ex. am Millstätter See, 12. bis 20. April 1970 4 Ex. an der Drau).

Purpurreiher: Durchzügler. Seltener Durchzügler; 1 Ex. am Stappitzer See bei Mallnitz geschossen (TRIEBELNIG), 1. bis 8. Mai 1957 1 Ex. an der Drau.

Nachtreiher: Durchzügler. Seltener Durchzügler; 20. April 1956 2 Ex. an der Drau.

Zwergrohrdommel: Durchzügler. Brutnachweise liegen bisher keine vor.

Große Rohrdommel: Durchzügler. Seltener Durchzügler: 5. April 1965 1 Ex. am Millstätter See gefangen.

S t ö r c h e (Ciconiidae)

Weißstorch: Unregelmäßiger Brutvogel und Durchzügler. 1951 bis 1955 brütete ein Paar im Wipfel einer Eiche bei Lendorf. Regelmäßiger Durchzügler (24. April 1956 3 Ex., 30. April 1965 4 Ex., 3. Juli 1965 3 Ex., 23. Juni bis 15. Juli 1970 2 Ex.).

Schwarzstorch: Durchzügler. Sehr seltener Durchzügler; einzige Beobachtung: 1 Ex. Mai 1950.

E n t e n v ö g e l (Anatidae)

Höckerschwan: Jahresvogel. Brutvogel am Millstätter See; jedoch nur 1 bis 2 Paare. (Vermutlich Bestandsregulierung durch den Menschen.)

Saatgans: Durchzügler und Wintergast. 31. Jänner 1963 2 Ex. und 8. Jänner 1970 2 Ex. auf Feldern.

Pfeifente: Durchzügler. Regelmäßig, aber in geringer Zahl; 15. April 1968 12 ♂ an der Drau.

Schnatterente: Durchzügler. 17. März 1970 10 Ex. am Millstätter See.

Krickente: Durchzügler. Regelmäßig am Durchzug.

Stockente: Jahresvogel. Häufiger Brutvogel in allen geeigneten Lagen. (Höhenverbreitung noch nicht genau bekannt; bisher höchstes Brutvorkommen: Stappitzer See.)

Spießente: Durchzügler. 2. April 1965 1 Paar an der Drau, 8. März 1966 1 ♂ und 3 ♀, 25. März 1970 4 Ex. am Millstätter See.

Knäckente: Durchzügler. Regelmäßig im März und April am Durchzug (22. März 1970 etwa 100 Ex. am Millstätter See).

Löffelente: Durchzügler. Seltener Durchzügler (14. April 1970 10 Ex. am Millstätter See).

Tafelente: Durchzügler und Wintergast. Regelmäßig am Millstätter See und an der Drau.

Reiherente: Durchzügler und Wintergast. Wie Tafelente, meist in geringerer Zahl.

Bergente: Durchzügler. Seltener Durchzügler (Dezember 1961 1 ♂ am Millstätter See).

Schellente: Durchzügler und Wintergast. Regelmäßige Überwinterung an der Drau und am Millstätter See (bis 100 Ex.).

Mittelsäger: Durchzügler. Sehr seltener Durchzügler: 11. April 1970 1 ♀ am Millstätter See.

Gänsesäger: Durchzügler und Wintergast. Überwinterung an der Drau (Dezember bis März bis zu 18 Ex.) und am Millstätter See. Regelmäßig am Durchzug.

G r e i f v ö g e l (Accipitridae)

Gänsegeier: Sommergast. Alljährlich Übersommerung im Tauerngebiet.

Steinadler: Jahresvogel. Alljährlich 1 bis 3 Brutpaare im Nockgebiet und in den Tauerntälern.

Mäusebussard: Jahresvogel. Häufiger Brutvogel; häufiger Durchzügler und Überwinterer.

Rauhfußbussard: Wintergast. Sehr seltener Wintergast, erscheint viele Jahre nicht.

Adlerbussard: Irrgast. In der Tischlerei MÜLLER in Rennweg befindet sich ein Präparat aus dem Jahre 1965. Erster Nachweis für Kärnten.

Sperber: Jahresvogel. Brutvogel, dessen Paarzahl in den letzten Jahren stark abgenommen hat.

Habicht: Jahresvogel. Sehr seltener Brutvogel. Wird leider durch die Jäger immer noch zu stark verfolgt.

Rotmilan: Durchzügler. Sehr selten am Durchzug zu beobachten. Schwarzmilan. Durchzügler. Regelmäßig am Durchzug (21. April bis 8. Mai 1965 1 Ex.).

Seeadler: Durchzügler. Sehr selten am Durchzug. 1. Dezember 1956 1 immat. an der Drau.

Wespenbussard: Sommervogel. Seltener Brutvogel.

Rohrweihe: Durchzügler. Regelmäßig im Frühjahr am Durchzug (25. April bis 2. Mai 1956 1 ♀ an der Drau, 12. April 1970 1 ♂ an der Drau).

Kornweihe: Durchzügler. Sehr seltener Durchzügler (28. April 1965 2 ♀ und 1 ♂).

Wiesenweihe: Durchzügler. Sehr seltener Durchzügler (28. April 1965 1 Paar).

Fischadler: Durchzügler. Alljährlich regelmäßig an der Drau und am Millstätter See am Durchzug (meist April, seltener März und Mai).

Falken (Falconidae)

- Baumfalke: Sommervogel. Regelmäßiger, aber seltener Brutvogel. 1971 wurden durch Falkner Jungvögel illegal ausgenommen.
- Wanderfalke: Jahresvogel. Vermutlich 1 bis 2 Brutpaare; regelmäßiger Durchzügler und Wintergast.
- Merlin: Durchzügler und Wintergast. Sehr selten zu beobachten.
- Rotfußfalke: Durchzügler. Durchzug fast alljährlich in wechselnder Zahl zu beobachten (meist im Mai). Maximum: Mai 1948 über 100 Ex. zwischen Molzbichl und Spittal. Üblicherweise nur wenige Exemplare.
- Turmfalke: Jahresvogel. Allgemein verbreiteter Brutvogel, alljährlich auch Überwinterer.

Hühnervögel (Phasianidae)

- Alpenschneehuhn: Jahresvogel.
- Birkhuhn: Jahresvogel.
- Auerhuhn: Jahresvogel.
- Haselhuhn: Jahresvogel.
- Steinhuhn: Jahresvogel.
- Rebhuhn: Jahresvogel.
- Wachtel: Sommervogel. Seltener Brutvogel, regelmäßig am Durchzug.
- Fasan: Jahresvogel.

Rallen (Rallidae)

- Wasserralle: Durchzügler. Brutnachweise liegen keine vor, sind aber möglich.
- Tüpfelsumpfhuhn: Durchzügler.
- Wachtelkönig: Durchzügler. Brutnachweise liegen keine vor, sind aber möglich.
- Teichhuhn: Jahresvogel. Brutvogel an Nebenarmen der Drau, Überwinterung am Millstätter See.
- Bläshuhn: Durchzügler und Wintergast. Als Überwinterer seit etwa 10 Jahren stark zugenommen. Brutnachweise liegen keine vor.

Regenpfeifer (Charadriidae)

- Kiebitz: Durchzügler. Alljährlich im März und April im Drautal am Durchzug.
- Flußregenpfeifer: Durchzügler. Regelmäßig in wenigen Exemplaren an der Drau am Durchzug.
- Mornellregenpfeifer: Sommervogel. Seltener Brutvogel.

S c h n e p f e n (Scolopacidae)

- Bekassine: Durchzügler und Wintergast. Regelmäßig am Durchzug; im Februar 1956 6 Ex. an einem Bächlein.
- Waldschnepfe: Durchzügler. Durchzug regelmäßig (April).
- Großer Brachvogel: Durchzügler. Sehr selten am Durchzug beobachtet (17. März 1970 1 Ex. auf dem Eis des Millstätter Sees).
- Uferschnepfe: Durchzügler. Sehr selten am Durchzug (12. April 1970 1 Ex. an der Drau).
- Rotschenkel: Durchzügler. Alljährlich in geringer Zahl am Durchzug.
- Grünschenkel: Durchzügler. Alljährlich in geringer Zahl an der Drau am Durchzug.
- Waldwasserläufer: Durchzügler. Regelmäßig im Frühjahr an der Drau.
- Bruchwasserläufer: Durchzügler. Alljährlich am Durchzug.
- Flußuferläufer: Unregelmäßiger Brutvogel. Alljährlich am Durchzug; Brutvogel, der wahrscheinlich unter der Wasserverschmutzung leidet. Keine Brutnachweise aus den letzten Jahren.
- Kampfläufer: Durchzügler. Alljährlich am Durchzug.

S t e l z e n l ä u f e r (Recurvirostridae)

- Säbelschnäbler: Irrgast. Einzige Beobachtung: 1 Ex. im Frühjahr 1958 am Millstätter See. Erste Beobachtung in diesem Jahrhundert!

M ö w e n (Laridae)

- Heringsmöwe: Durchzügler. Selten am Durchzug (21. April 1970 4 Ex. am Millstätter See).
- Sturmmöwe: Wintergast. Überwinterung am Millstätter See.
- Lachmöwe: Durchzügler und Wintergast. Häufigster und regelmäßiger Durchzügler am Millstätter See.
- Zwergmöwe: Durchzügler. Seltener Durchzügler.
- Trauerseeschwalbe: Durchzügler. Regelmäßig im Frühjahr (April bis Mai) und im Herbst (September) am Durchzug (Drau, Millstätter See, Mölltal).
- Raubseeschwalbe: Durchzügler. Nicht regelmäßig am Durchzug (21. April 1970 2 Ex. am Millstätter See).
- Flußseeschwalbe: Durchzügler. Selten am Durchzug.

T a u b e n (Columbidae)

- Hohltaube: Durchzügler. Durchzug im April; Brutnachweise bisher nicht erbracht.

Ringeltaube: Sommervogel. Allgemein verbreiteter Brutvogel und Durchzügler.

Turkeltaube: Durchzügler. Meist im Mai am Durchzug zu sehen.

Türkentaube: Jahresvogel. Brutvogel in vielen Orten.

K u c k u c k e (Cuculidae)

Kuckuck: Sommervogel. In Gschriet alljährlich in einem Hausrotschwanznest.

E u l e n (Strigidae)

Schleiereule: Durchzügler? Wintergast. Einziger Nachweis: Im Winter 1954 wurde ein Ex. gefangen.

Zwergohreule: Sommervogel. Seltener Brutvogel bei Spittal.

Uhu: Jahresvogel. Einzelne Brutpaare im Nockgebiet und in den Tauerntälern. Zahl unbekannt.

Sperlingskauz: Jahresvogel. Genaue Brutverbreitung unbekannt.

Waldkauz: Jahresvogel.

Waldohreule: Jahresvogel.

Sumpfohreule: Durchzügler. 1 Ex. in der Sammlung BRUGGER in Seeboden.

Rauhfußkauz: Jahresvogel. Brutvogel in höheren Regionen, Brutverbreitung unbekannt.

Z i e g e n m e l k e r (Caprimulgidae)

Ziegenmelker: Sommervogel. Seltener Brutvogel (z. B. Hühnersberg).

S e g l e r (Apodidae)

Mauersegler: Sommervogel. Nicht häufiger Brutvogel.

Alpensegler. Sommervogel. Exakte Brutnachweise fehlen; bei Schlechtwetter an der Drau sehr zahlreich. Auf Gebäudebruten (z. B. Heiligenblut) müßte geachtet werden.

E i s v ö g e l (Alcedinidae)

Eisvogel: Jahresvogel. Seltener Brutvogel an der Drau.

B i e n e n f r e s s e r (Meropidae)

Bienenfresser: Irrgast. Sehr selten zu beobachten. Nur zwei Beobachtungen in den letzten 20 Jahren.

R a c k e n (Coraciidae)

Blauracke: Durchzügler. Selten am Durchzug zu beobachten (meist Mai und April).

W i e d e h o p f e (Upupidae)

Wiedehopf: Sommervogel. Seltener Brutvogel.

S p e c h t e (Picidae)

Grünspecht: Jahresvogel.

Grauspecht: Jahresvogel.

Schwarzspecht: Jahresvogel.

Buntspecht: Jahresvogel.

Kleinspecht: Jahresvogel.

Dreizehenspecht: Jahresvogel. Brutvogel in höheren Lagen.

Wendehals: Sommervogel.

L e r c h e n (Alaudidae)

Heidelerche: Sommervogel. Regelmäßig am Durchzug; Brutnachweise fehlen.

Haubenlerche: Durchzügler.

Feldlerche: Sommervogel.

S c h w a l b e n (Hirundinidae)

Uferschwalbe: Durchzügler.

Felsenschwalbe: Sommervogel. Brutvogel im Maltatal und an der Zunderwand.

Rauchschwalbe: Sommervogel.

Mehlschwalbe: Sommervogel.

S t e l z e n (Motacillidae)

Schafstelze: Durchzügler. Im April und Mai am Durchzug. Brutnachweise wären möglich.

Gebirgsstelze: Sommervogel.

Bachstelze: Sommervogel. Gelegentlich einzelne Exemplare im Winter zu beobachten.

Baumpieper: Sommervogel.

Wiesenpieper: Durchzügler.

Wasserpieper: Jahresvogel. Brut in den Almgebieten, Überwinterung in den Niederungen.

W ü r g e r (Laniidae)

Neuntöter: Sommervogel.

Schwarzstirnwürger: Durchzügler. Selten zu sehen (nur eine Beobachtung).

Rotkopfwürger: Durchzügler. Selten zu sehen (einzige Beobachtung: 29. April 1965, 1 ♂).

Raubwürger: Durchzügler und Wintergast.

Seidenschwänze (Bombycillidae)

Seidenschwanz: Wintergast. Fast alljährlich, jedoch in wechselnder Zahl.

Wasseramseln (Cinclidae)

Wasseramsel: Jahresvogel. Brutvogel an Gebirgsbächen, im Winter an der Drau zu sehen.

Zaunkönige (Troglodytidae)

Zaunkönig: Jahresvogel.

Braunellen (Prunellidae)

Alpenbraunelle: Jahresvogel.

Heckenbraunelle: Jahresvogel.

Sänger (Muscicapidae)

Schilfrohrsänger: Sommervogel?

Sumpfrohrsänger: Sommervogel?

Teichrohrsänger: Sommervogel?

Drosselrohrsänger: Durchzügler.

Gelbspötter: Durchzügler.

Gartengrasmücke: Sommervogel.

Mönchsgrasmücke: Sommervogel. Häufigste Grasmückenart, all-gemein verbreitet.

Klappergrasmücke: Sommervogel.

Dorngrasmücke: Sommervogel.

Fitis: Sommervogel?

Zilpzalp: Sommervogel.

Berglaubsänger: Sommervogel.

Waldlaubsänger: Sommervogel.

Wintergoldhähnchen: Jahresvogel.

Sommergoldhähnchen: Sommervogel.

Grauschnäpper: Sommervogel.

Trauerschnäpper: Durchzügler.

Halsbandschnäpper: Durchzügler. Viel seltener als der Trauerschnäpper.

Schwarzkehlchen: Sommervogel? Brütet in wenigen Exemplaren.

Braunkehlchen: Sommervogel.

Gartenrotschwanz: Sommervogel.

Hausrotschwanz: Sommervogel.

Blaukehlchen: Durchzügler. (7. April 1956 1 ♀ und 12. April 1970 1 ♂.)

Rotkehlchen: Jahresvogel.

Steinschmätzer: Sommervogel.

Misteldrossel: Sommervogel.

Wacholderdrossel: Durchzügler und Wintergast.

Singdrossel: Sommervogel.

Rotdrossel: Durchzügler.

Ringdrossel: Sommervogel.

Amsel: Jahresvogel

Schwanzmeisen (Aegithalidae)

Schwanzmeise: Jahresvogel.

Beutelmeisen (Remizidae)

Beutelmeise: Durchzügler. Selten zu sehen (Ende Oktober 1971 bei Molzbichl).

Meisen (Paridae)

Haubenmeise: Jahresvogel.

Sumpfmeise: Jahresvogel.

Weidenmeise: Jahresvogel. Brut in den Almgebieten.

Blaumeise: Jahresvogel.

Kohlmeise: Jahresvogel. Häufigste Art.

Tannenmeise: Jahresvogel.

Kleiber (Sittidae)

Kleiber: Jahresvogel.

Mauerläufer: Jahresvogel. Beobachtung an der Zunderwand, Oberdrauburg, Lienzer Dolomiten.

Baumläufer (Certhiidae)

Gartenbaumläufer: Jahresvogel.

Ammern (Emberizidae)

Goldammer: Jahresvogel.

Ortolan: Durchzügler und Sommervogel? 12. Mai 1956 und 6. Mai 1965 im Drautal.

Rohrammer: Durchzügler.

F i n k e n (Fringillidae)

Buchfink: Jahresvogel.

Bergfink: Durchzügler und Wintergast.

Girlitz: Sommervogel.

Grünling: Jahresvogel.

Stieglitz: Jahresvogel.

Zeisig: Sommervogel? Durchzügler und Wintergast.

Birkenzeisig: Jahresvogel.

Hänfling: Unregelmäßiger Brutvogel und Durchzügler. 1970 Brutversuch in Rothenthurn.

Fichtenkreuzschnabel: Jahresvogel.

Kernbeißer: Durchzügler und Wintergast.

Gimpel: Jahresvogel.

Schneefink: Jahresvogel.

Haussperling: Jahresvogel.

Feldsperling: Jahresvogel.

S t a r e (Sturnidae)

Star: Sommervogel. Allgemein verbreitet, Winterbeobachtungen möglich.

P i r o l e (Oriolidae)

Pirol: Sommervogel.

R a b e n v ö g e l (Corvidae)

Eichelhäher: Jahresvogel.

Elster: Jahresvogel.

Tannenhäher: Jahresvogel.

Alpendohle: Jahresvogel.

Dohle: Durchzügler.

Saatkrähe: Wintergast und Durchzügler.

Rabenkrähe: Jahresvogel.

Nebelkrähe: Jahresvogel. Die Grenze zwischen den beiden Rassen der Aaskrähe verläuft ungefähr im Raume zwischen Villach und Spittal. Die Rabenkrähe kommt vor allem in den höheren Lagen und westlich von Spittal vor, die Nebelkrähe vor allem in den östlichen Teilen des Bezirkes.

Kolkrabe: Jahresvogel.

Anschrift des Verfassers: Jakob ZMÖLNIG, Molzbichl 26, A-9701 Rothenthurn.