

# Zur Kenntnis der Käferfauna Osttirols (Österreich): Teil V (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae)

Von Alois KOFLER

## Zusammenfassung:

Für den Bezirk Lienz (Osttirol, Österreich) werden in folgenden Käferfamilien insgesamt 111 Arten behandelt und durch genaue Fundortangaben erläutert: Elateridae (99), Eucnemidae (8), Lissomidae (1), Throscidae (3). Folgende Arten sind unsicher oder nur durch ältere Einzelfunde vertreten: *Adrastus rachifer*, *Ctenicera heyeri*, *Rhacopus sahlbergi* und *Drapetes cinctus*.

## Abstract:

To the knowledge of the beetle-fauna from the district of Lienz (East Tyrol, Austria) / part V: click beetles – Elateroidea (partly). A total of 111 species is included in this article – in most cases the exact findings are presented: Elateridae (99), Eucnemidae (8), Lissomidae (1), Throscidae (3). The following species are doubtful: *Adrastus rachifer*, *Ctenicera heyeri*, *Rhacopus sahlbergi* and *Drapetes cinctus*.

## Einleitung:

Zur Behandlung gelangen vier Familien der Ordnung Sternoxia gemäß HORION 1953: 175 ff. – ohne die Familie: Cerophytidae mit *Cerophytum elateroides* (Latreille, 1804), die in Osttirol nicht zu erwarten ist.

Reihenfolge und Nomenklatur folgen KÖHLER & KLAUSNITZER 1998; gemäß BEZIRKSKUNDE 2001 ergibt sich die alphabetische Reihung der Fundorte nach den 33 Gemeinden des Bezirkes. – Stückzahlen über 1 stehen in Klammer. Zum Verbleib einzelner Sammlungen finden sich genauere Einzelheiten bei KOFLER 2009.

Abkürzungen: National-Park-Hohe-Tauern-Tag der Arten-Vielfalt 2007: NPHT-TAV07 nach GROS et al. 2007.

## Elateridae:

### ◆ *Ampedus* (= *Elater auct.*) *Ampedus sinuatus* Germar, 1844

GREDLER 1863, 230: sehr selten, nur bei Lienz gefunden (Ros.). – Dölsach: Ortsgebiet Juni 1974 und Mai, 30. 5. 1975, in Eichholz beim Kapaunerwirt leg. Defregger, det. Kofler 1988, beide Ex. in coll. Kofler.

### ◆ *Ampedus erythrogonus* (Müller, 1821)

HOLZSCHUH 1971, 17: Tristacher See 21. 4. 1963 (1 Ex.). – Ainet: Gwabl 1979; Lavant: 8. 4. – 22. 9. 1978 (4) e. l. in hohler Weide zusammen mit *Platycerus caprea*; Leisach: 1981 leg. W. Schedl bei der Luggauer Brücke in coll. Kofler; Lienz: 1938 leg. Konecni, Ma. Trost 1961; Matrei: Kienburg 1970; Nikolsdorf: Etschberg 1984 in Eschenstrunk; Sillian 1947 leg. Konecni det. Wurst 1995; Thurn: Neualpseen 24. 7. 1988 in 2400 m, wohl ein windverfrachtetes Stück; Tristach: Tristacher See 1963 (2) leg. Holzschuh, Kreithof 1994: 1050 m.

## Schlagworte

Faunistik, Coleoptera, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae, Osttirol.

## Keywords

faunistics, Coleoptera, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae, East Tyrol.

◆ *Ampedus rufipennis* (Stephens, 1830)

Die Art fehlt bei PEEZ & KAHLER 1977:237, HELLRIGL 1996:446 und GEISER 2001:313; nach HORION 1953:186 nur Einzelfunde aus Niederösterreich, Steiermark, Nordtirol (WÖRNDLE 1950).

Nikolsdorf: beim Bahnhof am rechten Draufer 15. 4. 1983 (2) in Grauerle (*Alnus incana*) vid. Cate 1989. – Niederösterreich: Maria Ellend 10. 5. 1937 1 Ex. leg. Konecni, vid. Cate coll. Kofler. – Jugoslawien: Nanos 18. 5. 1988 1 Ex. leg. Deutsch det. Cate, in coll. Kofler.

◆ *Ampedus balteatus* (Linnaeus, 1758)

Amlach: Amlacher Au 1961 (2), Ulrichsbichl 1964; Ainet 1966, 1990 (4) in Pheromonfalle beim Sägewerk; Dölsach 1979 leg. Defregger det. Cate 1989 coll. Kofler; Gaimberg: Postleite 2008; Kartitsch: Tannwiese 2003 in 1530 m; Lavant 1963, Forchach 1996; Leisach: Burgfrieden in Pheromonfalle 1988, 1990; Lienzer Klause 1991, 1970 (5); Lienz-Stadt: 1930 leg. Konecni, Ma. Trost 1960, Iselkai 1960, Patriasdorf 1959 (3) leg. Holzschuh det. Hölzel; Sillian 1947 (2), 1951 leg. Konecni; Tristach: Kreithof 1989 in 1050 m, Insteinalm 1989 1670 m; Thurn: Zettlersfeld Biedner Alm 1962 ca. 1600 m; Virgen: Maurertal 1978 um 1700 m.

◆ *Ampedus praeustus* (Fabricius, 1792)

Assling: Bannberg 14. 4. 1956 in fauler Birke; Leisach: Auwald 10. 4. 1966 (2) in Föhrenstrunk; Nußdorf 18. 3. 1988 in rotfauler Fichte zusammen mit *Ampedus sanguineus*; Lienz-Stadt: Ma. Trost 20. 4. 1960 aus faulendem Fichtenstrunk vid. Peez; Oberlienz: Glanzer Au 18. 5. 1969 leg. Kropsch in coll. Kofler. – Alle Ex. vid. Cate 1989. – St. Johann: Ort 9. 7. 1966, 8. 3. 2002 Sonnseite Roßkopfweg in Fichte.

◆ *Ampedus aethiops* (Lacordaire, 1835)

GREDLER 1863, 230; Lienz (Ros.). – Abfaltersbach: Klärwerk 2006; Ainet: Alkus 1994; Assling: Thal 1965, Bannberg: Hochstein 2000 in 1980 m; Außervillgraten: Winkeltal 1964 (2) in 1500 m; Hopfgarten 1930 (2) leg. Konecni; Iselsberg: Zwischenbergen 1984 1400 m, Geiersbichl 1993 1950 m; Kals: Staniska 1964 (2); Lesach: Rubisoi 1982 (2), 1988 1700 m, Dorfertal: Fruschnitzebene 1988 (4) 1700 m leg. Kahlen, Dorfertal: Laperwitzbach 1988 zahlreich an Lärche 1800 m leg. Kahlen, Lesach-Riegel 1993 bei 1900 m, Dorfertal 1998 (4) 1700 m an Lärche; Kartitsch: Winkeltal 1965 (2) 1500 m, Erschbaumertal: Tscharre 1982 2000 m; Leisach: Burgfrieden in Pheromonfalle 1988; Lienz-Stadt: 1977 leg. Defregger in coll. Kofler, Patriasdorf 1959 leg. Holzschuh det. Hölzel; Matrei: 1978, Zedlacher Paradies 1984 unter Lärchenrinde; Nikolsdorf: Plone 1992 1200 m; Oberlienz: Helenental 1960 1500 m, Oberdrum Ranachalm 1995 1200 m; Obertilliach: Leiten Schwalen-Moor 1992 1440 m, Gärbertal 1995 1750 m; Prägraten: Serpentinsteinbruch 1978 1600 m, Stoanalm 2003 1460 m; St. Jakob: Staller Sattel 1960 1800 m, Patscheralm 1967 1600 m in morscher Lärche; St. Johann: Michlbach 1974 leg. coll. F. Mair; St. Veit: 1992, Bruggen 2003 1320 m; Sillian 1930 leg. Konecni; Tristach: Dolomitenhütte 1960 1600 m, Kreithof 1968 1050 m, Insteinalm 1981, 2004 1650 m, Tristacher See 1991 unter Fichtenrinde; Untertilliach: Raabtal 1980 1500m.

◆ *Ampedus nigerrimus* (Lacordaire, 1835)

Gaimberg: Postleite beim Leitnerbauern 23. 7. 1966 in Mulm einer hohlen alten Esche (*Fraxinus excelsior*) zusammen mit *Ischnodes sanguinicollis*, vid. Wurst 1995.

◆ *Ampedus sanguineus* (Linnaeus, 1758)

Häufige Art: über 50 Ex. von Amlach, Ainet, Anras, Assling, Dölsach, Gaimberg, Nikolsdorf, Nußdorf, Leisach, Lienz, Matrei, Oberlienz, St. Johann, Thurn,

Tristach. – In den Tal-Gemeinden vielfach öfters und auch in weiterer Umgebung, mehrfach vid. Cate 1992. – Vereinzelte Ex. in Fichtenholz und unter Fichtenrinde, an Föhren-Rundholz, in Pheromonfalle, Anflug an Buche. – Vorwiegend in Tallagen: vereinzelt in mittleren Höhen: Oberlienz: Ranachalm 1995 1200 m; Leisach: Reiteralm 1972 1500 m; Tristach: Dolomitenhütte 1969 1620 m.

◆ *Ampedus cinnabarinus* (Eschscholtz, 1829)

Im inneralpinen Raum offenbar selten: Lavant: 30. 5. 1964 an Buchenklaftern; St. Johann 16. 4. 1968 in Nußbaumholz (*Juglans regia*), beide Ex. vid. Cate 1992.

◆ *Ampedus pomonae* (Stephens, 1830)

Amlach: Stadtweg 8. 6. 1983 det. Cate 1989; Nikolsdorf: Drauai beim Bahnhof 4. 5. 1998 (7) in Grauerle (*Alnus incana*).

◆ *Ampedus sanguinolentus* (Schrank, 1776)

GREDLER 1863, 229: bei Lienz (Ros.). – Ainet: Weiherburg 2. 6. 1968 det. Cate 1989; Lavant 15. 6. 1983, Golfplatz 2. 5. 2008 an *Populus x canadensis*; Nikolsdorf: beim Bahnhof rechte Drauai 2. 7. 1983 und 4. 5. 1998 (4) unter Erlenrinde (*Alnus incana*), Nörsach 1. 6. 1986; Lienz: 1930 leg. Koneczni; Tristach: Tristacher Au 16. 5. 1960 und 10. 6. 1961.

◆ *Ampedus pomorum* (Herbst, 1784)

Folgende Belege wurden anhand einer Auswahlendung durch Cate 1992 bestimmt: Dölsach: Aguntum 1983 (2), Eichholz 1987 in weißfaulem Nußbaumholz (*Juglans regia*), Gödnach 1987; Lavant: 1965 (3), 1990; Nikolsdorf: beim Bahnhof rechte Drauai 1982 (2), 1983 (2); Nußdorf-Debant: Nußdorf 1965 in Fichtenstrunk, 1988 in rotfauler Fichte, Debant 1960; Oberlienz: Glanzer Au 1975 (2); Tristach: Jungbrunn 1960; Untertilliach: Raabtal 1980 1500 m. – Weitere Funde ergaben sich dann: Amlach: Stadtweg und Goggsteig 1993; Ainet 1968; Dölsach: Gödnach 1993 in Weide, Eichholz 1993 hinter Eichenrinde, Görtschach 1974 leg. coll. F. Mair; Gaimberg 1962; Iselsberg 1970; Kals: Unterpeischlach 1964; Lavant 1964–2006 (11), Forst-Lehrweg 2006; Lienz-Stadt: Ma. Trost 1960 (2), 1961, 1962 leg. coll. Holzschuh, Alleestraße 1963 leg. coll. Holzschuh; Nikolsdorf: Flugplatz 1967 in Fichtenmulm, 1970, rechte Drauai beim Bahnhof 1998 (9) in Erle (*Alnus incana*); Nußdorf 1963; Oberlienz: Glanzer Au 1966, 1967 (3) in Grauerle (*Alnus incana*); St. Johann 1967 in Fichte; Thurn 2008; Tristach: Tristacher Au 1960 (2), 1962, 1965 (2); Virgen: Niedermauern 1970.

◆ *Ampedus nemoralis* Bouwer, 1980

ZEISING & SIEG (1983): Entomol. Blätter: „Weitgehend unbekannt, da bis jetzt nur wenige Meldungen aus der BRD“. – Lavant: 14. 7. 1965; Nikolsdorf: Drau-Au beim Bahnhof 26. 5. 2008; Nußdorf-Debant 27. 3. 1960, det. Cate 1989 und 1962. – Salzburg: Fürberg Mai 1977 und Weitwörth je 1 Ex. leg. Defregger det Cate 1989, in coll. Kofler.

◆ *Ampedus quercicola* (Buysson, 1887)

Amlach: Amlacher Au 28. 5. 1960; Dölsach: Kapaun 22. 5. 1969, Eichholz bei Kapaun 19. 3. 1988 und 9. 4. 1993 (2) in Stieleiche (*Quercus robur*); Lavant: 18. 8. 1985 (4) in Grauerle (*Alnus incana*), 2. 7. 1965, 2. 8. 1986; Nikolsdorf: Etschberg, 6. 4. 1983, Drau-Au beim Bahnhof 2. 7. 1983, Flugplatz 11. 4. 1970 in Grauerle (*Alnus incana*); Oberlienz: Glanzerau 9. 5. 1966; Matrei: 4. 5. 1978; Tristach: Tristacher Au 28. 5. 1960. – Alle Ex. rev. det. Cate 1992.

◆ *Ampedus triangulum* (Dorn, 1925)

ZEISING & SIEG 1983, 14–15, Abb. 4: „Bis jetzt nur aus verschiedenen Gebieten der DDR und BRD gemeldet“. – LOHSE & LUCHT 1992, 30: „In ME. vbr., aber n. h. und nur stellenweise. Auch aus der Tschechoslowakei gemeldet“. – KÖHLER & KLAUSNITZER: 99: in 6 deutschen Bundesländern. – Amlach: Goggsteig 8. 6. 1963; Leisach: Lienzer Klause 12. 5. 1979 in faulem Fichtenstamm; Nußdorf 6. 2. 1979, 9. 3. 1963 in coll. Cate. – Alle Ex. det: Cate 1992.

◆ *Ampedus nigroflavus* (Goeze, 1777)

Dölsach: Aguntum 12. 4. 1968 in fauler Grauerle (*Alnus incana*) am Boden; Tristach: Tristacher Au 20. 4. 1968, beide Ex. vid. Cate 1989.

◆ *Ampedus elongatulus* (Fabricius, 1787)

Amlach: Goggsteig 4. 5. 1966; Dölsach Mai 1975 leg. Defregger in coll. Kofler; Leisach: Lienzer Klause 22. 5. 1970 und 17. 7. 1991 det. Kofler 1993; Lienz-Stadt: Ma. Trost 20. 4. 1960, Adolf-Purtscher-Straße 11. 5. 1971 leg. Ernstbrunner in coll. Kofler; Nikolsdorf: Nörsach 13. 5. 1966, Nörsacher Teich 17. 6. 1991 in Genist det. Kofler. – Alle Ex. det. Cate 1992.

◆ *Ampedus nigrinus* (Herbst, 1784)

Amlach: Alter See westlich vom Tristacher See 5. 8. 1982 vid. Wurst 1995, Franz-Lerch-Weg in den Lienzer Dolomiten 16. 7. 1994 in 1050 m; Kals: Knopfbücke 22. 6. 2008 in 1240 m; St. Johann: 16. 7. 2004 Forstweg bei der Kirche; Tristach: Kreithof 26. 5. 1978 in 1050 m vid. Wurst 1995, 8. 6. 2004 am Waldweg.

◆ *Ampedus auripes* (Reitter, 1895)

WURST & KAUPP 1995, 83: „Osttirol, Lienz Umg., Hochsteinhaus, 2000 m ü. NN, 25. 6. 1969, leg. Kropsch (coll. Kofler): Neufund für Osttirol!“ – Weitere Neufunde: Schweiz (Graubünden), Nordtirol, Südtirol, Kärnten, Steiermark, dazu Bayerischer Wald, Sudeten, Westkarpaten. – Der Fund aus Osttirol liegt im Gemeindegebiet Assling: Bannberg 4 Ex. in coll. Kofler, rev. Wurst 1994.

◆ *Brachygonus* (= *Ampedus*) *megerlei* (Lacordaire, 1835)

KOFLER 1963, 34: 2 Funde von 1960. – Dölsach: 9. 2. – 26. 3. 1967 e. l. halbseitig fauler Apfelbaum (*Malus domestica*); Gaimberg: Grafenbach 11. 2. 1960 halbseitig fauler sonst grüner Erlenbaum (*Alnus incana*); Gaimberg: 20. 2. 1960 Waldrand halbseitig faule sonst grüne Birke (*Betula pendula*); Lienz: Minekugel am Ostrand der Stadt an der Straße nach Nußdorf 7. 9. 1965 in einem mittelstarken, einseitig morsch, weißfaulen Apfelbaum 2 m über dem Boden; Ainet: Gwabl 23. 3. 1979 980 m. – Alle 5 Ex. vid. Cate 1992.

◆ *Ischnodes sanguinicollis* (Panzer, 1793)

Gaimberg: Postleite in Untergaimberg westlich Nußdorf beim Leitnerbauern vom 20. 9. 1966 bis 7. 3. 1969 30. Ex. von doppelt so vielen Larven e. l. in feuchtem Mulm einer stehenden, innen hohlen Esche (*Fraxinus excelsior*). Durch eine recht große Öffnung in Bodennähe konnte eine größere Menge an Feinmulm mitgenommen werden, in einem 40 l–Aquarium durch geringe Wasserzufuhr feucht gehalten. Die Verpuppung erfolgte in kokonartigen Mulmknöllchen: 22. 9. 1966 larva, 8. 7. 1967 pupa, 22. 7. 1967 imago. – Begleitarten waren: *Aderus populneus*, *Dendrophilus punctatus*, *Ampedus nigerrimus*, *Procræus tibialis*, *Liocola marmorata*. – Belege in verschiedenen Sammlungen: Ermisch, Holzschuh, Berninger, Peez u. a.; Ainet: Gwabl 11. 5. 1979 980 m unter Rinde von Berg-Ulme (*Ulmus glabra*); Lavant: Auerlinggraben, Dorfbach 17. 7. 1988 nur ein Halsschild im Mulm einer hohlen Rot-Buche (*Fagus sylvatica*).

◆ *Procræus tibialis* (Lacordaire, 1835)

Gaimberg: Postleite Untergaimberg e. l. 22. 6. 1969 – Juli 1971 in Mulm einer hohlen Esche mit *Ischnodes sanguinicollis*, vid. Cate 1989.

◆ *Sericus brunneus* (Linnaeus, 1758)

Ainet: Alkuser See 1930 bei 2400 m leg. Koneczni, Ortsgebiet 1968; Assling: Bannberg: Böses Weibele 1937 um 2500 m leg. Koneczni; Außervillgraten: Winkeltal 1964 1500 m; Kals: „Dorfer Alpe“ im Dorfertal 1930 leg. Koneczni, Teischnitztal 1967 2000 m; Kartitsch: Obstanser Wiesen 1960 2000 m; Lavant 1992; Obertilliach: Schwalen bei Leiten 1988 1400 m; St. Jakob: Brunnalm 1967 1900 m und Mooserberg 1967 2300 m; Sillian: Leckfeldalpe 1948 (2) 2200 m leg. Koneczni.

◆ *Sericus subaeneus* (Redtenbacher, 1842)

Amlach: Goggsteig 8. 6. 1963; Lienz: Schloßberg 24. 6. 1938 leg. Koneczni; St. Veit: Bruggen 5. 6. 1960 leg. Tegischer in coll. Kofler; Sillian: Forcher Kaser 15. 6. 1948 2000 m leg. Koneczni (die Forcher Kaser: Almhütte liegt bei 1620 m am Helmweg in den Karnischen Alpen bei Sillian); Thurn: Zetttersfeld 28. 6. 1965 (3) 2000 m, z. T. fliegend.

◆ *Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758)

GREDLER 1863, 221: Lienz (Ros.). – Amlach: Alter See 1960, Goggsteig 1962, 1963; Ulrichsbichl 1965; Ainet 1966; Anras: Mittewald 1982; Dölsach: Kapaun 1979; Gaimberg: Postleite 1960; Heinfels: Hinterheinfels 1943 leg. coll. F. Kofler, Panzendorf: Rabland 1949 leg. Koneczni, Panzendorf 1988, 2007 leg. H. Mair; Kals: Moaralm 2005 1800 m; Leisach 1978; Lienz-Stadt: 1930 (4) leg. Koneczni, Schloßberg 1938 leg. Koneczni, Ma. Trost 1960, 1968 (2) in hohler Eiche; Matrei: Brühl 1987, Ranboden 1994 1620 m oberhalb Strumerhof; Nikolsdorf: Bahnhof Drau-Auen 1982 (2); Obertilliach: Leiten Schwalen-Moor 1964 1400 m; St. Johann: rechter Iselweg 2008 (2) in Föhrenzapfen; St. Veit: Bruggen 1960 leg. Tegischer; Strassen: Tassenbach 1948 leg. Koneczni; Thurn 1960; Tristach: Jungbrunn 1960, Tristacher Au 1964.

◆ *Agriotes ustulatus* (Schaller, 1783)

WERNER 1934, 373: Amlach 1932. – Häufige Art incl. *var. flavicornis* etwa 60 Ex. 1960–2001: Amlach, Anras, Assling, Dölsach, Heinfels, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei, Nikolsdorf, St. Johann, St. Veit, Tristach, vor allem in den Gemeindegebieten der Tallagen. – Amlach: Franz-Lerch-Weg 1978 1050 m; Matrei: Zedlacher Paradies 1982 1500 m; Tristach: Instein Alm 1978 1700 m.

◆ *Agriotes litigiosus* (Rossi, 1792)

GEISER 2001, 316: Salzburg, Nordtirol. (= *var. laichartingi* Gredler, 1863) – HELLRIGL 1996, 447. Dölsach: – Gödnach 15. 7. 1986 Bachufer im Sand unter Stein, vid. Pace 1992; Lavant: Auwald 30. 6. 1994 gestreift; Nikolsdorf: Nörsach: 17. 7. 1995, Lengberg: östlich am Gantschenbach 25. 7. 2001 unter Rindenstück im Sand-Boden, Drau-Auen beim Bahnhof 2. 9. 2002. – Südtirol: Neustift bei Brixen 13. 7. 1969 leg. coll. Kofler det. Cate 1992, dazu auch HORION 1953, 298.

◆ *Agriotes pilosellus* (Schönherr, 1817)

Ainet: 1. 5. 1966, 16. 5. 1968, in Alkus 7. 5. 1994; Assling: Thal Draufer 11. 7. 1948 leg. Koneczni; Dölsach: Aguntum 6. 6. 1992, Kapaun 2. 6. 1978; Iselsberg: beim Plautzbauern 27. 3. 1983 1550 m; Kals: Unterpeischlach 27. 5. 2006; Leisach 31. 5. 1962 (2); Lienz-Stadt: Ma. Trost 12. 5. 1960 (2), Grafenanger bei Gärtnerei Seeber 17. 5. 1994; Matrei 1930 leg. Koneczni; St. Johann: Ortsgebiet 4. 6. 1993, Sonnseite: Roßkopfweg 13. 5. 1999 950 m; Strassen: Tassenbach in Hochwasser-Genist 3. 6. 1951 leg. Koneczni.

◆ *Agriotes obscurus* (Linnaeus, 1758)

Ainet: Weiherburg 1965; Assling: Bannberg 1965; Heinfels: Hinterheinfels 1943 (2) leg. coll. F. Kofler, Panzendorf: Rabland 1950 leg. Konecni, Panzendorf 1989 leg. H. Mair; Hopfgarten 1968; Kals: Bergertal 1938 leg. Konecni, „Dorfer Alpe“ im Dorfer Tal 1937 leg. Konecni; Kartitsch: Tannwiese 1978 1530 m; Lavant 1978, 1986, 1987 (3) in Methanal-Bodenfalle; Lienz-Stadt: 1937 leg. Konecni, Ma. Trost 1960; Matrei 1930 leg. Konecni; Nikolsdorf: Nörsach 1961, 1982, Bahnhof Drau-Auen 1978, 1991; Prägraten 1930 leg. Konecni; St. Johann: Oblas-Stausee 2001 1070 m; St. Veit 1987; Sillian: 1948 (6) leg. Konecni; Tristach: Tristacher Au 1959, Tristacher See Westufer 2002.

◆ *Agriotes sputator* (Linnaeus, 1758)

GREDLER 1873, 3. Nachlese: am Kalser Törl (Biasioli). – FRANZ 1943, 330: Dorfertal unterer Teil 1937. – Amlach: Alter See 1960; Gaimberg: Grafenbach 1985; Lavant 1938 leg. Konecni, 1987, 1999; Lienz-Stadt: 1930 (4) leg. Konecni, Brauerei 1961, Schloßbrücke: Iselgenist 1963, Südtiroler Siedlung 1963, Ma. Trost 1965 und 1995, Patriasdorf 1965; Nikolsdorf: Lengberg 2002; Nußdorf 1960; St. Johann 1983, Iselufer 2004; Thurn 2008; Tristach: Tristacher Au 1964; Virgen: Obermauern 1978.

◆ *Ectinus* (= *Agriotes*) *aterrimus* (Linnaeus, 1761)

Ainet: 1966, 1968 (2); Anras: Mittewald 1965, 1966; Assling: Thal 1978, Weidenbrünnl in Thal-Wilfern 1996; Dölsach: Aguntum 1965; Gaimberg 1960 (2); Kals: Staniska 1964, Schleierfall 2000; Lavant: 1966, Forchach 1998, 2006, Drau-Au Erlenwald 2008; Leisach. Leisacher Au 1961; Lienz-Stadt: 1930 leg. Konecni, Iselkai 1960, Ma. Trost 1962 leg. Holzschuh, 1969 in Blüten von Traubenkirsche (*Prunus padus*), beim Bahnhof 2001 (2), Pfister 2005; Nikolsdorf: Lengberg 1988, Nörsach 1989 in Methanal-Bodenfalle, 1999; Nußdorf: Debant 1960, 1963; Oberlienz: Glanzer Au 1966; St. Johann 1965; Tristach: Tristacher Au 1965, Draufer 2004.

◆ *Betarmon bisbimaculatus* (Fabricius, 1803)  
(= *Betarmon ferrugineus*)

GREDLER 1863, 221: Lienz (Ros.). – Nußdorf: Debant 17. 7. 1987; Lavant 22. 6. 1978; Lienz-Stadt: 1930 (4) und 25. 6. 1937 leg. Konecni, Juni 1962 Friedenssiedlung, Hausgarten am linken Iselufer 11. 6. 1978 an „Weinkraut“ (Eberraute: *Artemisia abrotanum*, Duft-, Gewürz- und Arzneipflanze); Tristach: rechter Drauweg am Waldrand 7. 7. 2006 (2).

◆ *Idolus picipennis* (Bach, 1852)

Amlach: Goggsteig 8. 6. 1963 1050 m; Ainet: Weiherburg 12. 5. 1967; Dölsach 1965; Heinfels: Panzendorf 17. 5. 1989 (2); Hopfgarten 26. 5. 1968; Kartitsch: Dorfberg 22. 7. 1982 2100 m; Lienz-Stadt: 1930 (2) leg. Konecni, Ma. Trost 1958 (8); Matrei: Huben 1965, Schloß Weißenstein 1965; Oberlienz: St. Helena 16. 5. 1958 det. Peez; St. Johann 1965; St. Veit: Osing 1965; Schlaiten: Weiße Wand 13. 7. 1988 2100 m; Thurn: Feuerwehr 2008; Tristach: Kreithof 11. 6. 1996 1050 m; Virgen: Obermauern 27. 7. 1978 (2), 10. 8. 1989, 30. 6. 1990, bei 1400 m.

◆ *Synaptus filiformis* (Fabricius, 1781)

Ainet: Weiherburg 1967; Dölsach: Gödnach 1986 (2), Kapaun 1979; Gaimberg: Grafenbach 1960; Heinfels: Panzendorf Rabland 1949 (2) leg. Konecni, Panzendorf 1987 leg. H. Mair; Lavant 1964, 1984; Nikolsdorf: Nörsach 1965–1979 (12); Sillian 1949, 1950 leg. Konecni; Strassen: Tassenbach 1999; Tristach: Tristacher Au 1960, 1963, Jungbrunn 1960.

◆ *Adrastus*: alle Ex. dieser Gattung wurden 1989 durch Cate, Wien, revidiert: *Adrastus axillaris* Erichson, 1842

Amlach: Klammbrücke 16. 7. 1986 und 1. 7. 1993 (4) 1100 m; Ainet: Alkus 29. 6. 1990 1200 m; Assling: Bannberg 4. 7. 1998; Lienz: Friedenssiedlung 5. 8. 2008 auf Ahornblatt-Unterseite (*Acer pseudoplatanus*); Strassen: Tassenbach Gailufer 10. 7. 2008; Tristach: „Rauchkofel“ 11. 7. 1959 leg. Holzschuh in coll. Kofler; Virgen: Obermauern 15. 6. 1989 1400 m. – *Adrastus limbatus* (F., 1776) ist vorerst in Osttirol nicht mehr vertreten.

◆ *Adrastus lacertosus* Erichson, 1842

Amlach: Galitzenklamm 1962 (2), Klammbrücke 1984 1050 m; Assling: Mittewald 1988 leg. H. Mair, 1994, Thal: Weidenbrünnl 2005; Dölsach: Kapaun 1995; Gaimberg: Grafenbach 1959, 1960 (14); Lavant 1978, 1989, Forchach: 1995 Lichtfalle leg. Deutsch; Lienz-Stadt: linker Drauweg 1970, Brauerei 1962; Matrei: Iselufer 1990 (5); Nikolsdorf: Lengberg 1980, Nörsach 1961, 1979; Nußdorf: Debant 1987, 1989 (2); Oberlienz: Lesendorf 1978; St. Jakob: 1970 (2); Strassen: Tassenbach 1978 (4); Tristach: Tristacher Au 1989; Virgen: Niedermauern Iselufer 1960.

◆ *Adrastus pallens* (Fabricius, 1792) (= *Adrastus nitidulus*)

Amlach: Auwald Draufer 2008; Assling: Mittewald Draufer 1995 (6) an Weide (*Salix sp.*); Dölsach: Kapaun 1995 (2); Gaimberg: Grafenbachl 1962 (3), 1980; Heinfels: Panzendorf Rabland 1959; Kartitsch: St. Oswald 1962; Lavant: Forchach 1995 (5) Lichtfang leg. Deutsch; Lienz-Stadt: Iselkai Bachgenist 1959, Friedenssiedlung 1999, Schweizergasse (Scheitz-Garten) 1998 an altem Efeu (*Hedera helix*); Nikolsdorf: Nörsach 1961 (2), 1966 (4); Sillian 1943 (4) leg. coll. F. Kofler, 1960 leg. Konecni; Tristach: Tristacher Au 1959, 1964 (2), Jungbrunn 2008; Virgen: Niedermauern 1960.

◆ *Adrastus rachifer* (Fourcroy, 1785)

WERNER 1934, 373: Amlach – nur nominell übernommen. Auch *Adrastus montanus* (Scopoli, 1763) vorerst für Osttirol nicht bekannt.

◆ *Melanotus brunripes* (Germar, 1824)

Heinfels: Panzendorf-Ort 7. 7. 1990 in Hausgarten 1100 m leg. H. Mair in coll. Kofler det. Cate 1992. – Niederösterreich: Wachau Rehstein 16. 5. 1990 500 m leg. F. Mair in coll. H. Mair det. Cate 1992.

◆ *Melanotus rufipes* (Herbst, 1784)

GEISER 2001, 318: „*Melanotus rufipes* ist ein Homonym, derzeit gültiger Name nach Cate in litt. *Melanotus villosus* (Fourcr.),„

GREDLER 1863:218: Lienz (Ros.). Nur nominell übernommen. – Häufige Art: ca. 50 Ex. – Abfalterbach, Ainet, Amlach, Assling, Dölsach, Gaimberg, Heinfels, Iselsberg, Kals, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, Oberlienz, St. Veit, Thurn, Tristach. – Vor allem in Tallagen, höchstens bis: Amlach: Kerschbaumer Alm 1959 1900 m; Assling: Bichl 2000 1440 m; Dölsach: Weg zum Ederplan 1961 bei 1400 m. – Lavant: Forellenhof e. l. in Mulm rotfauler Tanne (*Abies alba*): 27. 7. 1969 larva, 30. 7. 1970 pupa, 23. 8. 1971 imago, zusammen mit *Ceruchus chrysomelinus*.

◆ *Melanotus castanipes* (Paykull, 1800) früher mit *M. rufipes* vereinigt.

Amlach: Kerschbaumer Tal 1993 1400 m; Dölsach: Görttschach 1967 in Eiche; Gaimberg: 1960 in Birke; Kals: Knopfbrücke 2008 1240 m; Leisach: Luggauer Brücke 1983 e. l. in Fichte, Burgfrieden 1988 in Pheromonfalle; Lienz-

Stadt: Patriasdorf 1959 leg. coll. Holzschuh det. Hölzel; Nikolsdorf: Nörsach 1979 (2), Draufuer 1983; St. Johann: 1979, Oblas 1987 Lichtfang; St. Veit: Osing 1965 an blühender Traubenkirsche (*Prunus padus*) det. Peez 1967; Tristach: Kreithof 1988 1050 m.

◆ *Melanotus niger* (Fabricius, 1792) (= *punctolineatus*)

Gaimberg: Postleite 1960 (4) det. Peez, Mai 2008 (3) an Kerbel (*Anthriscus* sp.); Leisach: 18. 5. 1968, Lienzer Klause 25. 5. 1963 det. Peez; Lienz-Stadt: 1930, 13. 6. 1938 leg. Koneczni det. Peez, Ma. Trost 19. 6. 1960 det. Peez, 12. 5. 1988, 31. 5. 1992, 12. 7. 2004; Nikolsdorf: Flugplatz 31. 5. 1967; Nußdorf 18. 6. 1970; Strassen: Tassenbach Stausee 14. 7. 1989.

◆ *Melanotus crassicollis* (Erichson, 1841)

Nikolsdorf: Lengberg 2. 7. 1991 Lichtfang leg. H. Mair; Lienz-Stadt: Ma. Trost 14. 6. 1969 leg. Ernstbrunner coll. Kofler, 3. 5. 1978 – 21. 2. 1979 e. l. in Eiche (*Quercus robur*); St. Johann 7. 3. 1979 in Grauerle (*Alnus incana*); Tristach: Kreithof 3. 5. – 21. 7. 1993 e. l. in Fichte 1050 m.

◆ *Lacon* (= *Adelocera*) *lepidopterus* (Panzer, 1801)

KOFLER 1994: Dölsach: Kapaun Juni 1974 leg. Frick coll. Defregger, det. coll. Kofler 1988; Hopfgarten etwa 1937 leg. Koneczni. – Kärnten: Mölltal Raufen in Obervellach 24. 5. 1992 an Kirchenmauer kriechend.

◆ *Danosoma fasciatus* (Linnaeus, 1758) (= *Lacon fasciatus*)

GREDLER 1863, 216: LIENZ (Ros.). – HOLZSCHUH 1971:16: Assling: Bannberg 8. 6. 1963 1 Ex. an Fichte. – Assling: unterhalb Bannberg 31. 5. 1963 in Fichtenschlag an Strunk, Kristeinerl: Pfliegeralm 6. 7. 1983 in 1600 m tot am Weg; Dölsach: April 1979 leg. Defregger det. coll. Kofler 1988, Kapaun April 1974 leg. Defregger coll. Kofler; Kals: Staniska 15. 5. 1964, Wasserweg 20. 9. 2004 unter Fichtenrinde an Rundholz 1250 m; Kartitsch: 14. 6. 1949 1350 m leg. Wilcke coll. Kofler 1994; Leisach: Burgfrieden 24. 5. 1993 an Fichten-Rundholz; Lienz 1930 und 16. 6. 1938 Lienzer Dolomiten (vielleicht Kreithof 1050 m) leg. Koneczni; Oberlienz: Lesendorf 26. 8. 1964 leg. coll. Eitschberger. – Kärnten: Mölltal/Heiligenblut Juni 1973 leg. Defregger coll. Kofler 1988.

◆ *Agrypnus murina* (Linnaeus, 1758) (= *Adelocera murina*)

FRANZ 1943, 327: Kals am Weg ins Dorfertal 18. 7. 1937. – Amlach: Ulrichsbühl 1965; Assling: Mittewald 1963; Heinfels: Hinterheinfels 1943 (2) 1200 m leg. coll. F. Kofler, Panzendorf: Rabland 1949 leg. Koneczni, Panzendorf 1987 (5) 1989 und 2007 leg. H. Mair; Hopfgarten: Rajach 1967 1400 m leg. Scheidl in litt.; Lavant: 1960 (2) leg. Tegischer, Ulrichskirche 2003; Leisach 1963, am Bahndamm 1989 leg. H. Mair; Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Sonnenhof 1954 (2), Grafenanger 1979; Nikolsdorf: Lengberg 1991 Lichtfang leg. H. Mair; Sillian: 1950, Weitlanbrunn 1948 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach 1998; Tristach: Kreithof 1965 1050 m.

◆ *Dima elateroides* Charpentier, 1825

LUCHT 1987, 158: nur in Österreich. – Amlach: Galitzenklamm oberhalb Galitzenschmiede am Bachufer 1 stark verschlammtes Männchen – offenbar angeschwemmt 21. 7. 1962 vid. Peez 1962; Amlach: Alter See 5. 6. 1978 und 23. 4. 1988 jeweils 1 Flügeldecke; Leisach: Burgfrieden 26. 4. 1987 Flügeldecke gesiebt; Nikolsdorf: Nörsach 31. 5. – 3. 9. 1970 in Methanalfalle beim Teich, im Auwald beim Bahnhof in Mulm an Kalkfelsen 28. 7. 1982 Flügeldecke gesiebt; Tristach: Kreithof 25. 8. 1971 Flügeldecke gesiebt. – Kärnten: Gailtal: Mauthen/Untere Valentin Alm 23. 6. 1991.

◆ *Ctenicera* (= *Corymbites*) *virens* (Schrank, 1781)

GREDLER 1863, 225: Lienz blühende *Berberis* (Ros.). – Häufig, über 40 Stück. – Ainet, Amlach, Assling, Kals, Kartitsch, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei, Obertilliach, Schlaiten, Tristach, Virgen. – Vor allem in den Monaten Mai bis Juli montan bis alpin: Amlach: Dolomitenhütte 1620 m, Insteinalm 1670; Kals: Lucknerhaus 2100 m; Kartitsch: Tannwiese 1500 m; Lavant: Almtal 1200 m; Obertilliach: Klafpsee 1600 m; Tristach: Insteinalm 1670 m; Virgen: Pebellalm 1600 m. – Normalfärbung und *var. inaequalis* fast gleich oft vertreten.

◆ *Ctenicera heyeri* (Saxesen, 1838)

Nur älterer Einzelfund: Strassen: Tassenbach 30. 6. 1949 leg. Koneczni.

◆ *Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus, 1758)

Häufig: fast 40 Ex. – Ainet, Amlach, Anras, Assling, Dölsach, Iselsberg, Kals, Kartitsch, Leisach, Lienz, Matrei, Nikolsdorf, St. Jakob, St. Johann, St. Veit, Sillian, Strassen, Thurn, Tristach, Virgen. – Auswahl an maximalen Höhenangaben: Kals: Dorfertal Böheimebene 1780 m, NPHT-TAV07: Kalser Tauernhaus 1754 m; Kartitsch: Winklertal 1500 m, Schöntal: Tscharre 2000 m; Matrei: Innerschlöß Gletscherweg 2200 m; St. Jakob: Staller Sattel 2000 m; St. Veit: Gritzer Seen 2500 m.

◆ *Ctenicera cuprea* (Fabricius, 1775)

WERNER 1934, 373: Kalsertörl 2200 m. – FRANZ: 1943, 329: Kals: Daberklamm, Dorfertal unterer Teil, Wangenitzen (Schobergruppe: Kärntner Mölltal)(Szekessy), Kals-Matreier-Törl WERNER 1934. – Von 1000 m bis vorwiegend in alpinen Lagen häufige Art, etwa 60 Ex. fast ausschließlich die *var. aeruginosus*. – Ainet, Amlach, Assling, Außervillgraten, Dölsach, Heinfels, Innervillgraten, Iselsberg, Kals, Kartitsch, Matrei, Prägraten, St. Jakob, St. Veit, Sillian, Strassen, Thurn, Tristach, Virgen. – Ausgewählte Höchsthunde: Ainet: Alkuser See 2430 m; Amlach: Kerschbaumer Alm 2000 m; Kals: Weg zur Glorerhütte 2300 bis 2600 m, NPHT-TAV07: Dorfsee 1935 m, Kalser Tauern 2515 m; Kartitsch: Dorfberg und Stuckensee 2100 m; Matrei: Goldriedsee 2270 m; Nußdorf-Debant/Thurn: Neualplseen 2200 m; Virgen: Zupalsee 2300.

◆ *Liotrichus* (= *Corymbites*) *affinis* (Paykull, 1800)

GREDLER 1863, 224: Lienz (Ros.). – Kals: Dabaklamm 4. 6. 1974; Lienz und Sillian um 1930 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach Hochwassergenist 13. 6. 1951 leg. Koneczni.

◆ *Actenicerus* (= *Corymbites*) *sjaelandicus* (Müller, 1764)

Ainet: Weiherburg 1968, 1969; Assling: Ort 1965, Thal 1982, Kristeintal: Moorgebiet 1988; Gaimberg: Postleite 1960 (2); Heinfels: Hinterheinfels 1943 (8) 1200 m leg. coll. F. Kofler, Panzendorf: Rabland 1988; Iselsberg: 1999, Stronach: Zwischenbergen-Moor 1988 (3) 1400 m; Kartitsch: Tannwiese 1965 (2), 1988, 1999 1530 m; Lavant 1963; Matrei: Tauerntal Innerschlöß 1960 1700 m; Nikolsdorf: Nörsach 1981, 1983; Obertilliach: Leiten Schwalen-Moor 1986, 1987 1400 m; Sillian 1949 (2), 1950, 1951 Drau-Hochwasser; Strassen: Tassenbach 1949 (3) leg. Koneczni, 1962, 1963 (4), 1965; Thurn: Zetttersfeld 1960; Virgen: Heckenfluren 1991 (2). – Kärnten: Gailtal Treßdorf 2004 leg. Deutsch.

◆ *Prosternon tessellatum* (Linnaeus, 1758)

(= *Corymbites holosericeus*)

GREDLER 1863, 222: Lienz (Ros.). – GREDLER 1878 5. Nachlese pp. 109/110: Obertilliach (Ebner) (sub *Athous undulatus*). – Werner 1934, 373: Hochsteinhütte

14. 4. 1932 (Assling: Bannberg). – Ainet: Gwabl 1983; Amlach: Goggsteig 1966; Dölsach: 1965 (2); Heinfels: Hinterheinfels 1943 1200 m leg. coll. F. Kofler, Panzendorf 1987 leg. H. Mair; Innervillgraten: Kalkstein Alfenalm 2006 1700 m; Kartitsch: Tannwiese 1978 1530 m, 1988; Lavant: Forchach 1996 (2); Leisach 1962 (2), Burgfrieden 1990; Lienz: 1930 (4) leg. Koneczni, Griebelhof 1939 leg. Koneczni, Ma. Trost 1960; Matrei: Zedlacher Paradies 1986 1450 m, Huben: Kienburg 1987, Tauerntal: Matreier Tauernhaus 1999; Prägraten: Umbaltau 2006 1500 m; St. Jakob 1998; St. Johann: Oberleibnig 1996; St. Veit: Bruggen 1960 leg. Tegischer; Sillian 1948 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach-Stausee 2006; Thurn: Neualpseen 1959 2200 m leg. Retter coll. Kofler; Tristach: Tristacher See 1959, Kreithof 1962 (2); 1979; Virgen: Obermauern 2000 „Hohe Bank“ 1410 m.

◆ *Anostirus (= Corymbites) purpureus* (Poda, 1761)

Amlach: Ulrichsbichl 1965, Alter See 1993 auf Föhrenzweig; Ainet: 1966; Assling: 1965; Leisach: Burgfrieden 1988 in Pheromonfalle; Lavant 1991 Lichtfalle bei der Kirche leg. Deutsch; Lienz: 1930 (4) leg. Koneczni, Ma. Trost 1960 (5), Iselkai 1960; Nikolsdorf: Nörsach 1983, Lengberg 1983, am Weg nach Plon 1989 1100 m, am Gantschenbach 2000; Oberlienz: St. Helena 1958, Tschitscheralm 1959 ca. 1500 m; Obertilliach: 1948 leg. Koneczni, Leitnertal 2000 1480 m; Schlaiten: Huber Alm 1988 1700 m; Virgen: Heckenfluren 1991.

◆ *Anostirus gracilicollis* (Stierlin, 1896)

St. Johann: 7. 5. 2003 Lichfang leg. Deutsch; Virgen: Obermauern 12. 5. 2002; Zuordnung durch sorgfältige Prüfung der Unterseite bzw. des letzten Sternits.

◆ *Anostirus (= Corymbites) zenii* (Rosenhauer, 1856)

Einzelfund: Amlach: Lienzer Dolomiten Franz-Lerch-Weg 4. 5. 1966 an Felswand kriechend, vid. Cate 1988. – Südtirol: „Südtirol 1933“ ohne nähere Angaben leg. Ammann coll. Kofler – Vallarsa: Val di Prignonieri 27. 5. 2009 leg. Ratter coll. Kofler; – Kärnten: HÖLZEL 1961, 158; Wolfsberg: Koralpe Rasinggraben leg. Budberg. – HORION 1953, 270: *Corymbites zenii*: Südeuropa: Spanien, Italien, Südtirol, loc. typ.: „Rovereto in Südtirol“. – PEEZ & KAHLER 1977, 244: Runkelstein bei Bozen nach GREDLER 1863; am Wasserfall von Salurn.

◆ *Anostirus (= Corymbites) sulphuripennis* (Germar, 1843)

GREDLER 1863, 225: 1 Ex. bei Lienz (*apicalis* Dej., Ros.). – Assling: Mittewald Draufer 29. 5. 1950 leg. Koneczni; Hopfgarten: 1930 leg. Koneczni; Thurn: Helenental 21. 5. 1960 an blühender Eberesche (*Sorbus aucuparia*), alle 3 Ex. vid. Cate 1992; Hopfgarten: beim „Auentümpfl“ rechtes Bachufer hinter der Blosbrücke 3. 7. 1999 auf Dolden; Kartitsch: Hollbruckertal 6. 6. 1912 leg. Ratter coll. Kofler; Matrei: Tauerntal Innerschlöß 30. 6. 1978; Nikolsdorf 31. 5. 1935 leg. coll. Hassenteufel in litt. 5. 2. 1965.

◆ *Haplotarsus incanus* (Gyllenhal, 1827) (= *Corymbites quercus*)

Assling: Kristeintal: Pfliegeralm 1983 (4) 1600 m, Kristeiner Möser 1988 (2), Burgertal 2002 1550 m; Heinfels: Panzendorf Rabland 1949 (4) leg. Koneczni, 1988 (2) leg. Kofler; Innervillgraten: Ahrntal beim Sinkensee 2002 1650 m; Kals: Wasserweg 2002 1280 m; Kartitsch: Tannwiese 1999 1530 m; Lavant 1936 leg. coll. Hassenteufel in litt. 1965; Lienz: 1930 leg. Koneczni; Matrei: Eingang Virgental 1988; Nikolsdorf: Nörsacher Teich-Genist 1991, Nörsach 1965 (6 fa. typ., 1 Ex. ab. *ochropterus*), Drauaue beim Bahnhof 1992, 1988 (3); Sillian 1947, 1951 (2) in Draugenist leg. Koneczni; St. Jakob 1970 (2) Wasserweg 2002 1370 m; Strassen: Tassenbach 1949 leg. Koneczni; Tristach: Jungbrunn 1960 ab. *ochropterus*.

◆ *Haplotarsus angustulus* (Kiesenwetter, 1858)

Heinfels: Tessenberger Alm 18. 6. 1993 2100 m; Iselsberg: Geiersbichl 10. 6. 2003 (2) 1860 m; Kartitsch: Tannwiese 21. 5. 1965 (3) 1530 m vid. Cate, 1 Ex. in coll. Cate; Thurn. Zetttersfeld 28. 6. 1965 (3) 2000 m z. T. fliegend det. Peez.

◆ *Selatosomus* (= *Corymbites*) *melancholicus* (Fabricius, 1798)

GREDLER 1863, 222: Jagdhausalpe (Gdl.), (im Deferegental bei St. Jakob, 2000 m). – FRANZ 1943, 329: Dorfer Tal unterer Teil auf den Grasmatten unter Steinen sehr häufig in beiden Formen 15./17. 7. 1937 (f. typ. und ab. *simplonicus* Fabr.). – HORION 1953:274: Ost-Tirol: Dorfer Tal bei Kals h. im unteren Teil auf den Grasmatten unter Steinen: nach Franz 1943. – GEISER 2001, 320: Kärnten: mehrere Meldungen aus dem Glocknergebiet (FRANZ 1943); Kals: Dorfer Tal (FRANZ 1943); Prägraten: Umbaltal (cLe = coll. Leeder, Haus der Natur Salzburg). – Kals: Dorfer Alpe 18./25. 7. 1937 (5) leg. Koneczni, Kalser Tauernhaus 12. 7. 1949 (2) leg. Ratter coll. Kofler, Daberkamm 20. 8. 1965 und 13. 7. 1983 (3) davon 1 Ex. in coll. Cate; Matrei: Prosegglamm 27. 7. 1962; Prägraten: Clarahütte 4. 8. 1971 (2), 4. 8. 1978, 13. 7. 1982 2100 m leg. Goller, Umbaltal 17. 6. 1977 von Schülern nach Wandertag gebracht; Innervillgraten: Kalkstein Alfenalm 4. 7. 1982 1750 m: alle Ex. vid. Cate 1992. – Kals: Dorfertal Juli 1967 1700 m leg. Scheidl, in litt.; (10) ganze Strecke am Weg kriechend, Daberkamm 31. 7. 2004 (2) 1550 m; Kals: Dorfertal 6. 7. 1998 1500–1700 m, Moar-Alm 4. 7. 1999 1700 m, Prägraten: Umbalfälle 21. 6. 2005 (2) 1550 m am Weg kriechend; Sillian: Leckfeldalm Rundweg 27. 6. 2004 2000 m.

◆ *Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758)

GREDLER 1863, 223: Lienz (Ros.). – FRANZ: 1943, 329: Kals: am Weg ins Dorfertal 1937. – Sehr häufige Art: f. typ., ab. *germanicus*, ab. *cyaneus*, ab. *coerulelescens*, über 130 Ex. – Ainet, Amlach, Anras, Assling, Dölsach, Heinfels, Hopfgarten, Innervillgraten, Kals, Kartitsch, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, Oberlienz, Obertilliach, Prägraten, St. Jakob, St. Johann, St. Veit, Schlaiten, Sillian, Strassen, Thurn, Tristach, Virgen. – Maximalhöhen, Auswahl: St. Jakob: Reichenbergerhütte 2500 m; Prägraten: Clara Hütte 2100 m; Amlach: Große Gamswiesenspitze Südhang 2150 m; Kals: Ganotzalm 2150 m, NPHT-TAV07: Kalser Tauernhaus 1754 m; Schlaiten: Weiße Wand 2100 m; Sillian: Thurntaler 2000 m.

◆ *Selatosomus rugosus* (Germar, 1817)

FRANZ 1936, 248: Obstanser See-Umgebung leg. Hicker. – FRANZ 1943, 329: Weg von der Stüdlhütte nach Kals hochalpin im Teischnitztal 1938; Dorfer Tal oberster Teil 1937. – HOLDHAUS 1939, 188: im Laserzgebiet südlich von Lienz (Holdhaus) (Lienzer Dolomiten)(ergänzend dazu auch HOLDHAUS 1912). – Hopfgarten: Sichelsee 1989 2500 m; Kals: NPHT-TAV07 Dorfersee 1935 m; Kartitsch: Obstanser See 1930 leg. Koneczni, Schöntal Filmoor 1978 (3) 2400 m, Stuckenseen 1988 2100 m, Erschbaumertal Tscharre 1982 2100 m; Matrei: Tauerntal: Alte Pragerhütte 1960 (4) 2600 m, 1991 (2) 2600 und 2700 m leg. Deutsch; Nußdorf-Debant/Thurn: Neualpseen 1959 (4) 2400 m leg. Ritter coll. Kofler; Nußdorf-Debant: Debanttal Franz-Keil-Weg 1988 2200 m; Ainet: Alkuser See 1962 (7) 2432 m, leg. Holzschuh; Obertilliach: Porzekar 1948 (2) 2250 m und Rollertalschluß 1943 2000 m leg. Koneczni, oberhalb Porzehütte 1978 (2) 2200 m; Prägraten: Maurertal 1978 um 1900 m; St. Jakob: Staller Sattel 1960 2000 m, Patschertal 1963 2400 m, Barmerhütte 1963 2600 m, unterhalb Jägerscharte 1963 2400 m, Bachlenkenkopf 1989 (2) 2700 m, Gösleswand 1989 (3) 2912 m, Bödensee 1989 (5) 2650 m, Göslessee 1989 2600 m, Brunneralm 1996 2400 m, Moosalm 1994 2550 m, Mooserboden 1967 (3) 2300–

2500 m, Clarahütte 1983 2000 m leg. Goller, Fleischbachkar 1989 2250 m leg. coll. Kahlen; St. Johann: Oberleibnig Hochschoberhütte 1986 2400 m, 1991 2500 m; Sillian: Helm (2) 1930 leg. Koneczni, Thurntaler 1983 (2) 2300 m; Thurn: Zettlersfeld 1961 (2), Neualplseen 1988 (3) 2400 m.

◆ *Selatosomus cruciatus* (Linnaeus, 1758)

Amlach: Amlacher Au 20. 6. 1963; Dölsach: Juni 1972 leg. Defregger coll. Kofler 1988; Lavant: Juli 1971 leg. Defregger coll. Kofler 1988; Lienz-Stadt: um 1930 (2) leg. Koneczni, Schloßberg 19. 5. 1938 leg. Koneczni, Iselkai 19. 6. 1961, Ma. Trost 15. 5. 1968.

◆ *Mosotalesus impressus* (Fabricius, 1792)

(= *Selatosomus impressus*)

Amlach: Hirschbrunnhütte 2. 6. 1974 1050 m leg. F. Mair coll. Kofler, Franz-Lerch-Weg 28. 6. 1995 1050 m; Lavant: 7. 7. 1938 leg. Koneczni, Forchach 30. 5. 1979 an Föhre, Wacht 21. 5. 2002; Leisach: Luggauer Brücke 19. 5. 1982, Lienzer Klause 14. 5. 2004; St. Jakob: Trojer Almtal 26. 5. 1985 1400 m; Tristach: Kreithof 6. 5. 1938 leg. Koneczni, 17. 5. 1967.

◆ *Calambus* (= *Corymbites*) *bipustulatus* (Linnaeus, 1767)

Einzelfund: Gaimberg: im Dorf 20. 2. 1961 hinter Birnbaumrinde (*Pyrus communis*) lebend, dort überwintert. – HORION 1953, 287: lebt auch in Obstbäumen, überwintert als imago, aus den Alpenländern nur sehr zerstreut und s. s. in den tiefsten Talregionen.

◆ *Hypoganus* (= *Corymbites*) *inunctus* (Lacordaire, 1835)

(= *cinctus*)

Amlach: Waldweg südlich 24. 4. 1962 in Strunk von Traubenkirsche (*Prunus padus*) zusammen mit *Anaglyptus mysticus* (Cerambycidae); Ainet: 15. 5. 1967; Assling: Mittewald 4. 4. 1976 in Grauerle (*Alnus incana*); Dölsach: 17. 5. 1962 in Weide (*Salix sp.*); Gaimberg: Postleite 2. 3. 1961; Iselsberg 11. 2. 1965 in Schwarz-Holunder (*Sambucus nigra*); Leisach: Kerschbaumer 29. 4. 1978; Nußdorf: Debant 3. 2. 1965 in Schwarzerle (*Alnus nigra*), 5. 2. 1979; Oberlienz: Oberleibnig 10. 11. 1974 unter Birkenrinde (*Betula pendula*).

◆ *Denticollis rubens* Piller & Mitterbacher, 1783

Einzelfund: Tristach: Kreithof 12. 6. 1976 1050 m leg. F. Mair det. coll. Kofler.

◆ *Denticollis linearis* (Linnaeus, 1758)

Recht häufig, 50 Ex.: Amlach 1966; Assling 1960, 1978, 1983; Außervillgraten 1964; Dölsach, 1977, 1983, 1993; Gaimberg 1966; Heinfels 1943; Hopfgarten 1989, 2001; Iselsberg 1969, 1988; Kals 1966, 2006; Lavant 1965, 1978, 1979, 1983, 1987, 1988, 1993; Leisach 1963; Lienz 1938, 1959, 1962; Matrei 1999; Nikolsdorf 1982, 1988, 1992; Nußdorf-Debant 1969; St. Johann 1967; St. Veit 1960, 1968, 1965; Schlaiten 2002; Sillian 1949; Tristach 1966, 2004; Virgen 1991. – Typische Ex. und ab. *variabilis* in folgenden Hölzern: Schwarzerle (*Alnus nigra*), Grauerle (*Alnus incana*), Nußbaum (*Juglans regia*), Schwarz-Holunder (*Sambucus nigra*).

◆ *Cidnopus pilosus* (Leske, 1785) (= *Limonium nigripes*)

Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Ma. Trost 1960 (2), Iselkai 16. 5. 1960; St. Johann: Oblas-Stausee 29. 5. 2004 1100 m; Tristach: Tristacher Au 16. 5. 1964 (6) und 30. 5. 1964.

◆ *Cidnopus* (= *Limonius*) *aeruginosus* (Olivier, 1790)  
(= *cylindricus*)

Abfaltersbach: Drau-Ufer 1948, 1950 leg. Koneczni; Ainet: Weiherburg 1967; Amlach: Au 1959 det. Wörndle, Alter See 1961; Gaimberg: Grafenbach und Postleite 1961; Heinfels: Rabland 1988; Kals: Lesachtal 1966, Wasserweg 2004 (2); Lavant: 1963 (2), Golfplatz 2002, 2005; Leisach: Au 1965; Lienz-Stadt: 1930 (5) leg. Koneczni, Maria Trost 1960, Pfarrsiedlung 1960, Iselkai 1960; Nikoldorf: Nörsach 1961, 1982, 1999, Bahnhof: Drauaue 1992, 1999, 2006 (2); St. Johann: rechte Iselau 1999; St. Veit: Bruggen 1960 leg. Tegischer; Sillian 19. 4. 1949, 1950 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach-Stausee 1998, 2006; Tristach: Tristacher Au 1964, Jungbrunn 1960

◆ *Cidnopus quercus* (Olivier, 1790)

GREDLER 1863, 229: bei Lienz, selten (Ros.). – Dölsach: Kapaun 8. 6. 1974, 2. 6. 1978, 4. 6. 1988 mehrfach leg. F. Mair und Kofler; Lavant 27. 6. 1965; Nikoldorf: Flugplatz 31. 5. 1967. – Kärnten: Kötschach-Mauthen: Untere Valentinalm 15. 7. 1968.

◆ *Kibunea minutus* (Linnaeus, 1758) (= *Cidnopus minutus*)

Abfaltersbach: Drauufer 1950 leg. Koneczni; Ainet: Ort und Unter-Alkus 1987 (2); Amlach 1938 leg. Koneczni, Ulrichsbichl 1965; Anras: Asch 1982, 1987 (2); Assling: Mittewald 1930 leg. Koneczni; Gaimberg: Postleite 1960; Heinfels: Hinterheinfels 1943 leg. coll. F. Kofler; Hopfgarten: Dölsach 1988; Kartitsch: Tannwiese 1998 1530 m; Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Maria Trost 1960, 2006; Nikoldorf: Lengberg 1986; St. Johann: Oblas 1978; Sillian 1950 (3) leg. Koneczni; Tristach: Kreithof 1964, 1999; Virgen: Niedermauern 1960, Obermauern 1987.

◆ *Limonius aeneoniger* (Degeer, 1774)

GREDLER 1863, 228: bei Lienz (Ros.). – Häufige Art 50 Ex. – Ainet, Anras, Assling, Außervillgraten, Gaimberg, Iselsberg, Kals, Kartitsch, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei, Nikoldorf, St. Jakob, St. Johann, St. Veit, Sillian, Virgen, Tristach, Virgen. – Vor allem in den Tallagen bis: Außervillgraten: Winkeltal 1999 1500 m; Assling: Bannberg Hochstein 1986 2000 m; Iselsberg: Debanttal 1967 (3) 2200 m am Weg zur Seescharte, Geiersbichl 2003 1850 m; Kartitsch: Tannwiese 2003 1530 m; Matrei: Tauertal Innergschloß 1960 1700 m; St. Jakob: Obersee 1988 2000 m; St. Johann: Oblas-Stausee 2004 1100 m.

◆ *Diacanthus undulatus* (Degeer, 1774) (= *Harminius undulatus*)

HOLZSCHUH 1971, 18: Kals: Lesach 25. 7. 1962 auf Fichtenklatfer leg. det. coll. Holzschuh. – Nikoldorf: Lengberg 6. 5.–14. 5. 2002 e. p. in Fichte; Matrei: 1937 leg. Koneczni; Matrei: Huben 13. 7. 1951 leg. Ratter coll. Kofler. – nach WÖRNDLE 1950, 219: wahrscheinlich im ganzen Gebiet in Bergwäldern, nur selten.

◆ *Stenagostus rhombeus* (Olivier, 1790) (= *villosus*)

Dölsach: Görtshacherberg August 2008 (4) Lichtfalle leg. Deutsch; Lavant: rechtes Drauufer Auwald 13. 4. 1983 e. p. (10 Tage) aus liegendem Stamm von Grauerle (*Alnus incana*); Nikoldorf: Lengberg 7. 7. 1996 unter Baumrinde, 6. 7. 2000 in Lichtfalle leg. H. Deutsch coll. Kofler; Nußdorf: 18. 6.–30. 6. 1970 e. p. in Eiche (*Quercus robur*).

◆ *Hemicrepidius* (= *Pseudathous*) *niger* (Linnaeus, 1758)

FRANZ 1943, 328: Kals am Weg ins Dorfertal 18. 7. 1937 (3). – Assling: Bannberg 1999 (2), Thal 2002; Gaimberg: Postleite 2008; Innervillgraten: Kalkstein 1986 1640 m; Iselsberg: Mühlbach und Stronach 2006; Lavant 1982; Lienz-Stadt:

Patriasdorf 1959 (3) leg. Holzschuh, Draufner 1963, Taxerhof 1965, Ma. Trost 1992, Riedlhof 2008; Matrei: Proseggklamm 1962, Waier 2001 Hausgarten an Pfingstrose (*Paeonia officinalis*); Nikolsdorf: Bahnhof Drauaun 1982; Prägraten: Umbaltal Clarahütte 1982 2000 m leg. Goller; Tristach: Tristacher See 1959 det. Wörndle, Ortsgebiet 1992 Pheromonfalle im Föhrenwald.

◆ *Hemicrepidius hirtus* (Herbst, 1784)

FRANZ 1943, 328: Kals: am Weg ins Dorfertal 18. 7. 1937 (2). – Häufig, über 40 Ex. – Amlach 1963, 1965, 1986; Assling 1938, 1988–1989 leg. H. Mair, 2000, 2006; Gaimberg 1960, 1980; Heinfels 1943, 1959, Panzendorf 1986–1988 (3) leg. H. Mair; Hopfgarten 1967; Kals 1930, 1982; Kartitsch 1948; Lavant 1938; Lienz 1937, 1959, 1960, 2008; Matrei 1930; Nikolsdorf 1989 (2) leg. H. Mair; Prägraten 1930, 2002; Schlaiten 1938; Sillian um 1930 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach 2006; Tristach 1960; Virgen 1960, 1978, 1989. – Bis in mittlere Höhenlagen: z. B. Kalsertal um 1600 m; Kals: Lesach Rubisoi 1650 m; Kartitsch: St. Oswald 1360 m; Prägraten: Pebellalm 1600 m.

◆ *Crepidophorus* (= *Athous*) *mutilatus* (Rosenhauer, 1847)

Selten: Gaimberg: Postleite Untergaimberg beim Leitnerbauern 21. 9. 1966 (nur 1 Abdomen vid. Cate 1989) in hohlem Eschenbaum (*Fraxinus excelsior*) im Mulm zusammen mit *Ischnodes sanguinicollis*, hier auch 20. 9. 1966 bis 22. 6. 1967 e. l. 1 imago vid. Lohse 1975.

◆ *Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801)

FRANZ 1943, 328: am Weg von Kals ins Dorfertal 18. 7. 1937. – WERNER 1934, 373: Matrei Proseggklamm 6. 8. 1927. – Häufige Art. – Etwa 60 Ex. – Ainet, Amlach, Assling, Dölsach, Gaimberg, Heinfels, Nikolsdorf, Kals, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei, St. Jakob, St. Johann, Sillian, Tristach, Virgen. – Fast nur in Tallagen bis mittlere Höhen um 1500 m, selten höher: St. Jakob: Oberhauser Zirbenwald Juli 1989 in Formolfalle 1850 m leg. Kahlen.

◆ *Athous vittatus* (Fabricius, 1792)

Häufige Art der Tallagen. – Ainet 1966, 1968, 1990; Amlach 1938, 1959, 1963, 1995; Anras 1987; Assling 1963, 1982, 1988; Dölsach 1980; Gaimberg 1960; Heinfels 1943, 1995; Iselsberg 2004; Lavant 1938, 1968, 1996; Leisach 1990; Lienz-Stadtgebiet: 1937, 1960, 1978, 1992, 1996; Nikolsdorf 1979, 1980, 2004; Nußdorf 2006; St. Johann 2003; Schlaiten 1982; Sillian 1930; Tristach 1937, 1959, 1960, 1964, 2004. – Höhere Angaben nur wenig: Amlach: Franz-Lerch-Weg in den Lienzer Dolomiten 1995 1050 m; Assling: Kristeiner Möser 1988 1550 m; Heinfels: Tessenberger Alm 1995 1950 m; Schlaiten: oberhalb Göriach 1982 1580 m.

◆ *Athous subfuscus* (Müller, 1767)

Ebenfalls häufig in Tallagen, nur vereinzelt höher: Amlach: Kerschbauer Alm 2000 m; Heinfels: Fronstadelalm 2000 m; Iselsberg: Zwischenbergen 1400 m; Kartitsch: Tannwiese 1500 m; Matrei: Zedlacher Paradies 1450 m. – Amlach 1959, 1962, 1963, 1978, 1993; Anras 1987; Heinfels 1943, 1972; Hopfgarten 2001; Iselsberg 1988; Kals 1983, 2002; Kartitsch: 1965, 1978, 2003; Lavant 1963, 1996; Leisach 1970; Lienz-Stadt: 1930, 1938 leg. Koneczni, 1960; Matrei 1986; Oberlienz 1995; St. Johann 1983; St. Veit 1960, 1992; Sillian 1949, 1950; Tristach 1960, 1964, 1983, 1999.

◆ *Athous zebei* Bach, 1854

Amlach: Goggssteig 1963, Ulrichbichl 1972; Kartitsch: Tannwiese 1965, 1978, 1988 1530 m; Leisach: Burgfrieden 1988 in Föhrenwald – Pheromonfalle; Lienz-

Stadt: Schloßberg 1938 leg. Koneczni, Patriasdorf 1959 leg. Holzschuh; Matrei: Gruben 1978; Nikolsdorf: Rabantalm 1961; St. Veit: Bruggen 1960 leg. Tegischer; Sillian 1950 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach Gailufer 2008; Tristach 1930 leg. Koneczni, Kreithof 1999 1050 m.

◆ *Hypnoidus riparius* (Fabricius, 1792)

GREDLER 1863, 231: Jagdhausalpe (Stentz), Lienz (Ros.). – FRANZ 1943, 327: DorferTal am Kalserbach unterer und oberster Teil 18. 7. 1937 (3). – Anras: Mittewald Draufufer 1965 (4); Assling: Gamperalm 1982 ca. 100 m; Außervillgraten: Volkzeinalm 1986, 2005 1900 m; Dölsach: Debanttal am Weg zur Seescharte 1967 (4) 2200 m, Seescharte 1982 (2) 2500 m, Franz-Keil-Weg 1988 (3) 2200 m; Innervillgraten: Oberstalleralm 1962 1800 m; Kals: Dorfertal Böheimebene 1988 1760 m, Lucknerhaus 1994 2000 m; Kartitsch: Tannwiese 1965 1530 m, Erschbaumental: Tscharre 1982 2000 m; Matrei: Tauernhaus 1500 m 1964, 1969, 1978, 1980 (13), Innerschlöß 1978, Gruben 1982 (2) 1150 m, Weg zur Alten Pragerhütte 1986 2100 m, Tauerntal: Schildalm 1993; Obertilliach: Porzescharte 1978 (2) 2200 m; Prägraten: Pebellalm 1967 1600 m, Clarahütte 1978 (5) 2100 m; Schlaiten: Huberalp 1982 1700 m; St. Jakob: Staller Alm 1963 1950 m rev. Lohse 1975; Patscheralm 1965 (6) 1600 m; Trojer Almtal 1985 1400 m, Seebachalm 1982 (4) 1850 m, Obersee 1988 (5) 2000 m, Schwarzachtal Talgrund 1989 (5) 2050–2100 m leg. Kahlen; Virgen: Wetterkreuz-Hütte 1978 (2) 2000 m – Einzelne Belege der coll. Koneczni mußten wegen Verschimmelung ausgetauscht werden: Hopfgarten, Kals: Dorfer Alpe und Dorfer See, Obertilliach, Prägraten: Johannestal, Sillian: Helm, Strassen: Tassenbach. – Montane bis hochalpine Zonen, oftmals mehrfach besonders an sandigen Bachufern unter Steinen.

◆ *Hypnoidus rivularius* (Gyllenhal, 1808)

GREDLER 1863, 231: Lienz (Ros.), auch nominell nicht übernehmbar. – Nikolsdorf: Draufufer 24. 5. 1983; Thurn: Neualpseen 28. 6. 1959 (5) leg. Ritter det. Würndle, vid. Lohse 1975. – Mehrfache Ex. dieser Art leg. det. Koneczni wurden bei Revisionen umgestellt zu anderen Arten.

◆ *Hypnoidus consobrinus* (Mulsant & Guillebeau, 1855)

Lienz-Stadt: Schloßbrücke Iselgenist 29. 5. 1963; Prägraten: Ströden 12. 6. 1965 1400 m; St. Jakob: 3. 6. 1965 und Patscher Alm Juni 1965 1600 m: alle rev. Lohse 1965. – Strassen: Tassenbach Gailufer 28. 5. 1978; Matrei: Brühl 16. 4. 1976 (2).

◆ *Oedostethus* (= *Hypnoidus*) *tenuicornis* (Germar, 1824)

Lavant: Auwald im Bereich der Grundwasserbäche („Lauen“) 30. 7. 1971 gestreift vid. Lohse 1975, 27. 6. 1979 in coll. Cate, hier auch 1. 7. 1989; Lengberg: Nörsach 23. 8. 1984, beim Nörsacher Teich vid. Cate 1989.

◆ *Fleutiauxellus* (= *Hypnoidus*) *maritimus* (Curtis, 1840)

FRANZ 1943, 327: im unteren Teil des Dorfer Tales, am sandigen Ufer des Kalser Baches 2 Ex. 18. 7. 1937. – Kals: Lucknerhaus am Bach 21. 7. 1966 1980 m, NPHT-TAV07: Kalser Tauernhaus 1754 m; Lienz-Stadt: Schloßbrücke 14. 5. 1960 (2) in Iselgenist, verfrachtet; Matrei: Froßnitztal 13. 8. 1970 leg. Scheidl, 1 Ex. in coll. Kofler, Innerschlöß: Gletscherweg 29. 7. 1986 2200 m; Prägraten: Johannestal 5. 8. 1938 leg. Koneczni; St. Jakob: Patschertal 20. 7. 1963 1900 m und 13. 9. 1989 mehrfach linker Talhang 2050 m leg. Kahlen, Schwarzachtal Talgrund 13. 8. 1989 2050 m leg. Kahlen, Patscher Alm 15. 7. 1965 1600 m; Strassen: Tassenbach 16. 8. 1948 leg. coll. F. Kofler;

◆ *Zorochros minimus* (Lacordaire, 1835)

(= *Hypnoidus dermestoides*)

GREDLER 1863, 232: bei Lienz und Mittewald (Ros). – Assling: Mittewald 1987; Dölsach: Aguntum 1965 mehrfach, Gödnach 1989; Gaimberg: Grafendorf 1930 leg. Konecni; Leisach: Leisacher Au 1961, 1965 (4); Lavant 1964, 1987 mehrfach am Ufer des Frauenbaches; Lienz: Schloßbrücke 1960, 1962, 1963 (6) Genist am Iselufer, am Bahnhof 1963 Draugenist; Matrei: Huben 1983 (2) am Schwarzachufer 1982; Nikolsdorf: 1983 (2) Draufer, Lengberg 1983; St. Johann: Lorenzenhof 1982; Thurn: Zettlersfeld 1988 2200 m. – Die verschiedenen Farbaberrationen sind oft vertreten und werden nicht separat zitiert.

◆ *Zorochros flavipes* (Aube, 1850)

Heinfels: Panzendorf 26. 5. 1949 im Genist vom Villgraterbach leg. Konecni; Innervillgraten: Kalkstein 21. 8. 1983 (2) in kleinem Bachbett auf der Sonnseite unter Steinen 1700 m; Strassen: Tassenbach 15. 5. 1965 (2) am Gailufer.

◆ *Zorochros meridionalis* (Laporte de Castelneau, 1840)

GREDLER 1863, 233: Lienz (Ros.). – FRANZ 1943, 317: auch bei Lienz (coll. Mus. Wien). – Anras: Mittewald Draufer 1950 (2) leg. Konecni; Assling: Thal 1948 Drau-Hochwasser-Genist; Dölsach: Agunt 1965 am Debantbach-Ufer; Heinfels: Panzendorf 1951 Villgraterbach-Genist leg. Konecni; Lavant: Forchach 1978 (3) und 1987; Lienz-Stadt: Schloßbrücke 1960 (2), 1962, 1963 (5) Isel-Genist; Nikolsdorf: Lengberg 1983 (9) am Zappernitzbach, Schloß Lengberg 1987 (4); Matrei: Huben 1986 (2); Nußdorf-Debant: 1986, 1987 Sandgrube beim Umspannwerk; Oberlienz: Lesendorf 1965 (7) Iselufer; Virgen: Niedermauern (7) Bachufer.

◆ *Quasimus minutissimus* (Germar, 1817)

Ainet: 1989; Amlach: Amlacher Au 1960, Goggsteig 1963 (2), 1966 (2), Franz-Lerch-Weg 1995 1050 m; Kals: Unterpeischlach 1987 (4); Leisach: 1963, 1987, 1988 Burgfrieden 1989; Lienz-Stadt: Griebelhof 1960, Brauerei 1963; Nikolsdorf: Nörsach 1964, 1970, 1988 Plone, 1989; St. Johann 1983 (2), 1995; Tristach: Tristacher Au 1964; Virgen: Niedermauern 1960, Obermauern 1978 (2) 1400 m, Marin 1996 (2).

◆ *Cardiophorus nigerrimus* Erichson, 1840

Dölsach: Mai 1975 leg. Defregger coll. Kofler; Iselsberg: 22. 6. 1969; Kals: Oberpeischlach 19. 6. 1965; Prägraten: Ströden 1965 1400 m; Lienz-Stadt: 1930 Draufer leg. Konecni, Ma. Trost 6. 6. 1962 (2), 30. 5. 1967, 3. 6. 1969.

◆ *Cardiophorus discicollis* (Herbst, 1806)

Matrei: Granatspitz-Gruppe Glanzer Berg 28. 7. 1991 mehrfach, 20. 7. 1991 (2), 18. 7. 1991 (2) 1600 m Holzklafter Umbelliferen, leg. Egger, Kahlen 27. 3. 1996 in litt.

◆ *Cardiophorus ruficollis* (Linnaeus, 1758)

GREDLER 1863, 234: Lienz (Ros.). – Amlach: Au 1. 5. 1961 (2) in Nest von *Formica sanguinea*; Ainet: beim Sägewerk 26. 6. 1980 in Pheromonfalle; Kals: Knopfbrücke 22. 6. 2008 1240 m; Kartitsch: Tannwiese 21. 6. 1965 1530 m; Leisach: Burgfrieden 13. 6. 1988 (3) in Pheromonfalle; Lienz-Stadt: 1930 leg. Konecni, Ma. Trost 12. 5. 1960; Matrei: Huben 24. 4. 1984; Nikolsdorf: 10. 7. 1963 leg. Hassenteufel coll. Kofler; Nußdorf: 6. 6. 1937 leg. Hassenteufel coll. Kofler; St. Johann 17. 4. 1966 (2) in Fichtenmulm.

◆ *Cardiophorus atramentarius* Erichson, 1840

Ainet: 1967–1969 (10) beim Sägewerk am Sand laufend, 1970 (3); Assling: Mittewald 1965 (2), Bannberg 2006 1250 m; Dölsach. Juni 1976 leg. Defregger coll. Kofler, Kapaun 1962 (2); Heinfels: Hinterheinfels 1953 1200 m det. Wörndle; Kals: Staniska 1964 (2); Kartitsch: Tannwiese 1965 1530 m; Lienz-Stadt: 1937 leg. Hassenteufel coll. Kofler, 1938 leg. Koneczni, Ma. Trost 1960 (5) und 1965, Griebelehof 1960, Taxerbauer 1965; Nikolsdorf: 1935 leg. Hassenteufel coll. Kofler, Flugplatz 1967, Lengberg 2002; Nußdorf-Debant: 1963; St. Johann: Oblas-Stausee 1970, 1993 (2); Schlaiten 1938 leg. Koneczni; Virgen: Obermauern 1967 1400 m.

◆ *Cardiophorus ebeninus* (Germar, 1824)

GREDLER 1875, 4. Nachlese: „In Auen bei Lienz nicht selten, Hochsommer (Gdlr.“. – Ainet: 2. 7. 1982 alte Schottergrube zusammen mit *Paracardiophorus musculus*, vid. Pace 1989; ABling: Bichl 27. 7. 1997 1450 m; Kals: Unterpeischlach 19. 5. 2004 (2), 27. 5. 2004 (3); Nikolsdorf: 18. 6. 1935 leg. Hassenteufel coll. Kofler vid. Cate 1989, Nörsach 30. 5. 1992, Lengberg 4. 8. 1996.

◆ *Paracardiophorus musculus* (Erichson, 1840)

Ainet: 1967–1970 und 1982 (gesamt 13) in alter Schottergrube am Sand kriechend; Assling: Thal 1937 Drauufer leg. Koneczni; Dölsach: Gödnach 1966 unter Steinen am Bachufer; Lienz-Stadt: Schloßbrücke 1962 (3) in Iselgenist; Oberlienz: Lesendorf 1965 am Iselufer; Schlaiten: 2002 Iselufer.

**Eucnemidae**◆ *Melasis buprestoides* (Linnaeus, 1761)

GREDLER 1863, 215: Lienz (Gdl.). – Dölsach: Kapaun, von März bis September 1964 (17) aus Haselholz (*Corylus avellana*); Gaimberg 9. 11. 1974; Nikolsdorf: Flugplatz 13. 4. 1967 und 4. 5. 1967 (16) in stehenden abgestorbenen harten Haselhölzern, 12. 4.–11. 5. 1967 (7) e. l. Flugplatz ex *Corylus avellana*, Lengberg 9. 5. 1970 (5) und 23. 4. 1978 (1), Nörsach 27. 3. 1978 (3), 27. 3.–1. 5. 1978 e. p. in Weide (*Salix* sp.); Nußdorf: Debant 3. 2. 1965 (10) in Schwarz-Erle (*Alnus nigra*) davon 2 Ex. in coll. Peez; Oberlienz: Glanzer Au 28. 3. 1967 (6) und 26. 8. 1967 in Grauerle (*Alnus incana*), ebendort am 29. 8. 1967 (35) überwinterte Tiere ca. 1–2 m über dem Boden eines 10 cm dicken halbfaulen z. T. noch sehr harten Erlen-Stammes, im Holz waren die imagines mehr/weniger radial nach außen angeordnet, meist nur 0,5 bis 2 cm unterhalb der Borke; von 35 Ex. 16 Männchen und 19 Weibchen.

◆ *Eucnemis capucina* Ahrens, 1812

HOLZSCHUH 1971:19: Lienz-Stadt: Patriasdorf 8. 6. 1960 1 Ex. an Telegrafemast leg. Holzschuh. – Gaimberg: Postleite beim Leitnerbauern 13. 3. – 17. 4. 1977 ca. 50 Ex. e. l. in trockenem Eschenholz (*Fraxinus excelsior*) zusammen mit *Dorcatoma serra* (Anobiidae); Nußdorf: 20. 9. 1966 Torso in hohler Esche; Gaimberg 25. 9. 1979 (2) in fauler Grauerle (*Alnus incana*); Nikolsdorf: Lengberg 2. 6. 1998 an Rundholz.

◆ *Rhacopus* (= *Dirhagus*) *sahlbergi* (Mannerheim, 1823)

KOFLER 1963, 34: Lavant bei Lienz 7. 7. 1938 1 Weibchen leg. Koneczni vid. Lucht 1979. – vgl. dazu OLEXA 1975.

◆ *Dirhagus emyi* (Rouget, 1855)

Lavant: Forchach am Frauenbach 22./23. 6. 1978 (15) gestreift und von Weide geklopft, det. Lucht, 2 Ex. in coll. Holzschuh, ein Einzelstück am 23. 7. 1984; Nikolsdorf: Lengberg 5. 7. 1986 von Weiden am Zappernitzbach zusammen mit *Dirhagus pygmaeus*. – Kärnten: Grafenstein 28. 6. 1960 leg. Holzschuh coll. Kofler, det. Lucht.

◆ *Dirhagus pygmaeus* (Fabricius, 1792)

Anras: Mittewald 15. 7. 1936 coll. Hassenteufel, det. Kofler 1965; Dölsach: Ober-Göriach 27. 9. 1998 mit Pilz Buckeltramete (*Trametes gibbosa*, det. Forstinger) an Roßkastanie (*Aesculus hippocastani*); Nikolsdorf 10. 7. 1935 coll. Hassenteufel in litt., Lengberg 5. 7. 1986 (2) von Weiden am Zappernitzbach geklopft; St. Johann: rechtes Iselufer 20. 7. 2004, Niedristteich 26. 6. 2006 1050 m; Strassen: Tassenbach 20. 7. 1978 Gailbach-Au det. Lucht; Virgen: Heckenfluren Nr. : V-5-91 17. 3. 1991 mit Striegeliger Tramete (*Trametes hirsuta*) und Schmetterlingstramete (*Trametes versicolor*) an Esche (*Fraxinus excelsior*).

◆ *Dirhagus lepidus* (Rosenhauer, 1847)

Ainet: 12. 3. 1989; Lavant 13. 4.–2. 5. 1983 e. l. in Grauerle (*Alnus incana*); Matrei: Huben Auwald am linken Iselufer 5. 7. 2008 gekäschert.

◆ *Hylis* (= *Hypocoelus*) *olexai* Palm, 1955

(= *procerulus* Olexa 1954, auct. partim, nec Mannerheim: LUCHT 1976, 142), dort für Ö angegeben: Nd, Ti, Kä, St, auch ST usw. – Ainet: 1. 8. 1988 in Pheromonfalle im Auwald; Nikolsdorf: Lengberg 26. 7. 2000 Holzlager am Gantschenbach.

◆ *Hylis* (= *Hypocoelus*) *foveicollis* (Thomson, 1874)

GREDLER 1863, 216: Lienz, an einer alten, dicken, rindelosen Weide, in alten Bohrlöchern ein- und ausgehend, häufig (Ros.). – KOFLER 1963, 35: Lavant 14. 7. 1938 leg. Koneczni, rev. Lucht 1975. – LUCHT 1976, 149: OTi. 1 M Lavant 14. 7. 38 Kofler leg. (coll. Kofler), dazu auch Sbg, Nd, Ti, Kä, St. – Nikolsdorf: Lengberg 23. 4. 1978 totes Ex. in faulem Fichtenstrunk, rev. Lucht ex. *H. cariniceps*.

**Lissomidae (ex Eucnemidae)**◆ *Drapetes cinctus* (Panzer, 1796) (= *Drapetes biguttatus*)

Lienz-Stadt: Adolf-Purtscherstraße 25. 6. 1972 im Hausgarten an Holzhütte anfliegend, leg. Ernstbrunner, coll. Kofler.

**Throscidae**◆ *Trixagus* (= *Throscus*) *dermestoides* (Linnaeus, 1767)

Amlach: Auwald 1960 (2); Assling: Bannberg 1937 coll. Hassenteufel, Thal 1948 Drau-Hochwasser leg. Koneczni; Dölsach: Gödnach 1962, Kapaun 1977 (5), 1978, 1979, 1982 (4); Gaimberg 1960 (2), Grafenbachl 1960; Lavant: 1978 (2), Forchach 1987 Bodenfalle, Forst-Lehrweg 2006; Leisach: Rötenbach 1962 (3) aus Weiden-Fallaub gesiebt; Lienz-Stadt: Grafenanger 1959, Iselkai 1962 Iselgenist; Matrei: Huben 1937 leg. coll. Hassenteufel, Kienburg 1975, 1982 (2); Nikolsdorf: Lengberg 1970 (3), Nörsach 1979 in Methanalfalle, 1994 Auwald, 1991 (4) in Nörsach: Teichgenist; Nußdorf 1937 leg. coll. Hassenteufel in litt. 1965; Sillian 1948 leg. Koneczni; Tristach: Tristacher Au 1984 (2) in Methanal-Bodenfalle.

◆ *Trixagus* (= *Throscus*) *carinifrons* Bonvouloir, 1859

Ainet: 9. 7.–30. 7. 1990 (2) in Pheromon-Falle beim Sägewerk; Dölsach: Kapaun 4. 6. 1977 gestreift zusammen mit *Trixagus dermestoides*; Nußdorf 30. 8. 1971.

◆ *Aulonothroscus* (= *Throscus*) *brevicollis* Bonvouloir, 1859

Ainet: 14. 5. 1966 (2); Lavant: 18. 5. 1978 (2); Lienz-Stadt: Ma. Trost 12. 4. 1987 gesiebt aus Eichenlaub, vid. Wurst 1995.

**LITERATUR:**

- BEZIRKSKUNDE OSTTIROL. – Katholischer Tiroler Lehrerverein (Hrsg.) (2001) 415 S. – Schriftleitung: Bezirksschulrat Lienz: H. Hafele, D. Holaus. – Ed. Löwenzahn im Studienverlag Innsbruck.
- FRANZ, H. (1936): Die hochalpine Koleopterenfauna der Karnischen und Venezianer Alpen. – Koleopterol. Rundschau 22: 230–251.
- FRANZ, H. (1943): Die Landtierwelt der Mittleren Hohen Tauern. – Denkschriften Akad. d. Wissenschaften Wien, mathem.-naturwiss. Klasse Bd. 107, 552 S.
- GEISER, E. (2001): Die Käfer des Landes Salzburg. Faunistische Bestandserfassung und tiergeographische Interpretation. – Monographs on Coleoptera (Wien) Vol. 2, 706 S.
- GREDLER, V. M. (1863): Die Käfer von Tirol, Teil I., 234 pp. – Ferrari-Eberle Verlag, Bozen.
- GREDLER, V. M. (1878): 5. Nachlese zu den Käfern von Tirol. – Zeitschr. Ferdinandum Innsbruck 3. Folge, Heft 22: 1–23.
- GROS, P., W. DÄMON & Chr. MEDICUS (2007): Nationalpark Hohe Tauern, Tag der Artenvielfalt 2007 (Kaiser Dorfertal). – Bericht über die Ergebnisse und Diskussion der erhobenen Daten auf der Basis der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern. 124 S. Salzburg.
- HELLRIGL, K. (1996): Die Tierwelt Südtirols. – Veröff. Naturmuseum Südtirol Bd. 1, 831 S.
- HOLDHAUS, K. (1912): Kritisches Verzeichnis der borealpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. – Annalen k. k. Naturhistor. Hofmuseum XXVI: 399–440.
- HOLDHAUS, K. & C. H. LINDROTH (1939): Die europäischen Koleopteren mit borealpinen Verbreitung. – Annalen naturhist. Museum Wien 50: 123–292, Taf. VI–XVIII, Abb. 1–26.
- HÖLZEL, E. : (1961): VI. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – Carinthia II 151./71.: 133–169.
- HOLZSCHUH, C. (1971): Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich. – Mitteilungen d. Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien 94: 165
- HORION, A. (1953): Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer Bd. III. :Sternoxia (Elateridae bis Throscidae), pp. 175–340. – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, München.
- KOFLER, A. (1962/1963): Interessante Käferneufunde aus Osttirol. – Koleopterologische Rundschau 40/41: 23–64.
- KOFLER, A. (1994): Neue Funde von *Malthodes vincens* Gredler 1870 und *Lacon lepidopterus* (Panzer 1801) in Kärnten und Osttirol (Coleoptera: Cantharidae bzw. Elateridae). – Carinthia II 184/104: 307–410.
- KOFLER, A. (2009): Zur Kenntnis der Käferfauna Osttirols: Teil IV: Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae). – Entomologica Austriaca 16: 27–51.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachrichten und Berichte, Beiheft 4, 185 S., Dresden.
- LOHSE, G. A. & W. H. LUCHT (1992): Die Käfer Mitteleuropas, 2. Supplementband mit Katalogteil, 375 S. – Goecke & Evers, Krefeld.
- LUCHT, W. (1976): Revision der mitteleuropäischen *Hypocoelus*-Funde (Col., Eucnemidae). – Entomol. Blätter 72(3): 129–165.
- LUCHT, W. H. (1987): Die Käfer Mitteleuropas, Katalog, 342 S. – Verl Goecke & Evers, Krefeld.

**Dank:**

Für vielfache und wertvolle Mitarbeit und Hilfen habe ich zu danken:  
 Determinationen und Revisionen: Dr. P. Cate, Wien (Elateridae), C. Wurst, Heilbronn (Elateridae), H. Forstinger, Ried i. I. (xylobionte Pilze), mehrere zitierte Bearbeiter aus früheren Jahren kann mein Dank nicht mehr erreichen. Besonderen Dank für wichtige und auch vielfache Mitteilung von Funden aus Osttirol und ganze oder teilweise Überlassung von Belegen für die Sammlung: Ing. J. Defregger, Lienz; H. Deutsch, Lavant; U. Eitschberger, Marktleuthen; C. Holzschuh, Villach; M. Kahlen, Hall i. T.; H. Mair, Heinfels; Dipl.-Ing. F. Mair, Dölsach; Univ.-Prof. Dr. W. Schedl, Innsbruck. Nicht zu vergessen mehrere Freunde, Bekannte und Schüler für die Überbringung von verschiedenen Insekten. – Aufrichtigen Dank an die Redaktion der Zeitschrift wegen der Korrekturen und der Formatierung, nicht zuletzt an die Familie für die andauernde Mithilfe bei allen Arbeiten und durch viele Jahrzehnte.

- OLEXA, A. (1975): Reklassifikation der Gattung *Dirhagus* und verwandter Gattungen (Coleoptera-Eucnemidae). – Entomolog. Blätter 71(3): 155–164.
- PEEZ, AL. & M. KAHLER (1977): Die Käfer von Südtirol. 525 S. – Verl. Tiroler Landesmuseum „Ferdinandeum“ Innsbruck.
- WERNER, F. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt Ost-Tirols. – Veröffentlichungen Ferdinandeum Innsbruck Heft XI: 1–12.
- WÖRNDLE, A. (1950): Die Käfer von Nordtirol. – Schlern-Schriften 64, 388 pp. – Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.
- WURST, CI. & A. KAUPP (1995): *Ampedus auripes* (Reitter) – ein verkannter mitteleuropäischer Schnellkäfer. Angaben zur Morphologie und geographischen Verbreitung (Coleoptera: Elateridae). – Mitt. internat. entomol. Ver. 20 (3/4): 79–86.
- ZEISING, M. & J. SIEG (1983): Anmerkungen zur *Ampedus pomorum*-Gruppe (Coleoptera: Elateridae) nebst Beschreibung einer neuen Art (*Ampedus zieglerei* sp. n.) aus der *sanguinolentus*-Gruppe. – Entomologische Blätter 79 (1): 3–29.

**Anschrift des  
Verfassers:**

Mag.  
Dr. Alois Kofler,  
Meranerstraße 3,  
A-9900 Lienz/  
Osttirol.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [199\\_119](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Käferfauna Osttirols \(Österreich\): Teil V \(Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae\). 505-524](#)