Die hydrologische Bilanz 2014 in Kärnten

Von Johannes MOSER, Elisabeth GUTSCHI & Christian KOPEINIG

Das Jahr 2014 war durchwegs von überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen, hohen Abflüssen und ebenfalls hohen Grundwasserständen geprägt.

Vor allem im Klagenfurter Becken war der Winter außerordentlich nass, sodass hohe Grundwasserstände zahlreiche Kellerflutungen verursachten. Der Westen des Landes versank im Schnee. Mächtige Schneehöhen über ein bis zwei Meter im Gail- und oberen Drautal sorgten für zahlreiche Straßensperren und Katastropheneinsätze. Auch der Sommer und Herbst war durchwegs verregnet, sodass das Jahr mit einem Überschuss an Niederschlägen (+38,1 %) und Abflüssen (+64,6 %) bilanziert werden kann. Die Gebietsverdunstung lag 2014 mit +13,1 % über dem langjährigen Durchschnitt.

Es gab an der Lavant ein 15-jährliches Hochwasser. An der Glanfurt, der mittleren Gail und der Drau in Lavamünd konnte ein zehn- bis zwölf-jährliches Hochwasserereignis beobachtet werden.

Abb. 1:
Wasserkreislaufbilanz 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Wasserbilanz Kärnten 2014 – im Vergleich zum Durchschnitt 1981–2010

Wasserhaushalt Kärnten

Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% -Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2014 und der Periode 1981-2010

Zu- und Abflüsse (m³/s):	2014	1981-2010
Ktn Zuflüsse MQ:	102,09	72,62
Ktn Abflüsse MQ:	392,8	249,2
Ktn Gebietsabfluss MQ:	290,7	176,6

Grenze Slo/Drau:	2014	1981-2010
NQt (m³/s):		51
HQ (m³/s):	1640	1672
HQ ₁₀₀ = 2800 m³/s		

Ktn-Zuflüsse: Drau (Osttirol), Gail, Gailitz, Olsa, Görtschitz, Lavant **Ktn-Abflüsse:** Drau, Möll KW Kaprun

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 2: Wasserbilanz und Kennzahlen Kärnten 2014 im Vergleich zu 1981-2010.

Wasserhaushalt Drau bis Sachsenburg (ohne Osttirol)
Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% -Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2014 und der Periode 1981 - 2010

Zu- und Abflüsse (m³/s):	2014	1981-2010
Ob. Drau Zuflüsse MQ:	76,90	58,40
Ob. Drau Abflüsse MQ:	96,5	69,7
O.Drau Gebietsabfluss MQ:	19,6	11,3

Sachsenburg/Drau:	2014	1981-2010
NQt (m³/s):	39	14,15
HQ (m³/s):	360	565
HQ ₁₀₀ = 1050 m³/s		

Obere Drau-Zuflüsse: Drau (Osttirol) **Obere Drau-Abflüsse:** Drau/Sachsenburg

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 3: Wasserbilanz und Kennzahlen: Oberes Drautal 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Wasserhaushalt Drau mit Möll und Lieser (ohne Osttirol)

Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% - Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2014 und der Periode 1981 - 2010

Zu- und Abflüsse (m³/s):	2014	1981-2010
Drau Spittal Zuflüsse MQ:	76,90	58,40
Drau Spittal Abflüsse MQ:	177,0	128,7
Drau Gebietsabfluss MQ:	100,1	70,3

Amlach/Drau:	2014	1981-2010
NQt (m³/s):	60	25,44
HQ (m³/s):	665	985
HQ ₁₀₀ = 1650 m³/s		

Drau-Zuflüsse: Drau (Osttirol) **Drau-Abflüsse:** Drau Amlach, Möll KW Kaprun

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 4: Wasserbilanz und Kennzahlen: Oberkärnten mit Möll und Lieser 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Wasserhaushalt Gail

Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% - Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2014 und der Periode 1981 - 2010

Zu- und Abflüsse (m ³ /s):	2014	1981-2010
Gail Zuflüsse MQ:	20,63	11,29
Gail Abflüsse MQ:	72,6	40,4
Gail Gebietsabfluss MQ:	52,0	29,1

Federaun/Gail:	2014	1981-2010
NQt (m ³ /s):	21	9,97
HQ (m ³ /s):	505	744

HQ₁₀₀ = 900 m³/s

Gail-Zuflüsse: Gail, Gailitz Gail-Abflüsse: Gail/Federaun

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 5: Wasserbilanz und Kennzahlen: Gailtal 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Wasserhaushalt Gurk

Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% - Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2014 und der Periode 1981 - 2010

Zu- und Abflüsse (m³/s):

	2014	1981-2010
Gurk Zuflüsse MQ:	3,13	2,01
Gurk Abflüsse MQ:	44,9	27,8
Gurk Gebietsabfluss MQ:	41,8	25,8

Gumisch/Gurk:

	2014	1981-2010
NQt (m³/s):	20	8,86
HHQ (m³/s):	139	267

HQ₁₀₀ = 300 m³/s

Gurk-Zuflüsse: Olsa, Görtschitz Gurk-Abflüsse: Gurk/Gumisch

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 6: Wasserbilanz und Kennzahlen: Gurk 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Wasserhaushalt Lavant

Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% - Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2013 und der Periode 1981 - 2010

Zu- und Abflüsse (m³/s):	2014	1981-2010
Lavant Zuflüsse MQ:	1,43	0,92
Lavant Abflüsse MQ:	19,4	11,3
Lavant Gebietsabfluss MQ:	18,0	10,3

Krottendorf/Lavant:	2014	1981-2010
NQt (m³/s):	9,8	2,81
HQ (m³/s):	192	235

HQ₁₀₀ = 300 m³/s

Lavant-Zuflüsse: Obere Lavant Lavant-Abflüsse: Lavant/Krottendorf

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 7: Wasserbilanz und Kennzahlen: Lavanttal 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Wasserhaushalt Untere Drau / Karawanken

Bilanz 2014 im Vergleich zur Periode 1981 - 2010

% - Anteile des Abflusses und der Verdunstung am Niederschlag 2014 und der Periode 1981 - 2010

Zu- und Abflüsse (m³/s):	2014	1981-2010	Drau/KW Schwabeck:	2014	1981-2010
Untere Drau Zuflüsse MQ:	314,93	206,79	NQt (m³/s):		
Untere Drau Abflüsse MQ:	366,5	236,5	HQ (m³/s):	1600	
U.Drau Gebietsabfluss MQ:	51,6	29,7	HQ ₁₀₀ = 2680 m³/s		

Untere Drau-Zuflüsse: Drau mit Gail Untere Drau-Abflüsse: KW Schwabeck

Δ - Bilanz Modell- u. Datenunschärfe bzw. Wasserzischenspeicherung (- aus Vorjahr; + fürs nächste Jahr)

Abb. 8: Wasserbilanz und Kennzahlen: Untere Drau/Karawanken 2014 im Vergleich zu 1981–2010.

Abb. 9: Monatliche Niederschlagssummen des Jahres 2014 (blau) und 2013 (lila) im Vergleich zur Langzeitbeobachtung in Oberdrauburg. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

Flussgebiet Obere Drau

Niederschlag/Abfluss/Grundwasserstände

Besonders in den Monaten Jänner, Februar, August und November fielen überdurchschnittlich hohe Niederschlagsmengen. Der Gebietsniederschlag in Oberkärnten betrug 2014 ca. 1.837 mm. Der langjährige Gebietsniederschlag für die Drau mit Möll und Lieser (ohne Osttirol)

Abb. 10: Abflussmengen (m³/s) des Jahres 2014 (dunkelblau) im Vergleich zur Langzeitbeobachtung am Pegel Sachsenburg/Drau. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

Abb. 11:
Grundwasserstände
des Jahres 2013
(grün) und 2014 (rot)
im Vergleich zur
Langzeitbeobach-
tung an der Mess-
stelle Kleblach.
Quelle:
Hydrographischer
Dienst Kärnten

liegt bei 1.364 mm. Die mittlere Jahressumme von 1981–2010 beträgt für Oberdrauburg 1.074 mm. Der Jahresniederschlag 2014 lag in Oberdrauburg bei 1.654 mm, das entspricht einem Plus von 54 %. Die Mittelwassermenge (MQ) der Drau bei Amlach lag mit 173,2 m³/s deutlich über dem langjährigen Mittel von 124,5 m³/s, das entspricht einem Plus von 39,1 %.

Das größte Hochwasser des Jahres trat am 6. November auf. Die Abflussspitze betrug 665 m³/s, das ist etwas über dem einjährigen Hochwasser (HQ₁).

Flussgebiet Gurk

Extrem hohe Niederschläge gab es im Jänner, Februar und August; Mengen, die in den letzten 30 Jahren in diesem Ausmaß nicht beobachtet wurden. Mit Ausnahme der Monate März und Oktober waren alle Monate überdurchschnittlich verregnet. Der Gebietsniederschlag des Einzugsgebietes der Gurk bis zur Mündung in die Drau betrug auf Kärntner Gebiet (2.356 km²) ca. 1.246 mm. Der mittlere Gebietsniederschlag der Periode 1981–2010 beträgt 944 mm. Der Jahresniederschlag 2014 in Klagenfurt-Süd betrug 1.350 mm. Die mittlere Jahressumme von 1981–2010 für Klagenfurt-Süd beträgt 895 mm, das entspricht einem Plus von 50,8 %.

Die Mittelwassermenge der Gurk bei Gumisch betrug MQ = 44,93 m³/s. Sie liegt deutlich über dem langjährigen Mittel von 27,8 m³/s, das

Abb. 12: Monatliche Niederschlagssummen des Jahres 2014 (blau) und 2013 (lila) im Vergleich zur Langzeitbeobachtung in Klagenfurt. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

entspricht einem Plus von 61,7 %. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Grundwasserständen.

Das größte Hochwasser des Jahres trat am 14. September auf. Die Abflussspitze betrug 139 m³/s, das entspricht einem dreijährlichen Hochwasser (HQ₃).

Abb. 13: Abflussmengen des Jahres 2014 (dunkelblau) im Vergleich zur Langzeitbeobachtung am Pegel Gumisch/Gurk. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

Abb. 14: Grundwasserstände des Jahres 2013 (grün) und 2014 (rot) im Vergleich zur Langzeitbeobachtung an der Messstelle Maria Saal-Zollfeld. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

Flussgebiet Lavant

Die Monate Februar, August, September und November waren überdurchschnittlich feucht, der März und der Oktober sehr trocken. Der Gebietsniederschlag des Einzugsgebietes der Lavant bis Krottendorf (954,5 km²) betrug ca. 1.244 mm. Der mittlere Gebietsniederschlag für dieses Gebiet der Periode 1981–2010 beträgt 948 mm. Der Jahresniederschlag 2014 in Wolfsberg betrug 999 mm. Die mittlere Jahres-

Abb. 15: Monatliche Niederschlagssummen des Jahres 2014 (blau) und 2013 (lila) im Vergleich zur Langzeitbeobachtung in Wolfsberg. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

summe von 1980–2010 für Wolfsberg beträgt ebenfalls 779 mm, ein Plus von 28,2 %.

Die Mittelwassermenge der Lavant bei Krottendorf betrug $MQ = 19,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Sie liegt damit deutlich über dem langjährigen Mittel von $11,25 \text{ m}^3/\text{s}$, das entspricht einem Plus von 72,6 %.

Das größte Hochwasser des Jahres trat am 13. September auf. Die Abflussspitze betrug $192 \text{ m}^3/\text{s}$, das entspricht einem 15-jährlichen Hochwasser ($< HQ_{15}$).

Abb. 16:
Abflussmengen
des Jahres 2014
(dunkelblau) im
Vergleich zur Lang-
zeitbeobachtung am
Pegel Krottendorf/
Lavant.
Quelle:
Hydrographischer
Dienst Kärnten

Abb. 17:
Grundwasserstände
des Jahres 2013
(grün) und 2014
(rot) im Vergleich
zur Langzeit-
beobachtung (erst
kurze Beobach-
tung), Messstelle
Wolfsberg.
Quelle:
Hydrographischer
Dienst Kärnten

Schneeverhältnisse im Jahr 2014

Abb. 18: Tagesschneehöhen (7-Uhr-Werte) in Klagenfurt. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

Abb. 19: Tagesschneehöhen (7-Uhr-Werte) am Nassfeld. Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten

Besondere hydrologische Einzelereignisse 2014

Hohe Grundwasserstände und Kellerflutungen in Klagenfurt

Niederschlagsmengen in Form von Regen im Jänner und Februar im Ausmaß von 336 mm als auch die Niederschläge im November des letzten Jahres ließen den Wörthersee und die Grundwasserstände im Klagen-

Abb. 20: Die Wasserstände im See, die Abflüsse in der Glanfurt und die Grundwasserstände in Klagenfurt hängen eng miteinander zusammen.

Abb. 21: Karte mit Grundwasserständen und Grundwasser-Flurabständen (Abstand zwischen Grundwasserspiegel und Geländeoberfläche) in Klagenfurt im Februar 2014.

Quelle: Hydrographischer Dienst Kärnten und Hydrographisches Zentralbüro BMLFUW

furter Becken extrem ansteigen. Der Wörthersee-Abfluss, die Glanfurt, erreichte in Folge des hohen Seewasserstandes am 22. Februar eine Abflussmenge von $17,5 \text{ m}^3/\text{s}$; das entspricht einem zehn-jährlichen Ereignis. Der hohe Grundwassersee verursachte viele Kellerflutungen, sodass die Feuerwehr wochenlang im Pump-Dauereinsatz war. Ähnliche hohe Grundwasserstände traten im Jahr 2000 auf.

Das Gail-, Lesach- und obere Drautal ersticken im Schnee

Abb. 22:
Schneehöhen mit mehr als 2 m im Lesachtal Anfang Februar 2014.
Foto: Ljuba

Abb. 23:
Schneehöhen im Lesachtal.
Quelle:
Hydrographischer Dienst Kärnten

Anschrift der AutorInnen

DI Johannes Moser,
DI Elisabeth Gutschi
und DI Christian Kopeinig,
Hydrographischer Dienst Kärnten,
Flatschacher Straße 70,
9020 Klagenfurt,
johannes.moser@ktn.gv.at;
elisabeth.gutschi@ktn.gv.at;
christian.kopeinig@ktn.gv.at

Hochwasser-Ereignisse im oberen Gailtal und in Lavamünd 2014

In Osttirol und Kärnten kam es durch eine Südströmung vom 4. bis 8. November 2014 zu massiven Niederschlägen im Südstau der Alpen. Der Schwerpunkt der Niederschläge entfiel auf die Zeit vom 5. bis 6. November mit Eintages-Niederschlagssummen bis zu 100 mm. Die Schneefallgrenze lag bei über 2.000 m und damit für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch. An der Messstelle Plöckenpass fielen innerhalb von fünf Tagen 650 mm Niederschlag.

Im mittleren Gailtal wurde am späten Donnerstagabend HQ10 erreicht, ein zweiter Abflussscheitel blieb deutlich darunter. Im unteren Gailtal gingen die statistischen Abflussgrößen durch die Retentionsräume und die relativ geringeren Zuflüsse in diesem Bereich auf HQ5 bis HQ1 zurück. Durch den naturräumlichen Charakter des Gailtales, den Hochwasserschutz und die ausreichenden Retentionsräume kam es zu keinen größeren Schäden in Siedlungsgebieten. Einzig am Pressegger See, der als Hochwasser-Rückhaltebecken dient, wurden touristische Seeinbauten in Mitleidenschaft gezogen.

In Lavamünd wurde der für Überflutungen kritische Wert von ca. $1.600 \text{ m}^3/\text{s}$ ebenfalls zu Mitternacht vom 6. auf den 7. November und den darauffolgenden Morgenstunden erreicht. Es gab keine größeren Schäden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [205_125](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Johannes, Gutschli Elisabeth, Kopeinig Christian

Artikel/Article: [Die hydrologische Bilanz 2014 in Kärnten 185-200](#)