aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Die übrigen Aenderungen, welche gleichzeitig an den Satzungen vom 30. April 1892 vorgenommen wurden, haben keine Wesentlichkeit, sie ergeben sich theilweise als mit jenen Paragraphen im Zusammenhange stehend, welche den Secretär und die Custoden betreffen, theilweise sind es stilistische Verbesserungen 2c.

Hoffen wir, dass durch die Handhabung der neuen Satzungen an den Sammlungen des Museums Bestehendes erhalten bleibe, vieles Unvollständige vervollständigt, ihre Verwaltung und Obhut aber überhaupt von jenem Geiste und zielbewussten Eifer durchdrungen werde, welcher unter dem Einflusse der beengenden alten Satzungen sich nicht mehr recht entfalten konnte. Diese bei dem ruhelosen Fortschreiten der Naturkunde unbedingt nothwendigen Eigenschaften der Custoden werden das Museum auf der Höhe der Zeit erhalten. J.

Die Tief'schen Dipteren-Sammlungen.

(Schluss.)

Familie: Tachininae (Raupenfliegen).

Von dieser außerordentlich nützlichen Familie, deren Maden vorzugsweise in Raupen von Schmetterlingen leben, finden sich zahlreiche Einschübe.

Tief gibt an:

Rhinophora atramentaria Mg.*)

Einschübe sind folgende zwei Arten:

Phyto aenescens Zett., 2 Stücke mit dem Zettel Juni 1885.

Clista (= Fortisia) foeda Mg. +, 1 Stück.

Agculocera (= Acemyia) grisea Kow. + (auch von Judendorf und Seebach).

Hypostena procera Mg. +, medorina Schin.

Degeeria collaris Fll., blanda Fll. +, separata Mg. +.

Aus Niederösterreich findet sich D. pulchella Mg.

Von Macquartia finden sich außer

M. grisea Fll. +, atrata Fll., chalybeata Mg. + und lucida Mg. + folgende 4 Einschübe:

M. monticola Egg. in 1 Exemplar,

M. chalconota Mg. + in 2 Exemplaren (♂♀),

*) Diese Gattung wird von Strobl zur Familie Phasinae gestellt.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

M. tenebricosa Mg.+ in 1 Exemplar,
M. nitida Zett.+ in 3 Exemplaren.
Alle 4 Arten ohne nähere Fundortangabe.
Frivaldzkyia coracina Mg.,
Polidea aenea Mg.+,
Clytia*) continua Pz. und C. helvola Mg.+,
Siphona cristata F.+ und S. geniculata Deg.+.
Von Thryptocera finden sich außer Thr. frontalis Mcq.+ noch:
Thr. crassicornis Mg.+,
Thr. setipennis Fll.+,
Thr. bicolor Mg.+ (dieser sehr selten),
Thr. grisea R.-D., alle in nur 1 Exemplar ohne nähere Fundortangabe.
Auch die seltene Roeselia antiqua Fll.+ liegt in 1 Exemplare vor.
Von Myiobia findet sich außer
M. fenestrata Mg.+, inanis Fll.+ und M. pacifica Mg.+,
M. longipes Mg.+ in 1 Exemplar von Rennstein,
Leskia tricolor Mik.
Von Miltogramma kommen außer M. ruficornis Mg., pilitarsis Rond.+ und M. punctella Mg. als Einschübe vor:
M. conica Fll.+ in 2 Exemplaren,
M. Germari Mg. in 2 Exemplaren,
M. oestracea Fll. in 1 Exemplar, alle ohne nähere Fundortangabe.
Aus den Sudeten findet sich in 1 Exemplar M. Piccioli Rond.
Ferner kommen vor:
Hilarella siphonina Zett.; von
Macronychia außer M. signata Mg. auch noch
M. agrestis Fll.+ in 2 Exemplaren (August 1887),
M. griseola F. in 1 Exemplar (23. Juni 1887), beide ohne nähere Angabe der Fundorte.
Ein Einschub ist auch
Paragusia Frivaldzkyi Schin. in 2 Exemplaren ohne nähere Fundortangabe.
Ferner enthält die Sammlung:
Metopia fastuosa Mcq., leucocephala Rossi+, argyrocephala Mg.+,

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Frontina tibialis Mcq., laeta Mg.,
Baumhaueria vertiginosa Mg. und von
Phorocera außer Ph. (= Setigera) caesifrons Mcq.+ noch
Ph. poleniella Rond. in 4 Exemplaren aus St. Paul,
Ph. assimilis Fll.+ in 1 Exemplar,
Ph. concinnata Mg. in 1 Exemplar, alle 3 ohne nähere Angabe des Fundortes.
Von Masicera liegen außer den von Tief angegebenen Arten
M. major Mcq., pratensis Mg.+, sylvatica Fll., ferruginea Mg. (diese fehlt), rutila Mg. folgende Einschübe vor:
M. virilis Rond. in 2 Exemplaren*),
M. tibialis R. - D. in 2 Exemplaren,
M. (Sturmia) scutellata R. - D.+ in 3 Exemplaren,
M. (Sturmia) cursitans Rnd.+ in 2 Exemplaren,
M. (Sturmia) spec. in 3 Exemplaren von Judendorf (die ersten 4 Arten tragen keine genauere Fundortangabe).
Von Tachina (Eutachina) kommen außer T. mimula Mg.+, erucarum Rond.+, rustica Mg.+ folgende Einschübe vor:
T. tibialis Mg. in 3 Exemplaren von Federaun und der Bleiröhren-Fabrik,
T. doris Mg. in 1 Exemplar,
T. bibens Mg. in 1 Exemplar,
T. agilis Mg. in 1 Exemplar,
T. morosa Mg. in 1 Exemplar,
T. larvarum L.+ in 2 Exemplaren (Sammlung des Museums),
T. nigricans Egg.+ in 1 Exemplar und spec. div. (nähere Fundortangaben fehlen).
Von Meigenia findet sich außer M. bisignata Mg.+ noch M. floralis Fll.+ in 1 Exemplar.
Von Exorista kommen außer E. vulgaris Fll., fimbriata Mg.+, vetula Mg., excisa Fll.+, polycheta Mcq.+, libatrix Pz., excavata Zett. (diese auch von Judendorf) folgende Einschübe vor:
E. confinis Fll.+ in 2 Exemplaren von Rennstein,
E. affinis Fll.+ in 2 Exemplaren von Judendorf,
E. lucorum Mg.+ in 2 Exemplaren,

*) Soll nach gütiger brieflicher Mittheilung Strobls mit D. exodes agilis Mg. identisch sein.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

E. leucocephala Mg. in 1 Exemplar (Juni),
E. fauna Mg.+ in 1 Exemplar,
E. hortulana Mg. in 1 Exemplar, diese 4 Arten ohne genauere Fundortangabe.

Ein Einschub ist ferner

Epicampocera succincta Mg.+ in 1 Exemplar.

Von Nemoraea kommen außer

N. pellucida Mg., strenua Mg.+, radicum F.+, nigrithorax Egg.+, erythrura Mg.+, amoena Mg.+, vivida Zett. (diese fehlt) als Einschübe vor:

N. analis Meq. in 5 Exemplaren (Federaun und Seebach),
N. chaetolyga in 2 Exemplaren (Ossiachersee und ?),
N. rubrica Mg. in 1 Exemplar,
N. caesia Fll.+ in 2 Exemplaren,
N. rudis Fll.+ in 3 Exemplaren (darunter 1 aus Sachsen),
N. (Platichira) puparum F.+ in 1 Exemplar,
N. (Nemorilla) maculosa Mg.+ in 2 Exemplaren,
N. xanthogastra Rond.+ in 1 Exemplar aus Ossiach.

Aus Niederösterreich liegt N. quadripustulata F.+ in 1 Exemplar vor, aus Sachsen N. breviseta Zett. in 3 Exemplaren.

Von Gonia finden sich außer G. bifaria Zell. und G. fasciata Mg.+
G. divisa Mg. in 2 Exemplaren,
G. capitata Deg.+ in 2 Exemplaren,
G. Foersteri Mg.+ in 1 Exemplar; letztere beiden Arten liegen aus Niederösterreich vor.

Pachystylum Bremii Meq., von Schiner citiert, fehlt.

Ein Einschub ist

Peteina erinacea F. in 5 Exemplaren (darunter 1 aus Schlesien).

Von Plagia liegen nebst Pl. nigripalpis Rond., trepida Mg.+ und Pl. ruralis Fll.+ als Einschübe
Pl. ruricola Mg.+ in 1 Exemplar,
Pl. curvinervis Zett.+ in 1 Exemplar vor. Ferner finden sich
Labidigaster forcipatus Mg.,
Zophomyia temula Scop.+,
Olivieria lateralis F.+,
Demoticus plebejus Fll.+, frontatus Boh.+,

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Aphria longirostris Mg.,
Gymnochaeta viridis Fall.+,
Micropalpus vulpinus Fall.+, fulgens Mg., haemorrhoidalis Fall.+, pictus Mg.+ und außer diesen als Einschübe
M. impudicus Rond.,
M. nubilus Mg., beide aus Niederösterreich und beide nur Varietäten von M. haemorrhoidalis,
Mikia magnifica Mik.,
Echinomyia ferox Pz., tesselata F., magnicornis Zett., grossa L.+, fera L.+, Marklini Zett.+ (diese fehlt). Einschübe sind
E. ursina Mg. in 1 Exemplar,
E. ferina Zett. in 1 Exemplar aus Niederösterreich.

Familie: Phaninae.

Uromyia curvicauda Fll.; ein Einschub ist
Gymnopeza denudata Zett. in 1 Exemplar,
Phania obscuripennis Mg.+ und als Einschub
Ph. vittata Mg.+ in 4 Exemplaren, darunter 2 aus Niederösterreich.

Familie: Ocypterinae (Walzenfliegen).

Von Ocyptera finden sich außer
O. brassicariae F.+, pilipes Lw., interrupta Mg., excisa Lw.+, als Einschübe:
O. intermedia Mg. in 4 Exemplaren von Federaun,
O. cylindrica F.+ in 1 Exemplar.

Familie: Gymnosominae (Kugelfliegen).

Cistogaster globosa F.
Von Gymnosoma finden sich außer G. nitens Mg., rotundata L.+ als Einschub:
G. costata Pz.+ in 2 Exemplaren, sowie noch eine nicht näher bestimmte Art in 2 Exemplaren aus dem Gurkthale.

Familie: Phasinae.

Xysta cana Mg. (diese liegt auch aus Niederösterreich vor). Ein Einschub ist
X. semicana Egg. in 1 Exemplar (Sammlung des Museums).
Von Phasia liegt außer Ph. analis F.+, crassipennis F.+ in 1 Exemplar eine nicht näher bestimmte Art am Ossiacherse vor.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Von Alophora kommen außer A. muscaria Fall.+, aurulans Mg.+, cinerea F.+, semicinerea Mg. und A. hemiptera F. (diese auch aus Niederösterreich vorhanden) als Einschübe vor
A. umbripennis in 4 Exemplaren*),
A. atropurpurea Mg. in 1 Exemplar, sowie eine nicht näher bestimmte Art.

Familie: Oestridae (Bremsen).

Von Gastrophilus (Magenfliege) findet sich
G. haemorrhoidalis L. in 4 Stücken, darunter 1 aus Niederösterreich.
Von Hypoderma kommt H. bovis Deg. (Viesfliege)+ vor.
Von H. Diana Brau. enthält die Sammlung 2 Exemplare aus Niederösterreich.
Von Oestrus kommt nur Oe. ovis L. = Nasenbremse (auch von Niederösterreich) vor.
Von Cephenomyia (Nachenbremse) finden sich
C. rufibarbis Mg. in 2 Exemplaren vom Harz,
C. stimulator Clark+ in 9 Stücken aus Niederösterreich.

Familie: Conopidae (Augenfliegen).

Von Dalmannia kommen nur die auch von Tief angegebenen Arten
D. aculeata L., punctata F., flavescens und D. marginata Mg. vor.
Von Myopa außer M. picta Pz., fasciata Mg.+, buccata L.+ testacea L.+, dorsalis F.
Als Einschübe:
M. variegata Mg. in 2 Exemplaren von Seebach,
M. occulta Mg.+ in 1 Exemplar,
M. polystigma Rond. in 1 Exemplar, letztere beide ohne genauere Fundortangabe.
Die Sammlung enthält ferner:
Sicus ferrugineus L.+,
Glossigona bicolor Mg.+,
Occemyia (= Oncomyia Strobl) atra F.+, pusilla Mg.+,

*) Diese Art soll gleich A. muscaria sein und beide Arten sollen nur eine Varietät von A. barbifrons Girschner sein. (Vergl. diesen und Strobl 1894 l. c. p. 48.)

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Zodion cinereum F.+ und als Einschub ohne nähere Angabe
Z. notatum Mg.+ in 1 Exemplar.
Von Conops finden sich außer C. coronatus Rond.+, vesicularis L.+, quadrifasciatus Deg.+, strigatus Mg.+, flavipes L.+
als Einschübe:
C. signatus Mg.+ in 1 Exemplar,
C. capitatus Lw.+ in 1 Exemplar,
C. scutellatus Mg.+ in 1 Exemplar, ohne nähere Angabe.
Von Physocephala findet sich außer Ph. rufipes F.+ und Ph. vittata F. als Einschub die äußerst seltene
Ph. nigra Deg. in 1 Exemplar (Sammlung des Museums).

Familie: Tetanocerinae (Langhornfliegen).

Außer Tetanocera elata F.+, laevifrons Lw., sylvatica Mg.+, ferruginea Fll.+, punctata F., reticulata F.+, umbrarum L.+, punctulata Scop.+, coryleti Scop.+ und T. unicolor Lw.+ findet sich als Einschub nur
T. vittigera Schumm.+ in 2 Exemplaren aus Livland.
Von Limnia kommen außer L. marginata F.+, unguicornis Scop.+, recta Lw. und L. obliterata F.+ als Einschübe
L. cincta F.+ in 1 Exemplar,
L. halaënsis Lw. in 1 Exemplar, beide ohne nähere Angabe vor.
Von Elgiva findet sich außer E. dorsalis F.+ als Einschub
E. albiseta Scop.+ in 1 Exemplar.
Von Sepedon kommen S. plebejus F.+ und S. spinipes Scop.+ vor.

Familie: Sciomyzinae.

Von Cormoptera findet sich nur C. limbata Mg.+, von
Sciomyzina nur die auch von Tief angegebenen Sc. glabricula Fll.+, nigrimana Mg., albocostata Fll.+, griseola Fll.+, rufiventris Mg.+, annulipes Zett.+, cinerella Fll.+, dubia Fll.+ und Sc. nana Fll.+.
Von Pelidnoptera (= Phaeomyia) kommen außer P. nigripennis F.+ als Einschübe
P. fuscipennis Mg.+ in 6 Exemplaren,
P. leptiformis Schin. in 1 Exemplar aus Niederösterreich vor.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Familie: Sepsinae (Schwingfliegen).

Es finden sich hier nahezu keine Einschübe. Tief gibt folgende Arten an:

Madiza glabra Fll.+,
Mycetaulus bipunctatus Fll.,
Piophila casei L.+ (es findet sich auch eine nicht näher bestimmte Art aus Villach),
Saltella scutellaris Fll.,
Themira putris L.+, Fallenii Staeg.,
Nemopoda cylindrica F.+, stercoraria R. - D.+,
Sepsis annulipes Mg., punctum F.+, violacea Mg.+, cynipsea L.+, flavimana Mg.+.

Familie: Chloropinae (Halmfliegen).

Auch hier sind die Einschübe wenig zahlreich. Es finden sich:
Eurina pubescens Mg.,
Platycephala planifrons F.+ und Pl. umbraculata F.+,
Camarota flavitarsis Mg.,
Meromyza pratorum Mg.+, variegata Mg.+, laeta Mg.+, saltatrix L.+, nigriventris Meq.+,
Centor Cereris Fll.+, myopinus Lw.+,
Anthracophaga strigula F.+,
Haplegis divergens Lw.+,
Diplotaxa messoria Fll.+; von
Chlorops finden sich außer Chl. puncticollis Ztt.+, taeniopus Mg.+, brevifrons Lw., speciosa Mg.+, planifrons Lw.+, minuta Lw.+ (diese Art auch von St. Anna), didyma Zett.+, geminata Mg.+, hirsuta Lw.+ und Chl. rufina Ztt.+ folgende Einschübe:
Chl. discicornis Lw.+ in 9 Exemplaren aus Villach,
Chl. hypostigma Mg. in 1 Exemplar aus Federaun,
Chl. nasuta Schrck. in 4 Exemplaren,
Chl. lineata F. in 1 Exemplar,
Chl. cingulata M. in 2 Exemplaren aus der Umgebung von Villach (Sammlung des Museums).
Von Chloropsica finden sich Chl. rufa Meq.+ und Chl. ornata Mg.+.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Von Siphonella nur S. pumilionis Bjerk.+, flavella Zett.+, palposa Fll.+, nucis Pers.+, cincta Mg. und Ch. trilineata Mg.+; von
Oscinis nur O. albiseta Mg.+, maura Fll.+, frit L.+ und O. pusilla Mg.+; von
Elachiptera nur E. brevipennis Mg. und E. cornuta Fll.+; von
Gampsocera nur G. numerata Heeg. und von
Lipara außer L. rufitarsis Lw. und L. lucens Mg.
als Einschub:
L. similis Schin. in 1 Exemplar.

Familie: Ulidinae.

Tief gibt an:
Chloria (= Chrysomyza Fll. nach Strobl) demandata F.+,
Myodina (= Scoptera Krb. nach Strobl) vibrans L.+.

Familie: Platystominae (Plattmaulfliegen).

Außer Platystoma seminationis F.+ findet sich als Einschub
Pl. umbrarum F.+ in 1 Exemplar.

Familie: Ephydrinae.

Es liegen vor:
Dichaeta caudata Fll.+ und D. brevicauda Lw.,
Notiphila nigricornis Stenh.+, venusta Lw., cinerea Fll.+ und N. riparia Mg.+,
Trimerina madizans Fll.+,
Discomyza incurva Fll.+,
Clasiopa obscurella Fll.+ (in 10 Exemplaren),
Ephygrobia compta Mg., polita Mcq.
Athyroglossa glabra Mg.+,
Hydrellia griseola Fll.+, grisea Stenh., modesta Lw.+, discolor Stenh. und als Einschub
H. albilabris Mg.+ in 1 Exemplar,
Philygria interstincta Fll.+, picta Fll., flavipes Fll.+, femorata Stenh.+,
Ochthera mantis Deg.,
Canace ranula Lw. (1 Exemplar aus Cuxhafen),

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Parydra coarctata Fll. +, quadripunctata Mg. +, litoralis Mg. + und P. aquila Fll. +, sowie als Einschub

P. fossarum Hal. + in 1 Exemplar,

Ephydra micans Hal. +, sowie E. riparia Fll. aus Niederösterreich,

Ilythea spilota Curt.,

Scatella sorbilans Hal. +, cribrata Stenh., stagnalis Fll. +, sowie als Nachtrag

Sc. silacea Lw. in 3 Exemplaren, darunter 1 aus der Umgebung von Villach (Sammlung des Museums).

Familie: Helomyzinae (Sumpffliegen).

Von Helomyza finden sich außer H. humilis Mg. +, nemorum Mg. +, flava Mg. +, laevifrons Lw. +, ustulata Mg. +, Zetterstedti Lw. +, montana Lw. + und H. olens Mg. + folgende Einschübe:

H. similis Mg. + in 3 Exemplaren am Villacher Exercierplatz und 1 aus Schlesien,

H. affinis Mg. + in 3 Exemplaren,

H. pectoralis Lw. in 1 Exemplar,

H. praeusta Mg. in 8 Exemplaren,

H. rufa Fll. in 4 Exemplaren, letztere 4 Arten ohne nähere Fundortangabe.

Weiters besitzt die Sammlung:

Allophyla atricornis Mg. +,

Ecceptomera filata Lw., pallescens Mg. +, longiseta Mg. + und E. emarginata Lw. +,

Oecothea fenestralis Fll. +, sowie als Einschub

Oe. microphthalma Ztt. in 1 Exemplar,

Blepharoptera modesta Mg. + und Bl. serrata L. +, sowie Bl. ruficauda Ztt. als Einschub,

Tephrochlamys flavipes Ztt. + und T. rufiventris Mg. +;

Scoliocentra villosa Mg. + liegt in 2 Exemplaren aus Niederösterreich vor.

Familie: Dryomyzinae.

Diese Familie findet sich in Tiefs Katalogen nicht vertreten. Hieher gehört die aus Helgoland vorliegende Actora aestuum Mg. in 1 Exemplar.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Ferner gehört hieher auch nach Strobl:
Dryomyza flaveola F. var. Zawadskii Schin.+, welche Tief bei den Ortalinae (siehe dort) anführt.

Familie: Borborinae (Düngerfliegen).

Außer zahlreichen heute noch nicht bestimmten Nachträgen finden sich vertreten von
Limosina die Arten L. acutangula Ztt., ferruginata Stenh.+, ochripes Mg.+, limosa Fll.+, sowie als Nachträge:
L. crassimana Hal.+ in 1 Exemplar von Seebach,
L. fontinalis Mg.+ in 1 Exemplar,
L. pumilio Mg. in 1 Exemplar, letztere beide ohne genauere Angabe der Fundorte;
Sphaerocera subsultans F.+,
Borborus geniculatus Mcq.+, nitidus Mg.+, major Mg. und B. equinus Fll.+, sowie als Nachtrag
B. vitripennis Mg.+ in 4 Exemplaren.
Ueberdies liegt die seltene
Coelopa frigida Fll. in 2 Exemplaren vom Strande der Nordsee vor. Auch von der zumeist im hohen Norden verbreiteten Familie der

Phycodrominae

findet sich als Vertreter
Orygma luctuosa Mg. in 1 Exemplar von Helgoland.

Familie: Scatophaginae (Mistfliegen).

Von Scatophaga finden sich außer Sc. scyballaria L., spurca Mg., lutaria F., inquinata Mg.+, stercoraria L. und Sc. squalida Mg. folgende Einschübe:
Sc. merdaria F.+ in 8 Exemplaren aus Kärnten,
Sc. cinerea Mg. in 1 Exemplar,
Sc. littorea Fll.+ in 1 Exemplar.

Familie: Geomyzinae (Endfliegen).

Von Leptomyza findet sich nur L. gracilis Fll.+.
Von Geomyza finden sich G. combinata L.+, venusta Mg.+ und G. tripunctata Fll.+, von
Opomyza außer O. germinationis L.+ und O. florum F.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Als Einschübe:

O. Nataliae Schin. in 4 Exemplaren (vielleicht aus Schlesien) und die bezüglich ihrer Stellung unsichere

O. albimana Mg. in 1 Exemplar (Sammlung des Museums).

Von Scyphella kommen Sc. lutea Fll. und Sc. flava L.+ vor, von

Diastata nur die auch von Tief angegebenen D. obscurella Fll., costata Mg.+ und D. unipunctata Ztt.+.

Familie: Drosophilinae (Thaufliegen).

Die von Tief angegebenen Arten

Asteia amoena Mg.+,

Periscelis annulata Fll.,

Stegana curvipennis Fll.+,

Gitona distigma Mg.+ finden sich auch in der Sammlung.

Von Drosophila kommen außer Dr. maculata L.+, transversa Fll., phalerata Mg., obscura Fll.+, melanogaster Mg., fasciata Mg., histrio Mg.+, fenestrarum Fll., funebris F.+ und Dr. graminum Fll. folgende Einschübe vor:

Dr. distincta Egg.+ in 24 Exemplaren aus der Umgebung von Villach,

Dr. griseola Ztt.+ in 1 Exemplar,

Dr. approximata Ztt. in 1 Exemplar,

Dr. alboguttata Whlbg.+ in 3 Exemplaren,

Dr. maculipennis Gimm. in 1 Exemplar, letztere 4 Arten ohne nähere Angabe.

Ferner findet sich auch der von Tief angegebene

Aulacigaster rufitarsis Mcq.

Familie: Psilinae (Nachtfliegen).

Von Psila finden sich außer Ps. fimetaria L.+, abdominalis Schum.+, bicolor Mg.+, pectoralis Mg.+, fuscinervis Zett., gracilis Mg., rosae F.+, nigricornis Mg.+, nigra Fall.+, unilineata Ztt. folgende Einschübe:

Ps. rufa Mg.+ in 8 Exemplaren aus Kärnten und Schlesien,

Ps. atra Mg.+ in 10 Exemplaren aus Villach,

Ps. villosula Mg.+ in 4 Exemplaren,

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Ps. morio Zett.+ in 1 Exemplar. Auch die äußerst seltene
Psilosoma Audouini Ztt. findet sich in 3 Exemplaren aus der Umgebung von Villach (Sammlung des Museums).
Von Chyliza finden sich Ch. atriseta Mg., annulipes Mcq.+, leptogaster Panz.+ und Ch. vittata Mg.; von
Loxocera außer L. elongata Mg.+, ichneumonea L. und L. sylvatica Mg.+.

Als Einschub:

L. fulviventris Mg. in 8 Exemplaren (1 aus Schlesien).

Familie: Tanypezinae.

Es finden sich nur die von Tief angegebenen Arten:
Tanypeza longimana Fll.+,
Micropeza corrigiolata L.+ und von Calobata die Arten C. ephippium F.+, cibaria L.+ und C. cothurnata Panz.+.

Familie: Trypetinae (Bohrfliegen).

Von dieser fast durchwegs schädliche Arten enthaltenden Familie enthalten die Sammlungen:
Euphranta connexa F.+,
Platyparaea poeciloptera Schrck. und Pl. discoidea F.+,
Aciura rotundiventris Fll.+,
Hemilea dimidiata Costa+,
Acidia cognata Wied.+, lucida Fll.+, heraclei L.+ und A. lichnidis F.,
Spilographa Zoë Mg.+ und Sp. hamifera Lw.+,
Zonosema Meigenii Lw. und als Einschub
Z. alternata Fll. in zahlreichen aus Rosa canina L. gezogenen Exemplaren.
Von Rhagoletis findet sich Rh. cerasi L.+, von
Trypeta finden sich außer Tr. falcata Scop.+, onotrophes Lw., tussilaginis F.+, cornuta F.+, serratulae L., acuticornis Lw. als Einschübe
Tr. tenera Lw. in 1 Exemplar,
Tr. ruficauda F.+ in 2 Exemplaren (Sammlung des Museums).
Von Ensina findet sich E. sonchi L.+, von
Urophora kommen außer U. eriolepidis Lw.+, solstitialis L.+ und quadrifasciata Mg.+ als Einschübe vor

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

U. congrua Lw.+ in 1 Exemplar,
U. cardui L.+ in 2 Exemplaren,
U. terebrans Lw. in 2 Exemplaren; letztere beiden Arten finden sich nur in der Sammlung des Museums. Einschübe sind auch
Myopites Frauenfeldi Schin. in 2 Exemplaren,
M. inulae v. Ros in 2 Exemplaren (letztere Art nur in der Museums-Sammlung).
Von Carphotricha finden sich C. guttularis Mg.+ und C. pupillata Fll.+, von
Oxyphora außer O. miliaria Schrck.+ und O. corniculata Fll.+ als Einschub
O. Schaefferi Ffld.+ in 1 Exemplar (Sammlung des Museums).
Von Oxyna kommt außer flavipennis Lw., proboscidea Lw.+, tesselata Lw., producta Lw.+ (= punctella Fll. nach Strobl), elongatula Lw.+, doronici Lw.+
O. pantherina Fll. in 12 Exemplaren von Hermagor und Hüttenberg vor.
Von Tephritis kommen zahlreiche Einschübe vor.
Tief führt 11 Arten an: T. formosa Germ., arnicae L.+, conura Lw.+, matricariae Lw., ruralis Lw.+, vespertina Lw., leontodontis Deg.+, dilacerata Lw.+, bardanae Schrck., hyosciami L.+ und T. conjuncta Lw.+. Dazu kommen:
T. dioscurea Lw. in 2 Exemplaren,
T. postica Lw. in 1 Exemplar,
T. valida Lw. in 26 Exemplaren,
T. pulchra Lw. in 1 Exemplar;
T. marginata Fll. liegt in 4 Exemplaren aus Schlesien,
T. truncata Lw. in 1 Exemplar aus Mödling vor.
Von Urellia finden sich außer U. stellata Fuessli+ und U. eluta Mg. noch
U. cometa Lw. in 2 Exemplaren,
U. amoena Ffld.+ in 2 Exemplaren (Sammlung des Museums). Ein Einschub ist auch
Sphenella marginata Fll.+ (= Sp. arcuata Schrck. nach Strobl), die in circa 70 Exemplaren vorhanden ist. Aus Salzburg liegt
Hypochra parmensis Rond. in 10 Exemplaren vor.

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Familie: Sapromyzinae (Moderfliegen).

Von Palloptera finden sich außer P. umbellatarum F.+ und ambusta Mg.+ als Einschübe:

P. ustulata Fll.+ in 1 Exemplar aus Judendorf,

P. saltuum L.+ in 1 Exemplar aus Niederösterreich,

P. arcuata Fll.+ in 2 Exemplaren aus Niederösterreich.

Von Sapromyza kommen außer S. longipennis F.+, lupulina F.+, fasciata F.+, decempunctata Fll.+, notata Fll., quadripunctata L.+, sexpunctata Mg.+, decipiens Lw., rorida Fll.+, obscuripennis Lw. und S. albiceps+ als Einschübe vor:

S. simplex Lw.+ in 1 Exemplar,

S. apicalis Lw.+ in 1 Exemplar,

S. praeusta Fll.+ in 1 Exemplar.

Von Lauxania kommt außer L. cylindricornis F.+, L. aenea Fll.+ noch

L. frontalis Lw.+ in 1 Exemplar von Arnoldstein vor.

Von Pachycerina findet sich außer P. seticornis Fll.+ und P. calliopis Mik.

P. signatipes Lw. in 1 Exemplar aus Sarepta; von

Lonchaea kommen außer L. vaginalis Fll., palposa Zett. und L. lasiophthalma Mcq.

L. chorea F.+ in 3 Exemplaren,

L. laticornis Mg.+ in 1 Exemplar vor.

Familie: Ortalinae (Schmuckfliegen).

Tief führt hier

Neuroctena anilis Fll. an, sowie

Phaeomyia fuscipennis Mg. (diese fehlt).

Einschübe sind:

Ph. nigripennis F.+ in 1 Exemplar (Gymnasial-Sammlung),

Ph. leptiformis Schin. aus Niederösterreich.

Von Herina finden sich nur H. paludum Fll.+, palustris Mg.+, nigrina Mg. und H. frondescentiae L.+; von

Rivellia nur R. syngenesiae F.+.

Einschübe sind:

Ortalis rufipes in 1 Exemplar,

O. guttata Mg.+ in 1 Exemplar,

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

O. formosa Pz.+ in 2 Exemplaren, letztere beide in der Sammlung des Museums;
Otites lamed Schrck. in 2 Exemplaren,
O. ruficeps F.+ in 1 Exemplar, beide in der Sammlung des Museums, und
Ceroxys hyalinata Pz. in 1 Exemplar (ebenfalls in der Sammlung des Museums).
Von der in Tiefs Katalogen nicht vertretenen

Familie Dorycerinae

liegt Trigonometopus frontalis Mg. in 1 Exemplar aus Berlin vor.

Familie: Agromyznae (Minierfliegen).

Von Phytomyza finden sich außer Ph. lateralis Fll.+, flava Fll.+, nigripennis Fll.+, albipennis Fll.+, obscurella Fll.+, flavoscutellata Fll.+, Zetterstedtii Schin.+, affinis Fll.+, nigritella Zett., abdominalis Zett. und Ph. stylata Mg. folgende Einschübe:
Ph. praecox Mg.+ in 1 Exemplar von der Stelzing,
Ph. pullula Ztt.+ in 2 Exemplaren von Judendorf,
Ph. geniculata Meq.+ in 7 Exemplaren von Villach,
Ph. albiceps Mg.+ in 1 Exemplar,
Ph. tenella Mg.+ in 1 Exemplar,
Ph. flavicornis Fll. in 3 Exemplaren, letztere 3 Arten ohne genauere Angabe.
Von Agromyza kommen außer laterella Ztt., pusilla Mg., geniculata Fll.+, carbonaria Ztt., nigripes Mg.+, atripes Ztt., flava Mg.+, cunctans Mg., exigua Mg.+, vittigera Ztt., reptans Fll., latipes Mg.+, M - atrum Mg.+ und A. obscurella Fll. vor
A. lutea Mg.+ in 1 Exemplar,
A. capitata Ztt.+ in 1 Exemplar,
A. gyrans Fll.+ in 1 Exemplar,
A. imbuta Mg. in 2 (♂♀) Exemplaren,
A. variegata Mg. in 1 Exemplar,
A. luctuosa Mg.+ in 1 Exemplar vom Kumitzberge,
A. M-nigrum Ztt.+ in 17 Exemplaren (2 aus Schlesien),
A. flaveola Fll. in 12 Exemplaren (auch Jahrbuch 1886, p. 72).

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Von Ceratomyza liegt nur C. denticornis Pz.+ und von Leiomyza liegen L. scatophagina Fll. und L. laevigata Mg. vor.

Familie: Milichinae.

Es finden sich:
Phyllomyza securicornis Fll.,
Lobioptera Tiefii Mik. und als Einschübe
Milichia ornata Zett. in 8 Exemplaren und
Schaenomyia litorella Fll. in 32 Exemplaren. (Vergl. Jahrb. des Museums 1886, p. 72.)

Familie: Ochtiphilinae.

Von Leucopis findet sich nur L. griseola Fll.+, von
Ochtiphila kommen vor O. elegans Pz., polystigma Mg., geniculata Ztt., juncorum Fll.+ und O. aridella Fll.+, von
Acrometopia nur A. Wahlbergi Ztt.

Familie: Heteroneurinae (Kolbenfliegen).

Von Heteroneura findet sich außer H. pictipes Zett.
H. albimana Mg.+ in 2 Exemplaren von Villach, von
Clusia kommen als Einschübe vor
Cl. flava Mg. in 2 Exemplaren,
Cl. decora Lw. in 2 Exemplaren aus Niederösterreich,
Amphipogon spectrum Whlbg. liegt in 15 Exemplaren (darunter 1 aus Niederösterreich) vor.

Familie: Cordylurinae.

Es liegen vor:
Hydromyza Tiefii Mik+, von
Clidogastra außer Cl. apicalis Mg., flavipes Fll., tibiella Ztt. und Cl. breviseta Ztt. (diese fehlt).
Als Einschübe:
Cl. nigrimana Ztt. in 2 Exemplaren von der Stelzing und
Cl. glaucescens Lw. in 17 Exemplaren (darunter 2 aus Schlesien).
Einschübe sind auch:
Conisternum cervinum Beck. in 1 Exemplar,
Conisternum nutans Beck. in 1 Exemplar,

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Conisternum inermis Beck. in 1 Exemplar. (Vergl. Strobl 1894, p. 79.)

Von Norellia kommen außer N. spinimana Mg. +, armipes Mg. + (diese fehlt), striolata Mg. noch vor

N. alpestris Schin. + in 1 Exemplar,

N. liturata Mg. + in 1 Exemplar; von

Cordylura finden sich außer C. pubera L., ciliata Mg. + (diese fehlt), albilabris F. +, albipes Fll. +, pallida Fll. + und C. lurida Schin. noch

C. rufimana Mg. in 1 Exemplar,

C. biseta Lw. in 1 Exemplar,

C. ciliata Mg. in 1 Exemplar (Sammlung des Gymnasiums),

C. breviseta Zett. = (Gonatus brevisetta, vergl. Verh. d. zool.-bot. Ges. 1889, p. 187) in 2 Exemplaren aus Villach.

Tribus III. Pupipara (Puppengebärer).

Familie: Hippoposcidae (Lausfliegen).

Es finden sich

Melophagus ovinus L. (Schafzecke) in 4 Exemplaren, darunter 3 aus Niederösterreich,

Lipoptena cervi L. in 2 Exemplaren,

Ornithomyia avicularia L. + (Vogellausfliege),

Stenopteryx hirundinis L. + (Schwalbenlausfliege),

Oxypterum pallidum Leach in 1 Exemplar,

Hippobosca equina L. + (Pferdelausfliege).

Familie: Braulinae.

Braula coeca Nitzsch + (Bienenlaus).

Familie: Nycteribiidae (Fledermausläuse).

Nycteribia Dufouri Wstw. in 1 Exemplar,

Nycteribia spec. nondet. in 1 Exemplar. Als Nachtrag ist die in der älteren Sammlung des Museums enthaltene

Syllegoptera ocypterata Mg. anzuführen, welche in zwei Exemplaren vorhanden und zu den Anthomyzinen zu stellen ist.

Die hiemit abgeschlossenen vorläufigen Verzeichnisse, welche das Ergebnis einer mit viel Mühe verbundenen Ordnung der Tief'schen

aturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum

Sammlungen darstellen, zeigen, dass Tief auch nach der Fertigstellung seiner Kataloge emsig weiter gesammelt und die Fliegenfauna Kärntens durch zahlreiche neue Funde bereichert hat.

Es können in diesen Verzeichnissen schon, wenn man nur die sicher aus Kärnten angeführten Arten berücksichtigt, etwa 122 Arten, die zum Theile recht selten sind, als neu für Kärnten angeführt werden, welche Zahl sich ja noch wesentlich erhöhen wird, wenn einmal die Determinanda, welche jetzt 12 Cartons einnehmen, einer Bestimmung unterzogen sein werden.*)

Hoffentlich dürfen wir uns der angenehmen Erwartung hingeben, dass in nicht allzu ferner Zeit ein Fachmann sich finden wird, der sich dieses gewiss mit vieler Mühe aufgesammelten Materiales annimmt und es seinem Zwecke zuführt.**)

Kleine Mittheilungen.

Außerordentliche Generalversammlung des naturhistorischen Landesmuseums am 15. Juli 1898. Vorsitzender: F. Seeland. Anwesend: Heinrich Fürst Rosenberg, Regierungsrath A. Stanfel, Landesausschuss K. Ritter v. Hillinger, E. Bendl, A. Brunlechner, Fr. Ritter v. Edlmann, Dr. K. Frauscher, Dr. E. Giannoni, J. Gleich, R. Ritter v. Hauer, Th. Hoffmann, M. Baron Jabornegg, A. Ritter v. Jaksch, G. Kröll, Dr. R. Latzel, Dr. J. Mitteregger, G. Punzengruber, H. Sabidussi, A. Tschebull, L. Unterkreuter, Dr. F. Vapotič. Entschuldigt: Landespräsident Otto Ritter v. Fraydenegg und Monzello.

*) Wesentlicher erhöht sich diese Zahl, wenn man, wie es nahezu sicher ist, annimmt, dass fast alle von Strobl aus Nord-Steiermark angeführten Arten auch in Kärnten vorkommen; dann erhöht sich die Zahl der neuen Einschübe auf über 350 Arten und sind diese den von Tief in seinem Kataloge angeführten 1387 Arten noch hinzuzufügen.

Im ganzen enthalten die Tief'schen Sammlungen bis jetzt 630 Arten, welche in den Katalogen nicht angeführt wurden, von denen nur eine sehr geringe Anzahl auf solche Arten entfällt, die in Oesterreich bisher überhaupt nicht nachgewiesen sind.

**) Es bedürfen in diesem Verzeichnisse außer einigen belanglosen Druckfehlern folgende zwei Stellen einer Verbesserung, welche hiemit vorgenommen wird:

pag. 37 (8), Zeile 8 von unten: Molophilus obscurus Mg. = Erioptera obscura Mg. (fehlt daher in der Sammlung nicht).

pag. 90 (19), Zeile 6 von unten: Statt Asilus s. st. und, muss es heißen Asilus s. st.: A.

Der Vergleich der Kärntner und nordsteirischen Vorkommnisse ist erst von den Syrphiden an genauer durchgeführt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: 88

Autor(en)/Author(s): Tief Wilhelm, Frauscher Karl Ferdinand

Artikel/Article: Die Tiefschen Dipteren-Sammlungen (Schluß) 153-171